

圖書集成醫部全錄

第四十一冊

外科癰疽疔毒門

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

中科院植物所圖書館



S0047953

欽定古今圖書集成醫部全錄第四十一冊目錄

卷三百五十九彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

按外科證生於各部分者已詳前雜病例中如發腦百會等病之見於頭門發面發頤等病之見於面門瘰癧天柱等病之見於頸門發背對心等病之見於背門內癰并疔見於臂門臙瘡鶴膝見於四肢妬精疔癩見於前陰之類此皆不復贅

黃帝素問

- ①生氣通天論一
- ②陰陽別論一
- ③異法方宜論二
- ④脈要精微論二
- ⑤通評虛實論二
- ⑥氣穴論二
- ⑦氣交變大論二
- ⑧五常政大論三

靈樞經

- ①癰疽篇三
- ②刺節真邪篇四
- ③脈度篇五
- ④寒熱病篇五
- ⑤玉版篇五

張機金匱要略

- ①病脈證治一六

華佗中藏經

- ①總論一六
- ②論五疔狀候一七

孫思邈千金方

6513134



ARREAR

脈所主雜病法訣一三五 ㊶將護忌慎法一六 ㊷論虛實法一七 ㊸辨淺深法一八 ㊹辨膿法一九 ㊺辨證法一〇 ㊻辨善惡法一一 ㊼砭鎌法一二 ㊽貼熨法一三 ㊾漏潰法一三 ㊿針烙法一三 ㊽灸療法一三 ㊾內消法一三 ㊿追蝕法一三 ㊽托裏法一三 ㊿止痛法一三 ㊽用藥增損法一三 ㊾權變通類法一三 ㊿論五發疽一三 ㊽總論一三 ㊿疔瘡一三

戴思恭證治要訣

㊽癰疽癰毒證治一七

薛己醫案

㊽用藥總論一三 ㊾治法三要一三 ㊿灸法一四 ㊽攻補法一四 ㊾分三因一四 ㊿陰滯於陽則生癰陽滯於陰則生疽一四 ㊽明本末一四 ㊾膿潰論一四 ㊿生肌止痛一四 ㊽惡肉論一四 ㊾腫瘍一四 ㊿潰瘍一四 ㊽作痛一四 ㊾發熱一四 ㊿作渴一四 ㊽作嘔一四 ㊾便秘一四 ㊿疔瘡一四

卷三百六十一彙考三百六十一

外科癰疽疔毒門二

薛己醫案

㊽灸法用藥第一一四 ㊾備論第二一四 ㊿灸法論第三一四 ㊽騎竹馬灸法第四一四

○總論脈證治法一七 ○疔腫一〇

竇漢卿瘡瘍全書

○圍法貼紙訣一二 ○開刀手法一二 ○疔瘡總論一三 ○拔法一二 ○各種一三
⊗飛遊毒一二三 ⊕紅絲瘡一二三

劉完素六書

○總論一二四

李杲十書

○總論一二五 ○用藥加減法一六

朱震亨心法

○總論證治一六 ○痛證一七 ○疔瘡一六

卷三百六十彙考三百六十

外科癰疽疔毒門二

齊德之外科精義

○診候入式法一元 ○榮衛色脈參應之法一元 ○論持手訣消息法一三 ○三部所主
腑臟病論一三 ○脈證名狀二十六種所主病證一三 ○三部脈所主證候一三 ○三部

外科癰疽疔毒門四

李梴醫學入門

- ①癰疽證治一七
- ②疔瘡證治一六
- ③紅絲瘡證治一八〇
- ④多骨疽證治一八〇

樓英醫學綱目

- ①行年血忌一八〇
- ②虛實寒熱宜忌一八一
- ③不可患癰疽者七處一八一
- ④疔瘡一八一

王肯堂證治準繩

- ①癰疽之源一八二
- ②癰疽之別一八四
- ③脈法一八五
- ④分經絡一八七
- ⑤諸經向導藥一八八
- ⑥善惡一九〇
- ⑦虛實一九〇
- ⑧內消一九二
- ⑨內托一九二
- ⑩敷貼一九三
- ⑪淋洗一九三

卷三百六十三彙考三百六十三

外科癰疽疔毒門五

王肯堂證治準繩

- ①腫瘍一八五
- ②潰瘍一九七
- ③辨膿一九八
- ④多骨疽二〇〇
- ⑤惡瘡二〇〇
- ⑥疔瘡二〇〇

陳實功外科正宗

- ①原委論第一一二六
- ②治法總論第二一二〇
- ③陽證歌第三一二八
- ④陰證歌第四一

- ⑤ 隔蒜灸法第五一〇 ⑥ 尋頭灸法第六一五 ⑦ 蒜餅分輕重第七一五 ⑧ 灸法要論第八一五 ⑨ 灼艾痛癢論第九一五 ⑩ 腦疽灸法第十一五 ⑪ 護臟腑論第十一五 ⑫ 癰疽論第十二一五 ⑬ 絞論第十三一五 ⑭ 素問要論第十四一五 ⑮ 千金要論第十五一五 ⑯ 別脈辨證論第十六一五 ⑰ 脈證第十七一五 ⑱ 用藥大綱第十八一五 ⑲ 嘔逆第十九一五 ⑳ 論源第二十一五 ㉑ 華佗論第二十一一五 ㉒ 論原有五第二十二一五 ㉓ 分表裏第二十三一五 ㉔ 別內外第二十四一五 ㉕ 陰陽淺深緩急治法第二十五一五 ㉖ 善惡第二六一五 ㉗ 生死第二七一五 ㉘ 先明形證逆順第二八一五 ㉙ 審內證用藥附一五 ㉚ 治貴在早第二九一五 ㉛ 津潤墨圍第三十一五 ㉜ 看色灼艾防蔓第三十一一五 ㉝ 瘡口冷瀼難合第三十二一五 ㉞ 用藥溫涼防祕泄第三十三一五 ㉟ 生痲切護第三十四一五 ㊱ 體察愛護第三十五一五 ㊲ 香藥調治第三十六一五 ㊳ 飲食居處戒忌第三十七一五 ㊴ 更易良方第三十八一五 ㊵ 麥飯石膏第三十九一五 ㊶ 敷神異膏第四十一一五 ㊷ 口緊小硬第四十一一五 ㊸ 喉舌生瘡如菌第四十二一五 ㊹ 替針丸第四十三一五 ㊺ 割傷第四十四一五 ㊻ 寒熱多汗用藥第四十五一五 ㊼ 食毒發熱第四十六一五 ㊽ 作渴調補精氣第四十七一五 ㊾ 將安發熱作渴第四十八一五 ㊿ 口乾作渴不同第四十九一五 ㉀ 腎虛發熱第五十一一五 ㉁ 將安當補第五十一一五 ㉂ 服藥捷徑第五十二一五 ㉃ 調節飲食當平胃氣第五十三一五 ㉄ 成漏脈例第五十四一五 ㉅ 葶針法第五十五一五 ㉆ 彙括關鍵處治一六 ㉇ 論多骨疽一七

一三五 ① 神仙解毒萬病丸一三五 ② 郭氏瑞效丸一三五 ③ 萬靈奪命丹一三五 ④ 一粒金丹一三七 ⑤ 威靈仙飲一三七 ⑥ 五香連翹湯一三七 ⑦ 千金漏蘆湯一三七 ⑧ 防風通聖散一三七 ⑨ 中和湯一三七 ⑩ 內托散一三七 ⑪ 國老膏一三七 ⑫ 解毒散一三七 ⑬ 清心內固金粉散一三七 ⑭ 內追毒丹一三七 ⑮ 獨勝散一三七 ⑯ 遠志酒一三七 ⑰ 五香散一三七 ⑱ 忍冬酒一三七 ⑲ 生地黃散一三七 ⑳ 阿膠飲子一三七 ㉑ 牛膠飲一三七 ㉒ 黃礬丸一四〇 ㉓ 托裏消毒散一四〇 ㉔ 散毒飲子一四〇 ㉕ 神效托裏散一四〇 ㉖ 黃芪散一四二 ㉗ 黃芪四物湯一四二 ㉘ 內固黃芪丸一四二 ㉙ 回陽湯一四二 ㉚ 清熱消毒散一四二 ㉛ 黃連消毒散一四二 ㉜ 黃連解毒湯一四二 ㉝ 排膿湯一四二 ㉞ 排膿散一四二 ㉟ 連翹飲一四二 ㊱ 柞木飲子一四二 ㊲ 車螯散一四二 ㊳ 內消散一四二 ㊴ 化毒爲水內托散一四二 ㊵ 仙方活命飲一四二 ㊶ 保安方一四二 ㊷ 祕方托裏散一四二 ㊸ 祕方拔毒散一四二 ㊹ 歸芪湯一四二 ㊺ 榮衛返魂湯一四二 ㊻ 龍虎交加散一四二 ㊼ 如神托裏散一四二 ㊽ 前鋒正將一四二 ㊾ 引兵先鋒一四二 ㊿ 加味十奇散一四二 ㊽ 豨薟散一四五 ㊾ 圍藥一四五 ㊿ 敷藥一四五 ㊽ 將軍鐵箍膏一四五 ㊾ 又方一四五 ㊿ 正鐵箍散一四五 ㊽ 大鐵箍散一四五 ㊾ 水黃散一四五 ㊿ 外用潰毒藥一四五 ㊽ 圍腫方一四七 ㊾ 神白膏一四七 ㊿ 雄黃散一四七 ㊽ 鐵井欄一四七 ㊿ 烏龍膏一四七 ㊽ 宜毒散一四七 ㊾ 拔毒散一四七 ㊿ 蠲毒散一四七 ㊽ 退毒散一四七 ㊿ 神功妙貼散一四七 ㊽ 特異萬靈散一四七 ㊾ 又方一四七 ㊿ 隔皮取膿法一四七 ㊽ 雄黃散一四七 ㊾ 萬應針頭丸一四九 ㊿ 萬槌青雲膏一四九 ㊽ 四虎散一四九 ㊿ 回陽玉龍膏一四九 ㊽ 洪寶丹一四九 ㊿ 金黃散一五〇 ㊽ 天花青露散一五〇 ㊿ 消腫散一五〇 ㊽ 神護膏一

- 二八 ⑤半陰半陽證歌第五一二八 ⑥五善歌第六一二九 ⑦七惡歌第七一二九 ⑧治病則例歌第八一二九 ⑨灸法併禁灸瘡穴第九一二〇 ⑩論病生死法第十一二三 ⑪察形色順逆第十一二三 ⑫病有三因受病主治不同論第十二二三 ⑬調理須知第十三二三 ⑭雜忌須知第十四二三 ⑮看法一三三 ⑯腫瘍治法一三四 ⑰潰瘍治法一三四
- ⑱瘡名十則一三四 ⑲疔瘡論一三五 ⑳看法一三六 ㉑治法一三七 ㉒多骨疽論一三七

卷三百六十四彙考三百六十四

外科癰疽疔毒門六

方一..... 二元

- ①內疎黃連湯一二元 ②內托復煎散一二元 ③當歸黃芪湯一二三 ④托裏榮衛湯一二三
- ⑤加味當歸飲子一二三 ⑥人參敗毒散一二三 ⑦郭氏神效烏金散一二三 ⑧奪命丹一二三
- ⑨蟾酥丸一二三 ⑩寸金丹一二三 ⑪烏金散一二三 ⑫勝金丹一二三 ⑬奪命丹一二三
- ⑭內托羌活湯一二三 ⑮托裏溫經湯一二三 ⑯當歸拈痛湯一二三 ⑰復煎散一二三
- ⑱金針散一二三 ⑲精要十宣散一二三 ⑳十六味流氣飲一二三 ㉑千金托裏散一二三
- ㉒托毒散一二三 ㉓聖濟射干湯一二三 ㉔托裏散一二三 ㉕破棺丹一二三
- ㉖瀉心湯一二三 ㉗清涼飲一二三 ㉘精要漏蘆湯一二三 ㉙內消升麻湯一二三 ㉚孫真人單灸大黃湯一二三
- ㉛宜毒散一二三 ㉜內托散一二三 ㉝車螯散一二三 ㉞內消丸一二三

二元

二元

頭散—一六二 ①追毒餅—一六二 ②翠青錠子—一六二 ③搜膿錠子—一六二 ④神效當歸膏—
 一六二 ⑤神異膏—一六二 ⑥熱瘡寒膏藥—一六三 ⑦神仙太乙膏—一六三 ⑧金絲萬應膏—一六四
 ⑨善應膏—一六四 ⑩元武膏—一六五 ⑪金絲膏—一六五 ⑫長肌膏—一六五 ⑬精要生肌散
 —一六五 ⑭平肌散—一六五 ⑮生肌散—一六五 ⑯紅玉散—一六六 ⑰完肌散—一六六 ⑱生肌
 散—一六六 ⑲又方—一六六 ⑳保命乳香散—一六六 ㉑聖效散—一六六 ㉒桃紅散—一六六
 又方—一六六 ㉓黃丹散—一六七 ㉔橘半胃芥湯—一六七 ㉕托裏健中湯—一六七 ㉖托裏益中
 湯—一六七 ㉗托裏抑青湯—一六七 ㉘托裏清中湯—一六七 ㉙托裏益黃湯—一六七 ㉚托裏越
 鞠湯—一六七 ㉛人參理中湯—一六八 ㉜黃芪人參湯—一六八 ㉝加味解毒湯—一六八 ㉞內補
 黃芪湯—一六八 ㉟當歸和血散—一六八 ㊱迴瘡金銀花散—一六八 ㊲郭氏定痛托裏散—一六八
 ㊳乳香止痛散—一六九 ㊴乳香黃芪散—一六九 ㊵人參內托散—一六九 ㊶乳香九—一六九
 ㊷乳香定痛散—一六九 ㊸乳香膏—一六九 ㊹乳香膏—一七〇 ㊺東垣聖愈湯—一七〇 ㊻和氣
 散—一七一 ㊼瞿麥散—一七〇 ㊽參苓白朮散—一七〇 ㊾調胃白朮散—一七一 ㊿附子理中湯
 —一七一 ①薑附湯—一七一 ②參附湯—一七一 ③懷忠丹—一七一 ④葶藶大棗瀉肺湯—一七二
 ⑤桔梗湯—一七二 ⑥葦莖湯—一七二 ⑦如聖丸—一七二 ⑧仲景桔梗白散—一七二 ⑨杜
 丹散—一七二 ⑩如金解毒散—一七二 ⑪桔梗湯—一七三 ⑫四順湯—一七三 ⑬瀉白湯—一七三
 ⑭濟生排膿湯—一七三 ⑮排膿散—一七三 ⑯甯肺湯—一七三 ⑰人參補肺湯—一七四 ⑱
 人參平肺散—一七四 ⑲參芪補脾湯—一七四 ⑳葶藶散—一七四 ㉑補肺散—一七四 ㉒理肺
 膏—一七四 ㉓五香白朮散—一七五 ㉔葶藶附子散—一七五 ㉕牡丹湯—一七五 ㉖葶藶仁湯
 —一七五 ㉗牡丹散—一七五 ㉘梅仁湯—一七五 ㉙大黃湯—一七六 ㉚四聖散—一七六 ㉛排膿

- 一五〇 ①水澄膏一五〇 ②五金膏一五〇 ③清水膏一五〇 ④水調膏一五二 ⑤水澄膏一五二
- ⑥二黃散一五二 ⑦搗毒散一五二 ⑧三消散一五二 ⑨四面楚歌一五二 ⑩水師晶明一五二
- ⑪礪砂膏一五三 ⑫六灰膏一五三 ⑬援生膏一五三 ⑭替針丸一五三 ⑮又方一五三
- ⑯替針丁香丸一五三 ⑰托裏溫中湯一五三 ⑱加味十全湯一五三 ⑲補中益氣湯一五三
- ⑳人參養榮湯一五三 ㉑四君子湯一五四 ㉒六君子湯一五四 ㉓異功散一五四
- ㉔四物湯一五四 ㉕八珍湯一五四 ㉖十全大補湯一五四 ㉗歸脾湯一五五 ㉘黃芪人參湯一五五
- ㉙托裏當歸湯一五五 ㉚人參散一五五 ㉛麥門冬湯一五五 ㉜護壁都尉一五五
- ㉝六味丸一五五 ㉞八味丸一五五 ㉟加減八味丸一五五 ㊱人參內托散一五五
- ㊲黃芪散一五五 ㊳當歸補血湯一五五 ㊴沉香散一五五 ㊵加味逍遙散一五五
- ㊶梔子黃芩湯一五五 ㊷六合回生丹一五五 ㊸驪龍散一五五 ㊹麥飯石膏一五五
- ㊺解毒百用膏一五五 ㊻逼毒散一五六 ㊼青散子一五六

卷三百六十五彙考三百六十五

外科癰疽疔毒門七

方二

- ①雄黃解毒散一五九 ②豬蹄湯一五九 ③集香散一五九 ④熏洗方一六〇 ⑤追毒丹一六〇
- ⑥追毒烏金散一六一 ⑦又方一六一 ⑧神異膏一六一 ⑨止痛拔毒膏一六一 ⑩青金錠子一六一
- ⑪翠霞錠子一六一 ⑫信效錠子一六一 ⑬紅玉錠子一六一 ⑭時效針

外科癰疽疔毒門八……………一九二

單方……………一九二

卷三百六十七彙考三百六十七

外科癰疽疔毒門九……………三二

鍼灸……………三一

鍼烙……………三八

導引……………三〇

醫案……………三〇

- 散一七六 ㊟射干湯一七六 ㊟復元通氣散一七六 ㊟芍藥湯一七六 ㊟荆防敗毒散一七六
- ㊟二活散一七七 ㊟奪命丹一七七 ㊟返魂丹一七七 ㊟返魂丹一七七 ㊟飛龍奪命丹一七六
- ㊟走馬赴筵丹一七六 ㊟羅氏破棺丹一七六 ㊟破棺丹一七九 ㊟內托連翹散一七九
- ㊟不二散一七九 ㊟奪命丹一七九 ㊟雄黃丸一七九 ㊟追毒丸一七九 ㊟五聖散一八〇
- ㊟奪命返魂散一八〇 ㊟立馬回疔奪命散一八〇 ㊟御史散一八〇 ㊟加減通聖散一八〇
- ㊟追疔奪命湯一八二 ㊟加減追疔奪命湯一八二 ㊟防風當歸湯一八二 ㊟雄麝湯一八二
- ㊟解毒消瘴散一八二 ㊟切瘴消毒散一八二 ㊟青黃消毒散一八二 ㊟四神丹一八二
- ㊟萬全散一八二 ㊟七聖紫金錠一八三 ㊟硃墨丸一八三 ㊟萬病解毒丸一八三
- ㊟刷瘴散一八三 ㊟拔瘴散一八三 ㊟洗瘴方一八三 ㊟羅氏托裏散一八四 ㊟連翹黃芪湯一八四
- ㊟羅氏保生錠子一八四 ㊟滴滴金一八四 ㊟疔瘡錠子一八四 ㊟回瘡錠子一八四
- ㊟神聖膏藥一八四 ㊟奪命散一八五 ㊟郭氏寸金錠子一八五 ㊟郭氏提疔錠子一八五
- ㊟郭氏守效散一八五 ㊟麝香蟾酥丸一八五 ㊟追毒丹一八五 ㊟海馬拔毒散一八六
- ㊟芫花根膏一八六 ㊟四聖旋疔散一八六 ㊟拔毒散一八六 ㊟保生餅子一八六
- ㊟濟生金砂散一八七 ㊟鐵罐膏一八七 ㊟又方一八七 ㊟鐵粉散一八七 ㊟又方一八七
- ㊟雄黃散一八七 ㊟追毒丸一八七 ㊟蜚蝗膏一八八 ㊟又方一八八 ㊟又方一八八
- ㊟五聖散一八八 ㊟破棺丹一八八 ㊟立馬回疔丹一八八 ㊟又方一八八 ㊟蟾酥走黃丸一八九
- ㊟迴瘡蟾酥錠子一八九 ㊟化毒丸一八九

卷三百六十六彙考三百六十六

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百五十九

外科癰疽疔毒門一

黃帝素問

按外科證生於各部分者，已詳前雜病例中。如發臙百會等病之見於頭門，發面發頭等病之見於面門，癰癧天柱等病之見於頸門，發背對心等病之見於背門，內癰并疽見於胃門，臙瘡癰癧見於四肢，妬精疔癰見於前陰之類，此皆不復贅。

○生氣通天論

高粱之變，足生大疔，受如持虛。

註高粱，厚味也。味厚傷形，氣傷於味，形氣傷則肌腠虛矣。高粱所變之熱毒，逆於肉理，而多生大疔，蓋膚腠虛而熱毒乘之，有如持虛器而受之也。

榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。

註邪逆於肉理氣分，而陰陽不和則生癰腫。經曰：「陽氣有餘，榮氣不行，乃發為癰，陰陽不通，兩熱相搏，乃化為臙。」

○陰陽別論

三陽為病，發寒熱，下為癰腫。

註三陽者，太陽也。太陽之氣主表，邪之中人始於皮毛，邪正相搏，發為寒熱之病矣。太陽主開，病則開闔不得，邪

註皆暑熱之病也。

歲水不及，民病寒瘍流水。

註此寒毒而無熱化，故發為寒瘍流水而無膿也。

④五常政大論

委和之紀，其病支廢癰腫瘡瘍。

註皆金盛而邪傷肝也。

卑監之紀，其動瘍涌分潰癰腫。

註土運不及，則化氣不能施其令，逆於肉理也。

赫曦之紀，其病笑瘡瘍血流。

註皆火熱之為病也。

堅成之紀，其動暴折瘍注。

註暴折金受其傷，瘍注皮膚之疾也。

少陰司天，熱氣下臨，甚則瘡瘍。

註暑熱淫盛也。

靈樞經

①癰疽篇

黃帝曰：「余聞腸胃受穀，上焦出氣，以溫分肉而養骨節，通腠理，中焦出氣如露，上注谿谷而滲孫脈，津液和調，變化而赤為血，血和則孫脈先滿溢，乃注於絡脈皆盈，乃注於經脈，陰陽已張，因息乃行，行有經紀，周有道理，與天合。」

氣從之，逆於肉理，乃生癰腫。

③ 異法方宜論

東方之域，其民食魚而嗜鹹，其病皆為癰瘍，其治宜砭石，故砭石者，亦從東方來。

註魚性屬火，鹹又勝血，靈樞經曰：「飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，榮氣不行，乃發為癰。」

④ 脈要精微論

帝曰：「諸癰腫筋攣骨痛，此皆安生？」岐伯曰：「此寒氣之腫，八風之變也。」帝曰：「治之奈何？」岐伯曰：「此四時之病，以其勝治之愈也。」

⑤ 通評虛實論

註以勝治之者，以五行氣味之勝治之而愈也。如寒淫於內，治以甘熱，如東方生風，風生木，木生酸辛勝酸之類。所謂少鍼石者，非癰疽之謂也。癰疽不得頃時回。

註癰疽之患，榮衛血氣並實，皮肉筋骨皆傷，非若四時之有淺深，冬時之少鍼石也。癰者，擁也，疽者，阻也，謂熱毒外擁內阻，宜即刺之，不得遲延時頃，而使邪毒之回轉也。

⑥ 氣穴論

邪溢氣壅，脈熱肉敗，榮衛不行，必將為膿，內銷骨髓，外破大腠，留於節湊，必將為敗。

註夫氣為陽，邪留於肌腠之氣分，邪正相搏，則為病熱，故有壅膿消破之敗證矣。邪氣淫溢，則正氣自壅，谿谷之氣與脈相通，是以脈熱於內而肉敗於外也。榮衛不行，則血氣留滯而為壅膿。腠足之股肉也，節湊筋骨相連之處，邪留其間，筋骨必將為敗矣。

⑦ 氣交變大論

炎木不及，復則炎暑流火，病寒熱瘡瘍痲疹癰瘰。

爲腸溜，久者數歲乃成，以手按之柔，已有所結，氣歸之，津液留之，邪氣中之，凝結日以易，甚連以聚，居爲昔瘤，以手按之堅，有所結，深中骨氣，因於骨，骨與氣并，日以益大，則爲骨疽，有所結，中於肉宗，氣歸之，邪留而不去，有熱則化而爲膿，無熱則爲肉疽，凡此數氣者，其發無常處而有常名也。

註寒與熱搏者，形中之陰陽二氣也。蓋形舍氣，氣歸形，形氣之相合也。是以傷形則病氣，傷氣則病形，結氣歸之者，寒熱相搏之氣，歸於邪留之形所也。凡此數氣者，其發無定處，而有肉枯骨蝕筋溜昔瘤之定名也。

③脈度篇

六腑不和則留爲癰。

註在內者六腑爲陽，在外者皮膚爲陽。本經曰：『陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰。』是以六腑不和，則血氣留滯於皮膚而爲癰，此病從內而外也。

④寒熱病篇

五臟身有五部，伏兔一，腓二，腓者膻也。背三，五臟之膻四，項五，此五部有癰疽者死。

註伏兔，腎之街也。膻者，脾之部也。背者，肺之俞也。五臟俞者，謂五椎之心俞也。項者，肝之俞也。本經曰：癰疽之發，不從天下，不從地出，積微之所生也。故五部之有癰疽者，乃五臟漸積之鬱毒，外應於血氣之不和而爲癰疽，故五部有此者死。

⑤玉版篇

黃帝曰：『病之生時，有喜怒不測，飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰疽，陰陽不通，兩熱相搏，乃化爲膿，小鍼能取之乎？』岐伯曰：『聖人不能使化者，爲其邪不可留也。故兩軍相當，旗幟相望，白刃陳於中野者，此非一日之謀也。能使其民令行禁止，士卒無白刃之難者，非一日之教也。須臾之得也。夫至使身被癰疽之病，膿血之聚者，不亦離道遠乎？夫癰疽之生，膿血之成也，不從天下，不從地出，積微之所生也。故聖人自治於未有形也。』

同，不得休止，切而調之，從虛去實，瀉則不足，疾則氣減，留則先後從實去虛，補則有餘，血氣已調，形氣乃持，余已知血氣之平與不平，未知癰疽之所從生，成敗之時，死生之別，有遠近，何以度之？可得聞乎？岐伯曰：「經脈流行不止，與天同度，與地合紀，故天宿失度，日月薄蝕，地經失紀，水道流溢，草實不成，五穀不殖，經路不通，民不往來，巷聚邑居，則別離異處，血氣猶然，請言其故！夫血脈榮衛周流不休，上應星宿，下應經數，寒邪客於經絡之中，則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫寒氣化爲熱，熱勝則腐肉，肉腐則爲膿，膿不瀉則爛筋，筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄瀉，血枯空虛，則筋骨肌肉不相營，經脈敗漏，熏於五臟，臟傷故死矣。」

註人之血氣流行，與天地相參，與日月相應，晝夜環轉之無端也。一息不連，則留滯而爲癰，多不治之死證矣。黃帝曰：「夫子言癰疽何以別之？」岐伯曰：「榮衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從之而不通，壅遏而不得行，故熱。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿，然不能陷，骨髓不爲焦枯，五臟不爲傷，故命曰癰。」黃帝曰：「何謂疽？」岐伯曰：「熱氣滄盛，下陷肌肉筋髓枯，內連五臟，血氣竭，當其癰下，筋骨良肉皆無餘，故命曰疽。疽者上之皮天以堅，上如牛領之皮，癰者其皮上薄以澤，此其候也。」

註人之血氣，流行環轉出入，而淫邪汙衍，變易無常，且氣秉有厚薄，邪客有微甚，是以死生成敗，各不同焉。

○刺節真邪篇

虛邪之中人也，灑淅動形，起毫毛而發腠理，其入深，內搏於骨，則爲骨痹，搏於筋，則爲筋攣，搏於脈中，則爲血閉不通，則爲癰。

註灑淅動形，故搏於皮，脈肉筋骨而爲痹，爲攣，爲痒，陰勝則爲寒，寒則真氣去，有傷衛氣，則爲不仁，此皆邪氣之所生也。

虛邪之入於身也，深寒與熱相搏，久留而內著，寒勝其熱，則骨疼，肉枯，熱勝其寒，則爛肉腐肌，爲膿，內傷骨，內傷骨爲骨蝕，有所疾，前筋筋屈不能伸，邪氣居其間而不反，發爲筋溜，有所結，氣歸之，衛氣留之，不得反津液，久留合而

發於喉舌者，心之毒；發於皮毛者，肺之毒；發於肌肉者，脾之毒；發於骨髓者，腎之毒；發於下者，陰之毒；發於上者，陽之毒；發於外者，六腑之毒；發於內者，五臟之毒。故內曰壞，外曰潰。上曰從，下曰逆。發於上者，得之速；發於下者，得之緩。感於六腑則易治，感於五臟則難瘳也。又近骨者多冷，近虛者多熱。近骨者久不愈，則化成血蠱；近虛者久不愈，則傳氣成漏，或蠱則多癢，少痛，或先癢後痛，生漏則多痛，少癢，或不痛不癢。內虛外實者多痛，少癢，血不止則多死，膿疾潰則多生，或吐逆無度，飲食不時，皆癰疽之使然。種候萬端，要在憑詳。

○論五疔狀候

五疔者，皆由喜怒憂思，衝寒冒熱，恣飲醇酒，多嗜甘肥，毒魚酢醬，色慾過度之所爲也。畜其毒邪，浸漬臟腑，久而不散，始變而成，其名有五：一曰白疔，二曰赤疔，三曰黃疔，四曰黑疔，五曰青疔。白疔起於右鼻下，初如粟米，根赤頭白，麻木或痛癢，使人憎寒，頭重，狀若傷寒，不欲食，胃膈悶喘，促昏冒者死，未者可治。此疾不過五日，禍必至矣。宜速治之。赤疔在舌下，根頭俱赤，發痛，舌本硬，不能多言，驚煩悶恍惚，多渴，引水不休，小便不通，狂者死也，未者可治。此不七日，禍必至矣。大人小兒，皆能患也。黃疔起於脣齒齦邊，其色黃，中有黃水，發則令人多食，則還出，手足麻木，涎出不止，腹脹而煩，多睡不寤者死也，未者可治。黑疔者起於耳前，狀如癩痕，其色黑長，或不定，使人牙關急，腰脊膝不仁，不然，則病亦不出三歲死。皆由腎氣漸絕也。宜慎慾事。青疔起於目下，始如癩瘤，其身青硬如石，使人目昏昏然，無所見，多恐悸，睡不安甯，久不愈，令人盲或脫睛，有此則不出一年，禍必至矣。白疔其根肺，赤疔其根心，黃疔其根脾，黑疔其根腎，青疔其根肝。五疔之候，最爲巨疾，不可不察也。

唐孫思邈千金方

○總論脈證治法

脈數身無熱，卽內有癰。

者，遭其已成也。」黃帝曰：「其已形不予遭，膿已成不予見，爲之奈何？」岐伯曰：「膿已成十死一生，故聖人弗使已成，而明爲良方，著之竹帛，使能者踵而傳之，後世無有終時者，爲其不予遭也。」

註：皮膚分肉之氣血，從內而出於外，少有留滯，則漸積而成癰膿。如發於外而小者易愈，大者多害，若留積在內，成癰膿而不見者，十死一生也。

黃帝曰：「其已有膿血而後遭乎？不道之以小鍼治乎？」岐伯曰：「以小治小者其功小，以大治大者多害，故其已成膿血者，其惟砭石鉞鋒之所取也。」

註：癰小而以小鍼治之者，其功小而易成，癰大而以大鍼治之者，多有逆死之害。故其已成膿血者，其惟砭石鉞鋒之所取也。

漢張機金匱要略

○病脈證治

諸浮數脈，應當發熱，而反灑淅惡寒，若有痛處，當發其癰。師曰：「諸癰腫，欲知有膿無膿，以手掩腫上，熱者爲膿，熱者爲無膿。」

問曰：「寸口脈浮微而澀，法當亡血，若汗出，設不汗者，云何？」答曰：「若身有瘡，被刀斧所傷，亡血故也。」病金瘡，王不留行散主之。

華佗中藏經

○總論

夫癰疽瘡腫之作，皆五臟六腑畜毒不流，則皆有矣，非獨因榮衛壅塞而發者也。其行也有處，其主也有歸，假令

過一寸樹量，不得臆，即與食肉膏散箸銳頭內癰口中，如體氣熱歇，即服木占斯散，五日後癰欲著痂者，即服排膿內塞散。

凡癰破之後，便綿悞欲死，內寒外熱，闕文腫自有似癰而非者，當以手按腫，上無所連，乃是風毒耳，勿針之，宜服升麻湯，外摩膏破癰口，當令上留三分，近下一分針之，務令極熱，熱便不痛，破後敗壞不瘥者，作猪蹄湯洗之，日二度，夏用二日，冬用六七日，用湯半劑亦可，夫癰壞後有惡肉者，宜猪蹄湯洗去穢，次傳蝕肉膏散，惡肉盡後，傳生肉膏散，及摩四邊，令好肉速生，當斷絕房室，忌風冷，勿自勞煩，待筋脈平復，乃可任意耳。緣新肉易傷，傷則裏潰，潰則重發，發即難救，慎之慎之，白痂最忌。

凡諸暴腫，一一不同，無問近遠，皆服五香連翹湯，刺去血，小豆末傅之，其間數數以針刺去血，若失療已潰爛者，猶服五香湯及漏蘆湯下之，隨熱多少，依方用之，外以升麻湯洗熨之，摩升麻膏，若生息肉者，以白藺茹散傅之，青黑肉去盡停止，好肉生，傅升麻膏，如肌不生，傅一物黃芪散。若傅白藺茹，青黑惡肉不盡者，可以漆頭藺茹散半錢，和白藺茹散三錢，稍稍傅之，其散各取當色單擣下篩，直爾成散用之，或身中忽有痛處，如遭打撲之狀，名曰氣痛，痛不可忍，遊走不住，發作有時，痛則小熱，痛定則寒，此皆由冬時受溫氣，至春暴寒，風來折之，不成溫病，乃作氣痛，宜先服五香連翹湯，摩丹參膏，又以白酒煎楊柳皮，及暖熨之，有赤氣點點者，即刺出血也。其五香連翹湯，及小竹瀝湯，可服數劑，勿以一劑未瘥，便住藥，以為無效，禍即至矣。中間用白薇散佳。又有氣腫痛，其狀如癰腫，無頭，虛腫色不變，但皮急痛，不得近手，亦須服此五香，次日白針瀉之，次與蒺藜散傅之。

胷中痛短氣者，當入閤室中，以手指捺左眼視，若見光者，胷中有結癰，若不見光者，是癰疽內發出也。

經云：「氣宿於經絡中，氣血俱澀不行，壅結為癰疽也。」不言熱之所作，其後為癰，又陽氣湊集，寒化為熱，熱甚則肉腐為膿也。又人體有熱，被寒冷搏之，而脈凝結不行，熱氣壅結成癰疽，方有灸法，亦有溫治法，以其中冷未成熱之時，宜用冷藥貼傅之，治熱已成，以消熱，令不成膿也。赤色腫有尖頭者，藜蘆膏傅之。一云，酢知蚌蛤灰塗，乾則易

諸浮數脈當發熱而反灑灑惡寒，若有痛處，當結爲癰。

脈微而遲，必發熱，脈弱而數，此爲振寒，當發癰腫。

脈浮而數，身體無熱，其形默默，胃中微燥，不知痛處，其人當發癰腫。

脈滑而數，滑則爲實，數則爲熱，滑則爲榮，數則爲衛，榮衛相逐，即結爲癰，熱之所過，即爲癰膿，身體有痛處，時時苦有瘡。

跌陽脈滑而數，法當下重，少陰脈滑而數，婦人陰中生瘡。

夫癰疽初發至微，人皆不以爲意，此實奇患，惟宜速治，稍遲緩乃即病成，以此致禍者不一。但發背外皮薄爲癰，外皮厚爲疽，宜急治之。

凡癰疽初發，或似小癰，或復大痛，或復小痛，或發如米粒，大白膿，於此皆微候，善察之，見有小異，即須大驚忙，急須攻治，及斷口味，速服諸湯，下去熱毒，若無醫藥處，即灸當頭百壯，其大重者灸四面及中央二三百壯，數灸不妨多也，復薄以冷藥，種種救療，必速瘥也。

凡用藥貼法，皆當瘡頭處，其藥開孔，令洩熱氣，亦當頭以火針，針入四分即瘥。

凡癰疽瘤石癰結筋癢癰，皆不可就針角，針角者，少有不及禍也。

凡癰無問大小，已覺即取膠如手掌大，暖水浸令軟，納納然稱大小，當頭上開一孔如錢孔大，貼腫上，令相當，須臾乾急，若未有膿者，即定不長，已作膿者當自出。若以鋒針當孔上刺出膿大好，至瘥乃洗去膠。

凡腫根廣一寸已下名癰，一寸已上名小癰，如豆粒大者名皰子，皆始作急服五香連翹湯下之，數劑取瘥，乃止。凡癰高而光大者，不大熱，其肉正平無尖而紫者，不須攻之，但以竹葉黃芪湯申其氣耳。肉正平爲無膿也。癰卒痛以八味黃芪散傳之。大癰七日，小癰五日。其自有堅強者甯生破發乳，若熱手不可得近者，先內服王不留行散，外

治如未滿三十六者可治，俗名黑胞，忌噴怒畜積愁恨。

八曰蛇眼疔，其狀瘡頭黑皮上浮生，形如小豆，狀似蛇眼大，體硬，忌惡眼看，并嫉妬人見之及毒藥。

九曰鹽膚疔，其狀大如匙面，四面皆赤，有黑粟粒起，忌食鹹物。

十曰水洗疔，其狀大如錢形，或如錢孔大，瘡頭白，裏黑，膿汁出，中硬，忌飲漿水水洗渡河。

十一曰刀鎌疔，其狀瘡闊狹如薤葉大，長一寸，左側肉黑如燒燂，忌刺及刀鎌切割，鐵刀所傷，可以藥治。

十二曰浮瀕疔，其狀瘡體曲圓，少許不合，長而狹如薤葉大，內黃外黑，黑處刺不痛，內黃處刺之則痛。

十三曰牛拘疔，其狀肉胞起，掐不破。

右十三種瘡，初起必先癢後痛，先寒後熱，熱定則寒，多四肢沉重，頭痛心驚，眼花若大重者，則嘔逆，嘔逆難治。其麻子疔一種，始末惟癢，所最忌者，不得犯觸，犯觸者即難療。其浮瀕疔狗疔兩種，無所禁忌，縱不療亦不能殺人，其狀寒熱與諸疔同，皆以此方療之，萬不失一。欲知犯觸之狀，但脊強瘡痛極甚，不可忍者是也。

宋寶漢卿瘡瘍全書

○圍法貼紙訣

凡用圍藥，多加功夫攪千餘下，其藥自稠，輕手圍之，留孔必須如鴉子形狀，須用薄紙貼之，務要扯碎貼上，免致綳裂疼痛之苦，待圍藥略乾，再用調藥餘汁潤之，以助藥力。况藥乾不能入肌肉，借濕以通竅耳。

○開刀手法

凡瘡瘍之起，疼痛固屬於心火，久而陽氣昇上，蒸肉化爲膿，若不原其膿之有無，遽爾開刀，則鮮血突出，膿何從來，致患者煎寒發熱，日夜疼痛，無法可止，可先將指頭按患處，隨手而起，四畔悉觀，其頭聚，擇尻神不犯吉日，將刀頭向上開之，方不致傷新肉，取出刀，再燃綿紙條潤油度之，使膿水齊會，半日扯出，則膿水易乾，外貼呼膿膏，四圍

之。

余平生凡治癰疽得效者，皆即記之，考其病源，多是藥氣所作，或有上世服石，遂令子孫多有此疾，食中尤不宜食麪及酒蒜，及慎溫牀厚被，能慎之者，可得終身無疾，此皆躬自驗之，故特論之也。

○疔腫

夫稟形之類，須存攝養，將息失度，百病萌生。故四時代謝，陰陽遞興，此二氣更相擊怒，當是時也，必有暴氣。夫暴氣者，每月之中，必有卒然大風大霧，大寒大熱，若不時避，人忽遇之，此皆入人四體，頓折皮膚，流注經脈，遂使腠理壅隔，榮衛結滯，陰陽之氣不得宣泄，變成癰疽疔毒惡瘡諸腫。至於疔腫，若不預識，令人死不逮時。若著訖乃欲求方，其人已入木矣。所以養生之士，須早識此方，凡是瘡瘍，皆無所逃。

凡療疔腫，皆刺中心至痛，又刺四邊十餘下，令血出去，血傳藥，藥氣得入針孔中，佳。若不達瘡內，療不得力。又其腫好著口中頰邊，舌上見赤黑如珠子，疼痛應心是也。是秋冬寒毒久結皮中，變作此疾，不即療之，日夜根長，流入諸脈數道，如箭入身，捉人不得動搖，若不慎口味房室，死不旋踵，經五六日不瘥，眼中見火，神憎口乾，心煩即死也。

一曰麻子疔，其狀肉上起，頭大如黍米，色稍黑，四邊微赤，多癢，忌食麻子及衣麻布，并入麻田中行。

二曰石疔，其狀皮肉相連，色烏黑如黑豆，甚硬，刺之，肉內陰陰微疼，忌瓦礫磚石之屬。

三曰雄疔，其狀頂頭黑鬚，四畔仰瘡，胞漿起，有水出色黃，大如錢孔，形高，忌房事。

四曰雌疔，其狀瘡頭稍黃，向裏鬚亦如灸，瘡四畔胞漿起，心凹色赤，大如錢孔，忌房事。

五曰火疔，其狀如湯火燒灼，瘡頭黑鬚，四邊有胞漿起，如赤粟米，忌火炙爍。

六曰爛疔，其狀色稍黑，有白癩，瘡潰則有膿水流出，瘡形大小如匙面，忌沸熱食爛臭物。

七曰三十六疔，其狀頂黑，浮起，形如黑豆，四畔起大赤色，今日生，明日二，後日三，乃至十，若滿三十六，藥所不能

凡疔瘡之起，多發於嘴唇上邊，初如米大，或如粉刺，擠破入湯火風氣，亦要變成疔瘡。疔瘡者，卽疔之別名也。先用葱白同飛龍奪命丹五粒和嚼爛，熱酒半碗過下，以衣覆患上，略出汗爲妙。上午服藥，下午卽將絕利磁鋒割破瘡口十字，卽摻飛龍奪命末在內，而外用蟾舌研爛，蟾肚底皮貼之，內服追疔湯劑。若發於鬚髮者，卽剃去鬚髮，如前法治之。此法百發百中，活人多矣。凡發於頭面上者，切不可用冷藥敷之，若敷冷藥，趕熱毒惡戾之氣入於喉間，斷不能生矣。

⑤各種

芝麻疔用黑雲膏，或用紫花草敷瘡上，走注者，遍身疼不能轉動，服蠲毒流氣飲蟾酥丸。

氣疔用勝金錠，服蟾酥丸，外用紫花草敷之。

火疔用勝金錠，服蟾酥丸，紫花草敷瘡上。

冷疔者，高粱之變，風濕餘毒，天陰久冷，攻於膝下，傳於足太陰經，初生如米，漸成潰爛，其色如煤，敗血來侵，骨肉損壞，遂成大患。經年骨節疼痛，累歲不能生肌，先用艾葉蛇牀子紫蘇豨薟草煎湯洗之，內服黃芪白朮蒼朮當歸白芍連翹生地之藥，外用隔紙膏貼之，節勞內省，亦可瘳矣。

魚臍疔，春用黑雲膏，夏用蟾舌膏，秋用桐淚膏，冬用勝金錠。

⑥飛遊毒

此毒因榮衛受其肌熱，故生此疽，赤腫走注不定，用溫水洗患處，用三稜針刺毒上二三十針，或磁鋒砭之，亦妙。隨用拔毒散傳之。

⑦紅絲瘡

夫紅絲者，心腸積毒，氣血相凝，灌於經絡之間，發於肌膚之上，紅絲貫穿，如一紅線，或疼或痒，皆由風熱相乘而生，如箭之速，若行至心間卽死，急當頭以磁鋒刺破，擠出毒血，其紅絲之中再刺之，方絕其根，急用當歸連翹解毒之

再用搜膿散敷之。

㊟疔瘡總論

大抵疔瘡有十三種，而有青黃赤白黑，所以應五臟也。復有暑疔、火疔、氣疔、冷疔者，皆以其時候緩急浮實之異。但初發起，或先後痛，先寒後熱，四肢拘急，沉重強痛者，得證便發寒熱，瘡邊麻木，漸至半身大痛，應心嘔逆，自利足冷至膝，四畔紫黑色，皆爲重證。惟麻木始末皆痒，其證候寒熱與諸疔瘡同，但覺背強其痛甚者，乃觸犯所致，卽取枸杞根搗汁服之，彌佳。再狗屎白色者，得雨露之功，臭氣已去，加枸杞根和勻，絞取清汁服之，尤良。但有卒患喉痛、心寒熱，或腹痛惡寒發熱者，當預防生此疔證也。凡疔瘡多生口邊頰內，或舌上，赤黑點點如珠，疼痛應心者，是也。卽治之，日夜根長，流入諸脈，如箭入身，不得動搖，經久五六日後，甚者毒氣入腹，眼中見火，神昏煩悶，嘔吐恍惚，如醉如痴，不可療矣。疔瘡有頭黑硬而凹者，瘡頭白而腫實者，瘡頭如豆莖色者，瘡頭鮮紅色者，瘡頭內有黑脈者，瘡頭紅赤而浮虛者，瘡頭如梔而黃者，瘡頭如金箔者，瘡頭如茱萸者，瘡頭如石榴子者，有初如風疹粉刺搔破，入風則黃水出，其裏有赤黑脈而微腫者，肉中突起，如魚眼赤黑，慘痛徹骨者，結久皆爲爛瘡，瘡下深孔如大針穿物，初生時突起如釘，故名疔瘡，令人惡寒發熱，四肢強直而牽痛，一二日瘡變黑色，焦黑腫大，光起根硬，不可近，犯之則痛甚，甚則發於頭面手足骨節間者，此氣血聚會之所，宜急治之。有似灸瘡四邊泡漿者，但其瘡熱時膿水出瘡孔，如蜂窠病，易瘥也。此瘡惡證，眼黃面青，舌黑冷汗發渴，腳冷至膝下，不食自利，瘡冷不痛，嘔逆，瘡不起發，四畔不紅，瘡邊麻木，乾黑生刺，瘡邊紫黑色，疼痛應心，眼中見火，神昏煩悶，神思恍惚，猶如醉如痴者，皆難治也。試以針刺患人手足中指，不痛者難治。凡初生時，紅輭溫和，忽然頂陷黑，謂之走黃，此證危矣。急服飛龍奪命丹，追疔奪命湯，其有發於太陽眼邊者，名曰釘腦疔，十死一生。內經以白疔發於右鼻，赤疔發於舌根，黃疔發於口唇，黑疔發於耳前，青疔發於目下，蓋取五色以應五臟，各有所屬部位而已。然或肩或腰或足發無定處，如在頭面手足骨節間者甚急。

以冷水沃之，其痒不去，謂寒能收斂，腠理閉密，陽氣鬱結，不能散越，佛熱內作故也。瘡瘍皆爲火熱，而反腐出膿水者，猶穀肉果菜熱極則腐爛而潰爲污水也。潰而腐爛者，水之化也。癰淺而大疽深而惡，熱勝血則爲癰膿也。瘍有頭小瘡也，疹浮而小癰疹也。瘤氣赤瘤丹熯，熱勝氣火之色也。

入近火氣，微熱則癢，熱甚則痛，附近則灼而爲瘡，皆火之用也。或癢痛如鍼輕刺者，猶飛進火星灼之然也。癢者，美疾也，灸之以火，漬之以湯，而癢轉甚者，微熱之所使也。因而癢去者，熱令皮膚縱緩，腠理開通，陽氣得泄而熱散也。或夏熱皮膚痒，以冷水沃之不去者，寒能收斂，腠理閉密，陽氣鬱結，不能散越，佛熱內作故也。痒得爬而解者，爬爲火化，微則亦能令痒，甚則痒去者，爬令皮膚辛辣而屬金化，辛能散，故金化見則火力分而解矣。或云痛爲實，痒爲虛者，非謂虛爲寒也，正謂熱之微甚也。或疑瘡瘍皆屬火熱，而反腐爛出膿水者，何也？猶穀肉果菜，至於極熱，則腐爛而潰爲污水也。潰而腐爛者，水之化也，所謂五行之理，過極則勝己者，反來制之，故火熱過極則反兼於水化，又如鹽能固物，令不腐爛者，鹹寒水化，制其火熱，使不過極，故得久固也。萬物皆然。

元李杲十書

○總論

膏粱之變，亦是滋味過度，榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。榮氣者，胃氣也，飲食入於胃中，先輸於脾而朝於肺，肺朝百脈，次及皮毛，先行陽道，下歸五臟六腑，而氣口成寸矣。今富貴之人，不知其節法，酒肥羊雜，以厚味積久太過，其氣味俱厚之物，乃陽中之陽，不能走於空竅，而先行陽道，今反行陰道，則濕氣大盛，子令母實，火乃大旺，實熱既盛，必來剋腎，若不慎房事，損其真水，則水泛而濕熱之化上行，其瘡必出背上及腦，此爲大疔之最重者。若毒氣出肺，或脾胃之部分，毒之次也。若出於他經，又其次也。濕熱之毒所止處，無不潰爛，故經言膏粱之變，足生大疔，受如持虛者，如持虛器以受物，則無不受矣。治大疔之法，必當瀉其榮氣，以標本言之，先受病爲本，非苦寒之劑爲主，爲君

劑治之，須戒酒數日。

金劉完素六書

○總論

瘡瘍者，火之屬，須分內外以治其本。內經曰：「膏粱之變，足生大疔，其原在裏，發於表也。」受持如虛，言內結而發諸外，未知從何道而出，皆是從虛而出也。假令太陽經虛，從背而出，少陽經虛，從鬢而出，陽明經虛，從髀而出，督脈經虛，從腦而出，經曰：「地之濕氣，感則害人皮膚筋脈，其在外盛則內行，若其脈沉實，當先疎其內以絕其原也。其脈浮大，當先托裏，恐氣傷於內也。有內外之中者，邪氣至盛，遏絕經絡，故發癰腫。」經曰：「榮氣不從，逆於肉裏，乃生癰疽。」此因失托裏及失疎通，又失行榮衛也。治瘡之大要，須明托裏、疎通、行榮衛三法。托裏者，治其外之內，疎通者，治其內之外，行榮衛者，治其中也。內之外者，其脈沉實，發熱煩躁，外無掀赤痛，其邪氣深於內也，故先疎通以絕其原。外之內者，其脈浮數，掀腫在外，形證外顯，恐邪氣極而內行，故先托裏。內外之中者，外無掀惡之氣，內亦臟腑宣通，知其其在經，當和榮衛也。用此三法之後，雖未差，必無變證，亦可使邪氣峻減而易痊愈。故經曰：「諸痛痒瘡瘍皆屬心火。」又曰：「知其要者，一言而終，不知其要，流散無窮。」

素問云：「痛痒瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核怫鬱，甚者皆熱，五臟不和，九竅不通，六腑不和，留結爲癰。近於火氣，微熱則痒，熱甚則痛，附近則灼而爲瘡，皆火之用也。」人之瘡腫，因內熱外虛所生也，爲風濕之所乘，則生瘡腫。然肺主氣，候於皮毛，脾主肌肉，氣虛則膚腠開，爲風濕所乘，脾氣濕而內熱，即生瘡也。腫者，由寒熱毒氣客於經絡，使血澀而不通，壅結成腫，風邪不作，即無頭無根，寒血相搏，作者即有頭有根，壅盛則爲膿，赤根腫則風氣流潰也。瘡以痛痒痛則爲實，痒則爲虛，非虛爲寒也。正謂熱之微甚也。痒則美疾也。故火旺於夏，而萬物蕃鮮榮美也，灸之以火漬之以湯，而其痒轉甚者，微熱之所使也。痒去者，謂熱令皮膚縱緩，腠理開通，陽氣得泄，熱散而去，或夏熱皮膚痒，而

復，透散除濕散鬱，使胃氣和平。如或未已，再煎半料飲之如大便，祕及煩熱，少服黃連湯。如微利及煩熱已退却與復煎散半兩。如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也。然世俗多用排膿內補十宣散若用之於些小瘡與冬月時令即可，若潰瘍於夏月用之，其桂朴之溫散，佐以防風白芷，吾恐雖有參芪難為倚仗。瘡先發為腫，氣血鬱積，蒸肉為膿，故其痛多少，瘡之始作時也。膿潰之後，腫退肌寬，痛必漸減而反痛者，此為虛，宜補。亦有穢氣所觸，宜和解，風寒逼者宜溫散。

加味十全湯，治癰疽後補氣血，進飲食，實為切要。蓋膿血出多，陰陽兩虛，非此藥何以回生起死？惜其不分經絡，不載時令，又在識者觸類而長之，今之外科，於瘡瘍腫平痛寬，遂以為安，漫不加省，往往於結痂後兩三月，或半年，虛證乃見，醫者不察，病者不悟，無補益調養之功，因而轉成他病者，惜哉！予治一士夫，因腳弱求診，兩手俱浮，洪稍鼓，飲食如常，惟言問不答，肌上起白屑如麩片，時在冬月，予作極虛處治，詢其弟，乃知半年前曾於臂背腿三處，自夏至秋冬，節次生疽，率用五香連翹湯十宣散與之，今結痂久矣，予為作參芪白朮當歸膏，以二陳湯化飲之，三日後盡藥一斤，白屑沒者大半，病者自喜，呼吸有力，補藥應效以漸，而病家反怨藥不速，應自作風病論治，煉青礞石二錢半，以青州白丸子作料，煎飲子，頓服之，予諫之不聽，因而不救，書以警云。

○痛證

諸瘡痛不可忍者，用苦寒藥加黃連黃芩，詳上下根梢用及引經藥則可。又云，諸瘡以當歸黃連為君，連翹甘草黃芩為佐。

諸痛痒瘡瘍屬火，若稟受壯盛，宜四物加大承氣湯下之。

若性急面黑瘦血熱之人，因瘡而痛，宜四物加黃連黃芩大力子甘草。在下焦者，加黃蘗。若肥胖之人，生瘡而痛，乃是濕熱，宜防風羌活荆芥白芷蒼朮連翹，取其風能勝濕。

諸瘡藥膿窠治熱燥濕為主，用無名異，乾疥開鬱為主，用茱萸。

不能除其苦楚疼痛也。諸瘡瘍有痛，往往多以乳香沒藥，雜以芳香之藥止之，必無少減之理，此其悞也。若使經絡流通，臟腑中去其壅滯，必無痛矣。痛則以苦寒之劑除之，無不愈者。瘡瘍食肉，與自殺無異，法當瀉氣而反補之故也。

①用藥加減法

發背疔腫膿潰，前後虛而頭痛者，於托裏藥內，加五味子。恍惚不甯，加人參茯神。虛而發熱者，加地黃苦蕒根。潮熱者，加柴胡地骨皮。渴不止者，加知母赤小豆。虛煩者，加枸杞天門冬。自利者，加厚朴。膿多者，加當歸川芎。痛甚者，加芍藥乳香。肌肉遲生者，加白藜官桂。有風邪者，加獨活防風。心驚悸者，加丹砂。口目瞶動者，加羌活細辛。嘔逆者，加丁香藿葉。痰多者，加半夏陳皮。

朱震亨心法

①總論證治

癰疽只是熱勝血。

六陽經六陰經，有多氣少血者，有少氣多血者，有多氣多血者，不可一概論也。若夫要害處近虛怯薄處，前哲已曾論及，惟分經之言，未聞諸經，惟在陽厥陰經生癰疽，理宜預防，以其多氣少血，肌肉難長，瘡久未合，必成死證，遂用驅毒利藥，以伐其陰分之血，禍不旋踵。

陽滯於陰，脈浮洪弦數，陰滯於陽，脈沉細弱濇，陽滯以寒治之，陰滯以熱治之。

人中年以後，不可生癰，纔有痛腫，參之脈證，但見虛弱，便與滋補氣血，可保終吉。若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥，虛虛之禍，如指諸掌。

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百六十

外科癰疽疔毒門二

元齊德之外科精義

①診候入式法

夫醫者，人之司命也。脈者，醫之大業也。蓋醫家苟不明脈，則如冥行索途，動致顛覆矣。夫大方脈婦人小兒風科，必先診視後，對證處藥，獨瘡科之流，多有不診其脈候，專攻治外，或有證候疑難，別召方脈診察，於瘡科之輩，甘當淺陋之名，噫！其小哉如是！原夫瘡腫之生，皆由陰陽不和，氣血凝滯，若不診候，何以知陰陽勇怯，血氣聚散耶？由是觀之，則須信療瘡腫於診候之道，不可闕也。歷觀古今治療瘡腫方書甚多，其間診候之法，略而未詳，比夫諸科，甚有滅裂，愚雖不才，輒取黃帝素問、難經、靈樞甲乙及叔和仲景扁鵲華佗千金外臺聖惠總錄古今名醫諸家方論之中，診候瘡腫之說，簡編類次，貫成篇帙，首載診候入式之法，次論血氣色脈參應之源，後明脈之名狀，所主證候及瘡腫逆從之方，庶使爲瘡腫科者，覽此則判然可曉，了無疑滯於胷次，一朝臨疾診候至此，則察逆從，決成敗，若黑白之易分耳。

②榮衛色脈參應之法

蟲瘡如癬狀，退熱殺蟲爲主，蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺蟲。樟腦松香頭上，多加黃連方解石蛇牀，定痒殺蟲。松皮炭主膿腫，多者加白芷。開鬱痛多加白芷方解石，蟲多加藜蘆螫痒多加枯礬，陰囊瘡加茱萸，濕多香油調，乾痒出血多加大黃黃連猪脂調，紅色加黃丹，青色加青黛，蟲多加錫灰蕪荑檳榔。

③疔瘡

疔用針刀鏃破頭上，以蟾酥敷之，後用菘豆野菊菊莎末酒調，飲醉睡覺，卽定痛熱除，不必去疔，自愈也。治一切疔瘡，用紫梗菊花根莖葉皆可，研碎取汁，滴口中飲之。

考於經脈有三部，寸關尺也。從魚際至高骨，却行一寸，曰寸。從寸上一分，曰魚際。從寸至尺，曰尺澤。寸後尺前，爲關。關前爲陽，卽寸口也。關後爲陰，卽尺脈也。陽出陰入，以關爲界。寸主上焦，頭手皮毛。關主中焦，腹及腰。尺主下焦，小腹及足。此三部所主之大略也。左右兩手三部，謂之六脈也。又有人迎氣口神門，所主又各不同。蓋左手關前曰人迎，右手關前曰氣口，兩關之後一分，卽曰神門。故脈法讚曰：「肝心出左肺脾出右，腎與命門俱出尺部。魂魄穀神皆見寸口，所謂左手關前，心之部也。其經手少陰與手太陽爲表裏，小腸合爲腑。左手關上，肝之部也。其經足厥陰與足少陽爲表裏，膽合爲腑。左手關後，腎之部也。其經足少陰與足太陽爲表裏，膀胱合爲腑。右手關前，肺之部也。其經手太陰與手陽明爲表裏，大腸合爲腑。右手關上，脾之部也。其經足太陰與足陽明爲表裏，胃合爲腑。右手關後，命門之部也。其經手厥陰與手少陽爲表裏，三焦合爲腑。此謂六部所主臟腑十二經之義也。」又脈要精微論曰：「尺內兩旁則季脅也。尺外以候腎，尺裏以候腹中附上，左外以候肝，內以候膈，右外以候胃，內以候脾。上附上，右外以候肺，內以候胷中，左外以候心，內以候亶中。前以候前後，後以候後。上竟上者，胷喉中事也。下竟下者，小腹腰股膝脛足中事也。粗大者，陰不足，陽有餘爲熱中也。來疾去徐，上實下虛爲厥顛疾，來徐去疾，上虛下實爲惡風也。故中風者，陽氣受也。有脈俱沉細數者，少陰厥也。沉細數散者，寒熱也。浮而散者，爲胸仆。諸浮而數者，皆在陽爲熱。其有躁者，在手脈諸細而沉者，皆在陰，則爲骨痛。其有靜者在足，數動一代之者，病在陽之脈也。洩及便膿血，諸過者切之，澇者陽氣有餘也，滑者陰氣有餘也。陽氣有餘爲身熱無汗，陰氣有餘爲多汗身寒。陰陽有餘，則無汗身寒，推而外之，內而不外者，有心腹積也。推而內之，外而不內者，身有熱也。推而上之，上而不下者，腰足清也。推而下之，下而不上者，頭項痛也。按之至骨，脈氣少者，腰脊痛而身有痺也。已上諸疾，若非指明心了，烏可得而盡其妙也。」又平人氣象論曰：「一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息，脈行五動，閏以太息，不大不小，不長不短，不滑不澀，不浮不沉，不遲不數，命曰平人。平人者，不病也。蓋平人之常氣，稟乎胃，胃氣者平人之常氣也，所以人常稟氣於胃，故脈以胃氣爲本也。」正理論曰：「穀入於胃，脈道乃行合。」靈樞經云：「胃爲水穀之海也。」又曰：「脈應四時曰平。」

夫天地之道曰陰與陽，陰陽在人曰血與氣。蓋血者榮也，氣者衛也，榮者榮於中，衛者衛於外，所以榮行脈中，衛行脈外，脈者，血氣之先也，血非脈則焉能榮於中，氣非脈則焉能衛於外，二者相資而行，內則通於五臟六腑十二經絡，外則濡於九竅四肢百節萬毛，晝夜循行如環無端，以成其度，會於寸口，變見於脈，故曰氣血者，人之神也，脈者，氣血之神也，所以治病之始，五決爲紀，蓋五決者，五臟之色脈也，脈應於內，色應於外，其色之與脈，當相參應，故曰能合色脈，可以萬全也。凡爲醫先須調明色脈，若於此不精，雖聰慧辯博，亦不足委也。

⑤論持手訣消息法

夫診候脈法，常以平旦爲紀，陰氣未散，陽氣未動，飲食未進，血氣未亂，經脈未隆，絡脈調勻，故乃可診有過之脈。若遇倉卒患病，不拘此論，內經所謂持脈有道，以虛靜爲保，但可澄神靜慮，調息凝心，視精明，察五色，聽音聲，問所苦，方始按寸尺，別浮沉，以此參照，可決生死之分矣。復觀患人身形長短肥瘦，老少男女，性情緩急，例各不同，故曰形氣相得者生，三五不調者病。謂如室女尼冠脈當濡而弱，嬰兒孺子之脈細而疾，三四歲者呼吸之間脈當七八至爲平，比夫常人特不同耳。大抵男子先診左手，女子先診右手，男子左脈大則順，女子右脈大則順。大凡診脈先以中指揣按掌後高骨，骨下爲關，得其關位，然後齊下左右兩指，若臂長人疎排其指，若臂短人密排其指，三指停穩，先診上指曰寸口，浮按消息之中，按消息之上，竟消息之下，竟消息之推而外之消息之推而內之消息之，然後先關後尺消息之一類此。若診得三部之中，浮沉滑澀遲疾不調，何病所主，外觀形色，內察脈候，參詳處治以忠告之，不可輕言談笑，亂說是非，左右瞻望，舉止忽略，此庸醫也。

④三部所主腑臟病論

夫診候之道，醫者之難精也，若非燈下辛苦，勤於記誦，參師訪友，晝夜不遑，造次顛沛，寤寐俯仰，存心於此，安能知神聖之妙哉？古人曰：「按其脈，知其疾，命曰神，以悟其探，隨索隱之妙也。」又曰：「一切其脈，治其病，謂之巧，以明其言，則之力也。」蓋三指相去毫釐之近，生病若千里之意，視夫指別之力，世人固以爲難，命曰神，豈容易可至哉？

浮脈之診，浮於指下，按之不足，舉之有餘，再尋之，狀如太過，警警然見於皮毛間，其主表證，或爲風，或爲虛，浮而大散者，心也。浮而短濇者，肺也。浮而數者，熱也。浮數之脈，應發熱，其不發熱而反惡寒者，瘡疽之謂也。

洪脈之診，似浮而大，舉按皆泛泛然，滿三部，其狀如水之洪流，波之湧起，其主血實積熱，瘡腫論曰：脈洪大者，瘡疽之病進也。如瘡疽結膿未成者，宜下之。膿潰之後，脈見洪大，則難治，若自利者，不可救治也。

滑脈之診，實大相兼，往來流利如珠，按之則累累然滑也。其主或爲熱，或爲虛，此陽脈也。瘡疽之病，膿未潰者，宜內消也。膿潰之後，宜托裏也。所謂始爲熱而終爲虛也。

數脈之診，按之則呼吸之間，動及六至，其狀似滑而數也。若浮而數，則表熱也；沉而數，則裏熱也。又曰：諸數爲熱。仲景曰：「脈數不時見，則生惡瘡也。」又曰：「肺脈洪數，則生瘡也。」診諸脈洪數者，裏欲有膿結也。

散脈之診，似浮而散，按之則散而欲去，舉之則大而無力，其主氣虛而血虛，有表無裏，瘡腫膿潰之後，而煩痛尙未痊退者，診其脈洪滑粗散，難治也。以其正氣虛而邪氣實也。又曰：「肢體沉重，肺脈大則斃。」謂浮散者也。

芤脈之診，似浮而軟，按之中央空，兩邊實，其主血虛或爲失血，瘡腫之病，診得芤脈，膿潰後，易治，以其脈病相應也。長脈之診，按之則洪大而長，出於本位，其主陽氣有餘也。傷寒得之，欲汗出自解也。長而緩者，胃脈也。百病皆愈，謂之長則氣治也。

牢脈之診，按之則實大而弦，且沉且浮，而有牢堅之意。若癰癧結腫，診得牢脈者，不可內消也。

實脈之診，按舉有力而類結曰實。經曰：「邪氣勝則實，久病則虛。」人得此最忌，瘡疽之人得此宜急下之，以其邪氣與臟腑俱實故也。

弦脈之診，按之則緊而弦，其似緊者爲弦，如按弦而不移，緊如內繩而轉動，以此爲異。春脈浮弦而平，不時見則爲飲爲痛，主寒主虛。瘡疽論曰：「弦洪相搏，外緊內熱，欲發瘡疽也。」

緊脈之診，似弦而緊，按之如繩而轉動，其主切痛積癰也。瘡腫得之，氣血沉濇也，亦主痛也。

一信夫四時之脈，皆以胃氣爲本，謂春弦夏洪，秋毛冬石。春之脈微弦曰平，餘皆倣此。逆四時則病矣。若診婦人之脈，妊身則慎勿亂投湯散，其婦人之脈，診得少陰脈動甚，則有子也。又曰：「陰搏陽別，別有子也。」又曰：「身汗而無脈者，卽有妊也。治重身者，問其月事，觀其體貌，然後主治，不可忽也。」又經曰：「察色按脈，先別陰陽。」蓋陰陽者，天地之道也。是以治病者，必求其本。本於陰陽，寒暑四時五臟之根也。以脈言之，則浮沉也。以部言之，則尺寸也。經故云：脈者陰陽之法，以應五臟。是謂呼出心與肺，吸入腎與肝，呼吸之間，脾受穀味，其脈在中也。以浮沉論之，則曰浮者陽也，沉者陰也。應在臟腑，則浮而大散者心也，浮而短濇者肺也，所以心肺俱浮也。牢而長者肝也，按之而大舉指來實者腎也，所以肝腎俱沉也。遲緩而長者脾也，脾爲中州，所以脈在中也。仲景曰：「大浮數動滑，皆陽也。沉濇弱弦微，皆陰也。陽者熱也，陰者寒也。所以寒則脈來沉而遲，熱則脈來浮而數。故曰：諸數爲熱，諸遲爲寒，無如此驗也。」脈經曰：「諸浮爲風，諸緊爲痛，諸伏爲聚，諸弦爲飲，芤者失血，長則氣治，短則氣病，濇則煩心，大則病進，浮爲在表，沉爲在裏，遲爲在臟，數爲在腑。又形壯脈細，少氣不足以息者危，形瘦脈大，胃中氣多者斃，形氣相得者生，三五不調者病，三部九候皆相失者死。此先聖診脈之大法也。故曰：凡治病則察其形氣色澤治之，無後其時也。所以形氣相得者生，色澤以浮者病易已，脈從四時者可治，脈弱以滑者是有胃氣，此皆易治也。若形氣相失，或色天不澤，及脈逆四時，或脈實益堅，皆不可治。經所謂必察四難而明告之。又若病熱脈靜，泄而脈大，脫血脈實，汗後脈躁，此皆難治也。若瘡疽之人，膿血大泄，脈滑數者，難治也。凡出膿多，或如清泔，脈滑大散寒熱發渴者，治之無功也。若患肺瘡者，欬嗽膿血，脈見洪滑，治之難痊矣。大凡診脈見浮數，應當發熱而反惡寒，雖頭項拘急，四肢煩痛，或復戰慄渴甚者，但有痛處，欲發瘡腫也。

⑤脈證名狀二十六種所主病證

夫脈之大體，二十六種，此診脈之紀綱也。細而論之，毫釐少差，舉治必遠。總而言之，逆從虛實陰陽而已。兩者議之，

促結者，難治而况見代脈乎？

動脈之診，見於關上無頭尾如豆大，厥厥然而動搖者是也。脈經曰：「陰陽相搏，故謂之動。動於陽則陽氣虛而發厥，動於陰則陰氣虛而發熱，是陽生於尺而動於寸，陰生於寸而動於尺，不可不辨也。」

④三部脈所主證候

夫寸關尺者，脈之位也。浮沉滑濇，脈之體也。莫位分體指文語證者，診脈之要道也。脈經曰：「大凡診候兩手三部脈滑而遲，不浮不沉，不長不短，去來齊等者，無病也。」

寸口脈浮者，傷風也。緊者，傷寒也。弦者，傷食也。浮而緩者，中風也。浮而數者，頭痛也。浮而緊者，膈上寒，脅下冷飲也。沉而緊者，心下寒而積痛，沉而弱者，虛損也。緩而遲者，虛寒也。微弱者，血氣俱虛也。弦者，頭痛心下有水也。雙弦者，兩脅下痛也。偏絕者，不遂也。俱絕者，不治也。澹澹如羹上肥者，陽氣微也。連連如蜘蛛絲者，陽氣衰也。

關主中焦胃腹中事，去來徐而緩者，無病也。浮者，腹滿而不欲食，胃虛脹也。滑者，客熱在胃也。數者，熱結中焦也。沉伏者，中焦水氣或嘔逆而吞酸也。弱者，胃氣虛也。雖有虛熱，不可大攻，須防熱去則生寒也。牢而實者，腹滿響響，噎塞而不通，或復大痛澀者，氣逆也。芤則瀉血，濇堅大實，按之不減而有力者，中焦實有結伏在胃也。微浮者，積食不消，虻動心悸也。

尺主下焦腰腎膝脛足中事也。尺脈浮者，風熱小便難也。沉者，腰背痛而腎氣不足。數者，臍下熱痛，小便赤色而惡寒也。遲者，下焦寒而陰虛也。緊者，臍下小腹急痛也。緩者，腳弱下腫而痿痺也。弱者，下冷而腎氣衰也。軟者，脚不收而風痺小便難也。伏者，小腹痛而疝瘕穀不化也。細者，泄泄而下冷也。芤者，小便澀而血下虛也。牢而小者，足膝痿痺，脚下隱隱疼痛也。細而急者，筋攣不能行也。來而斷絕者，男子小腹有滯氣也。婦人月水不利也。

⑤三部脈所主雜病法訣

夫三部之中，俱見一脈，所主雜病，略而言之。脈經曰：「陽邪來見浮洪，陰邪來見微細，水穀之邪來見實堅，寒癖之

瀉脈之診，按之則散而復來，舉之則細而不足，脈瀉則氣瀉也，亦主血虛。瘡腫潰後，得之無妨也。

短脈之診，按舉則不及本位。內經曰：「短則氣病。」以其無胃氣也。諸病脈短，皆難治也。瘡腫脈短，真氣短也。

細脈之診，按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕，舉之如無而似有，細而微，其主亡陽衰也。瘡腫之病，脈來細而沉時直者，裏虛而欲變證也。

微脈之診，按之則軟小而極微，其主虛也。真氣復者生，邪氣勝者危。瘡腫之病潰後，脈微而勻，乃為瘥也。

遲脈之診，按舉來遲，呼吸定息，方得三至，其狀似緩而稍遲，痼疾得之則善，新疾得之則正氣虛憊，瘡腫得之潰後自痊。

緩脈之診，按舉似遲，而稍駛於遲。仲景曰：「陽脈浮大而濡，陰脈浮大而濡，陰陽同等謂之緩。脈見長緩，百疾自瘳。凡諸瘡腫潰後，其脈瀉遲緩者皆易愈，以其脈候相應，是有胃氣也。」

沉脈之診，舉之不足，按之方見，如爛綿，其主邪氣在臟也。水氣得之則逆，比陰脈也。瘡腫得之，邪氣深也。

伏脈之診，比沉而伏，舉之則無，按之至骨方得，與沉相類而邪氣益深矣。

虛脈之診，按之不足，遲大而軟，輕舉指下豁然而空。經曰：「脈虛則血虛，血虛生寒，陽氣不足也。」瘡腫脈虛，宜托裏和氣養血也。

軟脈之診，按之則如帛在水中，極軟而沉細，亦謂之濡，其主胃氣弱，瘡腫得之，補虛排膿托裏。

弱脈之診，似軟而極微，來遲而似有。仲景曰：「微弱之脈，綿綿如瀉漆之絕，其主血氣俱虛，形精不足。大抵瘡家沉遲濡弱，皆宜托裏。」

促脈之診，按之則去來數時，一止而復來。仲景曰：「陽盛則促，主熱畜於裏也，下之則和。瘡腫脈促，亦急下之。」

結脈之診，按之則往來遲緩時一止而復來。仲景曰：「陰盛則結。」經曰：「促結則生，代則死。」

飛禽之中，忌食鵝鴨鴻鷹雀鶴鴛鴦鷺鳩鴿鷓鴣及能學人言者，慎勿食之。野獸之中，忌食獐鹿狐兔虎豹熊豺，及爪牙害人有毒蟲獸，并父母自本命生屬，忌慎勿嘗啖。菜蔬之中，忌食黃瓜茄子蘭香蕓薑胡荽生菜麥芥菌瓠韭蒜葱薤，勿食之。果木之中，忌食桃杏棗栗李柰梨梅櫻桃棗紅柿櫻桃胡桃榛松林檎及諸蟲蚋未熟之果，慎勿食之。若其瘡疽膿潰腫消，氣血虛弱，則可食羊肉鵝鶩薑薑醬瓜薺蘿蔔及黃白糧米細米稀粥軟飯。若至肌肉漸生，思想滋味，則宜食白熟酥餅蠶粥羹湯，熱軟溫和，稀稠得中，製造如法，勿令太飽。此時猶忌饅頭蒸餅餛飩鯢鮓肉角煎餅，及炙博燠燠煎炒鹹酸油膩脂肥魚肉。若至肌膚欲平，惡肉去盡，瘡口收斂之際，尚忌起立行步，待賓客，房酒宴會，噴怒沐浴，登陟臺榭，運動肢體，寒暑勞倦，正宜調節飲食，保攝以待瘡癥平復，精神如故，氣力完全，萬無所忌。百日內慎勿觸犯之。

⑨論虛實法

夫瘡疽膿潰，腫毒浸展，證候危惡者，須辨虛實。况夫虛者難補，實者易瀉，補瀉之法，不可輕用，若或少差，利害甚大。然而虛實證多端，不可不辨。有瘡之虛實，有臟腑氣血上下真邪各有虛實，故不同也。分而言之，則腫起堅硬膿稠者，瘡疽之實也。腫下軟漫膿稀者，瘡疽之虛也。瀉痢腸鳴，飲食不入，嘔吐無時，手足並冷，脈弱皮寒，小便自利，或小便時難，大便滑利，聲音不出，精神不爽者，悉臟腑之虛也。大便硬，小便澀，飲食如故，腹滿膨脹，胷膈痞悶，肢節疼痛，口苦咽乾，煩躁多渴，身熱脈大，精神昏塞者，悉臟腑之實也。凡諸瘡疽，膿水清稀，瘡口不合，聚膿不赤，肌寒肉冷，自汗色脫者，氣血之虛也。腫起色赤，寒熱疼痛，皮膚壯熱，膿水稠粘，頭目運重者，氣血之實也。頭疼鼻塞，目赤心驚，咽喉不利，口舌生瘡，煩渴飲冷，睡語咬牙者，上實也。精滑不滯，大便自利，腰脚沉重，睡臥不甯者，下虛也。肩項不便，四肢沉重，目視不正，睛不了了，食不知味，音嘶色敗，四肢浮腫者，真氣之虛也。腫焮尤甚，痛不可近，積日不潰，寒熱往來，大使祕澀，小便如淋，心神煩悶，恍惚不甯者，邪氣之實也。又曰：「真氣奪則虛，邪氣勝則實。」又曰：「諸痛爲實，癢爲虛也。」又曰：「診其脈洪大而數者，實也。微細而軟者，虛也。」虛則補之，和其氣，托裏也。實則瀉之，疎利而自

邪來見弦小。又曰：「浮而滑者宿食也，短而滑者酒病也，遲而滑者脹滿也，洪而大者傷寒也，浮而數者傷風也，浮而急者飲食不消，脾不磨也，沉而弦者寒氣結而陰痛也，浮而緩者皮膚不仁也，滑而散者癱瘓也，遲而緩者寒癢也，浮而濇者霍亂也，弱而濇者反胃也，緊而滑者吐逆也，短而數者心痛也，弦而數者爲瘧也，緊而急者尸遁也，實小而堅者病在內而冷也，浮滑而緊者病在外而熱也，短而急者病在上也，長而緩者病在下也，長而弦者病在肝也，滑而洪者病在心也，微而軟者病在脾也，浮而濇者病在肺也，沉而緊者病在腎也。」又訣曰：「諸浮爲風，或爲虛也，諸緊爲痛，或爲積也，諸濇爲痹，諸弦爲飲，諸數爲熱，諸遲爲寒，芤則爲失血，軟則爲虛，若脈沉沉澤澤四肢不仁者亡祟也，或大而塌塌者社祟也，若脈來乍大乍小乍短乍長者鬼祟也。」

○將護忌慎法

大凡有瘡疽生，皆只如黍粟粒許大，其狀至微，人多不以爲急，此蘊大患，宜速辨之，不可自忽。若能防之於未形，理之於未成，或朝覺而夕治，求治於良醫，則必無危矣。若因循慢忽，詢於庸醫，致令膿血結聚，委之於命，束手待斃，不亦去道遠乎？以致筋骨敗壞，穿通臟腑死者，十有八九矣。可不慎歟！蓋患瘡疽之人，托命庸醫，任意措置，危殆立至。若用良醫，則可保痊愈。用醫之際，不可不擇，辨之何難？若能飽讀經書，久諳證候，湯藥熟嫻，洞明色脈，性情仁善，孝義忠信，臨事不惑，處治有決，方爲良醫。委用勿疑，然後要在病人自克，不可恚怒悲憂，叫呼忿恨，驕恣情性，任口腹，馳騁勞役，惟宜清靜恬澹，耐煩爲宜。於患人左右止息，煩雜切忌，打觸器物，諸惡音聲，爭辨是非，呪罵鬪毆，及產婦媵男，體氣不潔，帶酒腥羶，雞犬乳兒，孳畜禽獸，並須遠離。設或親友重意問疾者，可以預囑徐行低聲，款曲伺候，禮畢躬退，勿令嗟呀驚怪話舊，引其遊賞宴樂，遠別親戚，牽惹情懷，但恐病人心緒悽愴，尤不可亂舉方藥，徒論虛實，惑亂患人，疑滯不決，祇合方便。省問不可久坐多言，勞倦病人深不方便。夫侍患者，宜須壽近中年，情性沉厚，勤謹耐煩，仁慈智慧，全在調以粥藥，無失時節，勿令於患人左右彈指嗟咨，掩淚竊言，感激病人，甚不利便。飲食之間，忌慎非細，不可不載。畜中勿食驢馬，駝騾豬狗牛殺羊等，并雜魚龜鼈蝦蟹，及淹浼臭陳自死病倒之類，慎勿嘗

出脾中者，惟大便下膿血者自愈也。

③辨證法

夫瘡疽癰腫，其名甚多，載之紛紜，方書百緒，及至臨疾治之，無據不知，所以內經曰：「知其要者，一言而終，不知其要者，流散無窮。」愚雖不才，姑揣其要而言之。熱發於皮膚之間，是以浮腫根小，至大不過二三分者，癰也。六腑積熱，騰出於外肌肉之間，其發暴甚，腫皮光軟，侵展廣大者，癰也。五臟風積熱，攻掀於肌骨，風毒猛暴，初生一頭如痞，癰白焦枯，觸之應心者，疽也。夫癰疽發於六腑，若燎原之火，外潰膚肉，疽生五臟，沉澀難療。若陶室之燧，內消骨髓，癰則易療，惟難將息而遲痿，疽則難療，易得痊愈。夫癰與瘡初生，並宜灸之，謂其氣本浮達，以導其熱，令速暢也。疽則烙不宜灸，謂其氣本深沉，須達其原也。凡瘡疽生於外，皆由熱毒蘊於內，明乎三者，腫毒丹痧，可以類推矣。蓋皮膚微高起而肌厚，或痛或癢，移走無常者，謂之腫。有因風而得之者，有因風熱相搏而得之者，腫硬色白，因熱而得之者，腫焮色赤，因風熱相搏而得之者，久久不消，熱勝於風，若不即治，血不流通，與氣乘之，以成膿也。又曰：「風多則癢，熱多則痛。」此爲驗也。又有丹毒者，謂人身忽然變赤，如塗丹之狀，故謂之丹毒。世俗有云赤瘤，或因有瘡誤而相觸，四畔焮赤，謂之瘡瘤。凡丹毒之疾，皆遊走不定，狀如雲氣者是也。兒得之最忌，百日之內，謂之胎瘤，以其氣血嫩弱，臟腑柔脆，難任鍼針，所以忌也。又頸腋之間而生結核，初如豆粒，或如梅李核，累累相連，歷歷三五枚，久久不消，以漸長大，或發寒熱者，謂之瘰癧。有風毒者，得之於風，熱毒者，得之於熱，氣毒者，得之於氣，悉由風熱邪氣蘊結所成，證候不同，治之者亦各異矣。

④辨善惡法

夫瘡疽證候，善惡逆從，不可不辨。從來醫瘡，概舉五善七惡，殊不知此特謂腸胃之內，臟腑瘡疽所論之證也。發背腦疽，別有善惡之證，載之於後。蓋七惡者，煩躁時嗽，腹痛渴甚，或泄痢無度，或小便如淋者，一惡也。膿血既泄，腫焮尤甚，膿色敗臭，痛不可近，二惡也。目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上看，三惡也。喘粗短氣，恍惚嗜臥，四惡也。肩

導其氣。內經謂：「血實則決之，氣虛則掣引之。」

⑤辨淺深法

夫瘡候多端，欲辨淺深，直須得法。若不素知方論，而妄生穿鑿者，如大匠捨其繩墨，以意度量，安能中於規矩哉？嘗聞古人有言曰：「多則惑，少則得。」簡而論之，則瘡疽概舉有三：腫高而輒者發於血脈，腫下而堅者發於筋骨，肉皮色不相辨者發於骨髓。又曰：「凡療瘡疽，以手按搖，瘡腫根牢而大者深也，根小而浮者淺也。」又驗其人初生瘡之時，便覺壯熱惡寒，拘急頭痛，精神不甯，煩躁飲冷者，其患瘡疽必深也。若人雖患瘡疽，起居平和，飲食如故，其疾浮淺也。惡瘡初生，其頭如米粟，微似有痛癢，誤觸破之，卽焮展覺有深意，速服犀角湯及漏蘆湯通氣丸等，取通利疎暢，兼用浴毒湯湯漬之類。若浮淺者，紙貼膏求差，以此推之，淺深之辨，始終之要也。

⑥辨膿法

夫瘡腫之疾，毒氣已結者，不可論內消之法，卽當辨膿生熟淺深，不可妄開，視其可否，不至於危殆矣。凡瘡疽腫大，按之乃痛者，膿深也。小按之便痛者，膿淺也。按之不甚痛者，未成膿也。若按之卽復者，有膿也。不復者無膿也。非也。必是水也。若發腫都輒而不痛者，血瘤也。發腫日漸增長而不大熱，時時牽痛者，氣瘤也。氣結微腫久而不消，後亦成膿，此是寒熱所爲也。留積經久，極陰生陽，寒化爲熱，以此潰必多成癭，宜早服內寒散以排之。諸癭瘤疣贅等，至年衰皆自內潰，若治之於年壯，可無後憂也。又凡療癰疽，以手掩其上，大熱者，膿成自輒也。若其上薄皮剝起者，膿淺也。其腫不甚熱者，膿未成也。若患癰癧結核寒熱發渴，經久不消者，其人面色痿黃，被熱上蒸，已成膿也。至於臑腑腸胃，內瘡內疽，其疾隱而不見，目既不見，手不能近，所爲至難，可以診其脈而辨之，亦可知矣。有患胃脘癰者，當候胃脈。人迎者，胃脈也。其脈沉細者，氣逆則甚，甚則熱聚胃口而不行，胃脘而爲癰也。若其脈洪數者，膿已成也。設脈遲緊，雖膿未就，已有瘀血也。宜急治之，不爾，則邪毒內攻，腐爛腸胃，不可救也。又肺癰論曰：「始萌則可救，膿成卽死不可不慎也。久久效膿如粳米粥者不治，嘔膿而止者，自愈也。」又腸癰論曰：「或遶臍生瘡，膿從瘡出者，有

之類。其有勢力微者，是使羸瘦之人，敵其勇夫，不亦難乎！又有粗工不審逆從，便用寒藥敷貼，趁逐邪毒，復入於內，歸於肝心，十死八九矣。大抵敷貼之法，欲消散腫毒，血脈疎通，寒熱逆從斷其去就焉。苟使執方無權，安能散其鬱結，欲不成膿得乎？其腫皮厚者，以故軟布，或以紙花子塗藥敷貼之，待其藥乾，換腫皮薄者，即用疎紗或薄紙塗藥敷貼之，其藥未乾，即當換之。若至膿潰之後，即貼溫肌生肉膏藥，要在逐臭腐，排惡汁，取死肌生良肉，全藉溫熱膏劑之力也，切勿用寒涼之藥水調貼之。夫血脈喜溫而惡寒，若著冷氣遏之，即血滯難瘥矣。

㊟ 湯漬法

夫湯漬瘡腫之法，宜通行表，發散邪氣，使瘡內消也。蓋湯水有蕩滌之功，古人有論瘡腫初生，經一二日不退，即須用湯水淋射之，其在四肢者，湯漬之，其在腰腹背者，淋射之，其在下部委曲者，浴漬之，此謂疎導腠理，通調血脈，使無凝滯也。且如藥二兩，用水二升，為則煎取一升半，以淨帛或新綿蘸藥水稍熱，漬其患處，漸漸淋浴之，稍涼則急令再換，慎勿冷用。夫血氣得寒則凝澀，得熱則淖澤，日用五七次，病甚者日夜不住，或十數次，腫消痛止為驗，此治瘡腫神良之法也。

㊟ 針烙法

夫瘡疽之疾，證候不一，針烙之法，實非小端，蓋有淺有深，有遲有速，宜與不宜，不可不辨。蓋疽腫皮厚口小，腫多膿水出不快者，宜用針烙。癰皮薄，惟用針以決其膿血，不可烙也。如未成膿已前，不可以諸藥貼熨湯漬救療，以待自消，久久不消，內潰成膿，即當棄藥，從其針烙，當用大針如似火筋，磨令頭尖，如棗核樣，圓滿用燈焰燒，須臾作炬數搥，油燒令赤，於瘡頭近下烙之一烙不透，即須再烙令透，要在膿水易出，不假按抑。近代良醫倉卒之際，但以金銀鐵錠，其樣似針者，可通用之，實在洩其毒也。或以木炭然火，猛燒通赤，蘸油烙之，尤妙。烙後實者，撚髮為紙，虛者以紙為紙，於紙上蘸藥，紙之上，以帛攤溫熱軟粘膏藥貼之，常令滋潤，勿令燥也。夫瘡疽既作毒熱聚攻，蝕其膏膜，肌肉腐爛，若不針烙，毒氣無從而解，膿瘻無從而泄，過時不烙，反攻其內，內既消敗，欲望其生，豈可得乎？嗟乎！此疾

背不便，四肢沉重，五惡也；不能下食，服藥而嘔，食不知味，六惡也；聲嘶色敗，脣鼻青赤，面目四肢浮腫者，七惡也。動息自甯，飲食知味，一善也；便利調勻，二善也；膿潰腫消，水鮮不臭，三善也；神彩精明，語聲清亮，四善也；體氣和平，五善也。病有證合七惡，皮急緊而如善者，病有證合五善，而皮緩虛如惡者，夫如是者，豈淺識之所知哉？只知五善併至，則善無以加矣，七惡併至，見惡之極矣。愚意裁之，凡患瘡疽之時，五善之中，乍見一二善證，瘡亦回也；七惡之內，忽見一二惡證，宜深懼之。大抵證候瘡疽之發，虛中見惡證者，不可救也；實證無惡候者，自愈。大凡膿潰之後，而煩疼尚未痊者，診其脈洪滑粗散者，難療；微濇遲緩者，易痊。此善惡之證，於診候之中，亦可知也。發背腦疽及諸惡瘡，別有五逆之證者，白睛青黑，面眼小，服藥而嘔，傷痛渴甚，膊項中不便，音嘶色敗者，是為五逆。其餘熱渴痢嘔，蓋毒氣入裏臟腑之傷也，當隨證以治之。

④ 砭鎌法

夫上古制砭石大小者，隨病所宜也。內經謂針石砭石鑱針，其實一也。今時用鎌者，從聖濟總錄丹毒論曰：「法用鎌割出血，一明不可緩也。又扁鵲云：『病在血脈者，治之以砭石。』此舉素問血實宜決之，又氣血形志論曰：『形樂志樂，病生於內，治之以砭石。』蓋砭石者，亦從東方來，為東方之民，其病多瘡瘍，其法宜砭石。砭石之用，自有證候，非止丹瘤也。但見腫起色赤，遊走不定，宜急鎌之。先以生油塗赤上，鎌之要在決洩其毒，然而此法不可輕用，忌其太深。內經所謂刺皮無傷肉，以其九針之用而各有所宜也。砭鎌之法，雖治瘡疽，不可輕用也。

⑤ 貼瘡法

夫瘡腫之生於外者，由熱毒之氣蘊結於內也。蓋腫於外有生頭者，有漫腫者，有皮厚者，有皮薄者，有毒氣深者，有毒氣淺者，有宜用溫藥貼瘡者，有宜用涼藥貼瘡者，有可以乾換其藥者，有可以濕換其藥者，深淺不同，用藥亦異，是以不可不辨也。若瘡腫初生，似有頭者，即當貼溫熱藥，引出其熱毒，火就燥之義也。於四畔赤焮處，搗生寒藥貼

二行，徐次諸湯漏瀆，即得內消矣。不然則治之稍慢，毒熱不散，反攻其內，致令膿血之聚也。內經詳治病，必求於本。蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也。其風邪寒氣所聚也。治之宜溫熱之劑，和血令內消也。辨之有法，須認風寒則腫，硬色白，熱毒則掀腫色赤，以爲異也。如有氣已結聚，不可論內消之法，宜用排膿托裏之藥，此皆先後之次也。

㊟ 追蝕法

夫瘡瘍生於外，皆由積熱蘊於內，內經謂血熱肉敗，榮衛不行，必將爲膿，留於節腠，必將爲敗。蓋瘡疽膿潰爛之時，頭小未破，瘡口未開，或毒氣不出，疼痛難任者，所以立追蝕膿之方法，使毒外泄而不內攻，惡肉易去，好肉易生也。若其瘡紅其血出不止者，則未可紅，於瘡上糝追蝕之藥，待其熟可紅方紅。若其瘡紅之痛應心根者，亦不可以強紅之，悞觸其瘡，其熾痛必倍，變證不無，不可不慎也。若瘡癰膿成未破，於上薄皮剝起者，即當用破頭代針之劑安其上，以膏貼之，膿出之後，用搜膿化毒之藥，取效如神矣。若膿血未盡，便用生肌斂瘡之劑，欲其早愈，殊不知惡不盡，其瘡早合，後必再發，不可不慎也。

㊟ 托裏法

夫瘡疽丹腫結核，癰癧初覺有之，即用內消之法，經久不除，氣血漸衰，肌寒肉冷，膿汁清稀，毒不出瘡，口不合成，聚腫不赤，結核無膿，外證不明者，並宜托裏。膿未成者，使膿早成，膿已潰者，使新肉早生。血氣虛者，托裏補之，陰陽不和，托裏調之。大抵托裏之法，使瘡無變壞之證，凡爲瘡醫，不可一日無托裏之藥。然而寒熱溫涼，煩渴利嘔，臨證宜審其緩急耳。

㊟ 止痛法

夫瘡疽之證候不同，寒熱虛實皆能爲痛，止痛之法，殊非一端。世人皆謂乳沒珍貴之藥，可住疼痛，不知臨病制宜，自有方法。蓋熱病之痛者，以寒之劑折其熱，則痛自止也。寒邪之痛，以溫熱之藥熨其寒，則痛自除矣。因風而痛者，除其風，因濕而痛者，導其濕，燥而痛者，潤之，寒而痛者，通之，虛而痛者，補之，實而痛者，瀉之，因膿鬱而閉者，開之，惡

針烙取差，實爲當理，然忌太早，亦忌稍遲。嘗見粗工不審其證淺深，妄施針烙之法，或瘡深針烙淺，毒氣不得泄，以致內潰。或瘡淺針烙深，誤傷良肉，筋骨腐爛，或抑擦掀動，益加煩痛，或針之不當，別處作頭，或即時無膿，經久方潰，遂使痛中加痛，真氣轉傷，詳其所由，不遇良醫也。以此推之，凡用醫者，不可不擇，縱常醫療之得痊者幸矣。

⑤灸療法

夫疽則宜灸，不宜烙，癰則宜烙，不宜灸，丹癰腫毒，宜湯潰之，腫皮光輒，則針開之，以泄其毒。治瘡之手法，殆不過此，而各有所宜。故聖惠方論曰：認是疽瘡，便宜灸之一二百壯，如菉豆許大，灸後覺似熾痛，經一宿，乃是火氣下徹，腫內熱氣被火導之，隨火而出，所以然也。若其瘡癢，宜隔鼓餅子灸之，其餅須以椒薑鹽葱相和爛搗，捏作餅子厚薄，如折三錢以來，當瘡頭鼓餅子上灸之，若覺太熱，即擡起，又安其上，餅子若乾，更換新者，尤佳。若其瘡痛，即須急灸，壯數多爲妙。若其膿已成者，慎不可灸，即便針開之，即得瘥也。若諸瘡經久不瘥，變成瘦者，宜用硫黃灸法灸之。其法硫黃一塊，可瘡口大小安之，別取少許硫黃於火上燒，用釵尖挑起點硫黃，令著三五遍，取膿水乾差爲度。若其發背初生，即宜上餅灸法，灸之初覺背上有瘡，疼癢頗異，認是發背，可取淨土水和捻作餅子，徑一寸厚二分，貼著瘡上，以艾作炷灸之。一炷一易餅子，其瘡粟米大時，可灸七七炷，其瘡如錢許，大日夜不住灸，以瘥爲度。已上數法，並依本方一一親驗，所以載之。愚謂瘡醫自幼至老，凡所經驗，必須寫之。嘗記疔痿惡瘡，諸醫不驗者，取蟻螬剪去兩頭，安瘡口上，以艾灸之，七壯一易，不過七枚，無不效者。又法用乞火婆蟲灸之，同前法累驗之，神效。人皆祕之，往往父子不傳。又法赤皮蒜搗爛，焊作餅子，一如豆鼓餅子灸法，灸之彌佳。

⑥內消法

夫瘡疽丹腫之生，皆由陰陽不調，榮衛凝澀，氣血不流之所生也。古人有言曰：「陽滯於陰則生瘡，陰滯於陽則生疽。」瘡疽之生，有內有外，內生於臟腑胃腹之中，外則生於膚肉筋骨之表，發無定處，夫鬱滯之本，則因血氣不流，蒸氣不能外達，留滯而成。內熱瘡宜所以生焉。若初覺氣血鬱滯，皮肉結聚，腫而未潰，特可疎滌風熱，通利臟腑，一

內消也。古今法謂切到咬咀如麻豆大以猛火急煎無令過熟欲其速利也。亦有丸散膏丹而消之者。散也。助以淋瀝調和榮衛行經絡也。更當膏潤溫養兼磨傳四畔貼爛之藥順其陰陽也。追蝕托裏汗下調補臨時制宜淺深緩急自有等差。男女貴賤亦當別論。晉尚書褚澄曰：「寡婦尼僧異於妻妾雖無房室之勞而有憂思之苦。」此深達其情者也。又仲景云：「物性剛柔餐居亦異治亦不同也。」所以黃帝與四方之間岐伯舉四治之能况病之新舊形志樂苦豈可執方無權以求其愈疾哉。亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沉細而煩悶臟腑弱而皮寒邪毒猛暴恍惚不甯外證深沉者亦宜即當用托裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之。

論五發疽

夫五發者謂癰疽發於腦背眉髻鬢是也。大概論之分爲三等：一者疽也，二者癰也，三者癤也。夫疽初生如黍米大，癢痛有異，悞觸破之即焮展四畔赤腫沉悶牽引脅肋疼痛數日之後漸覺肌膚壯熱惡寒煩渴腫暈侵展燥漿汁出積日不潰抑之則流血發於背者謂之發背疽也。其發於腦者爲腦疽也。其發於鬢眉髻者以類呼也。又有初生其狀無頭腫闊三四寸始覺注悶疼痛因循數日皮光微軟甚則亦令人發熱惡寒頭痛煩渴者謂之發背癰也。又有初生一頭色浮赤而無根腫見於皮膚之間大小一二寸者癰也。三者之候惟疽最重此疾初生皆由滋味與厚衣衣服厚暖則表易招寒滋味過多則五臟生熱臟腑積熱則血脈不流而毒氣凝滯邪氣伏留熱搏於血血聚則肉潰成瘡淺則爲癰實則爲癰深則爲疽矣。亦有因服金石發動而患此疾者亦有平生不服金石藥而亦患此疾者蓋由上祖曾服餌者其毒氣流傳子孫此病初生認是疽則宜速療之若氣實之人急服五香連翹湯漏蘆湯若年未五十少壯實者可服五利大黃湯化毒丸取通利臟腑一二行瘡頭上用追毒散之類貼溫熱膏劑更濕腫湯潰毒湯淋瀝之如此調治以待膿成已前不可以諸藥救療以安患人之心慎勿惱觸著至膿成敗潰宜服五香湯及內托裏散茯苓湯當歸托裏散之類渴不止者服竹葉黃芪湯乳香散勿爲大熱服大黃硝磺苦寒之藥若因服利藥而利不止者死矣若瘡中惡肉未退膿水不快者即用追蝕之藥或銚子紙之上用鹿角散以酢熬爲糊貼之。

肉侵潰者引之，陰陽不和者調之，經絡祕澀者利之，臨機應變，方爲上醫，不可執方面無權也。

③用藥增損法

古人用藥，因病制宜，治不執方，隨病增損，療積聚補益，可用丸藥以從舊方，不加增損。蓋瘡疽危要之際，證候多種，安有執方之論，固可臨時加減，以從其法，只如發背腦疽惡疔瘡膿潰前後虛而頭痛者，於托裏藥內加五味子、恍惚不甯，加人參、茯苓、虛而發熱者，加地黃、苦蕒根。往來寒熱并潮熱者，加柴胡、地骨皮、渴不止者，加知母、赤小豆。大便不通者，加大黃、芒硝。小便不通者，加木通、燈草。虛煩者，加枸杞子、天門冬。自利者，加厚朴。四肢厥逆者，加附子、生薑。嘔逆者，加丁香、藿香。多痰者，加半夏、陳皮。膿多者，加當歸、川芎。痛甚者，加沒藥、乳香。肌肉遲生者，加白朮、官桂。有風邪者，加獨活、防風。心驚怯者，加丹砂。口目瞤動者，加羌活、細辛。愚雖不才，自幼及老，凡治瘡疽，常依此法加減用藥，取效如神。後之學者，宜細詳焉。

④權變通類法

夫瘡疽之病，治療多方，總而論之，各有所宜。補瀉淋瀝，及敷掃貼熨，針鎌灸烙，用之不同。蓋知其道者，舉治必效。昧於理者，利害不無嘗見。以寒療熱，以熱療寒，古今之通論也。又有檢方療病，妄製加減，以意裁之，目以爲可，殊不知病有逆從，治有緩急，法有正權，方有奇偶，用有輕重。夫醫者意也，得其意然後能變通也。達其變通者，悟其道而省其理也，則左右逢其源矣。愚雖不才，略陳萬一，嘗見治寒以熱而寒彌甚，治熱以寒而熱彌熾者，何也？蓋不知五臟有陰陽之性，其可因其類而取之也。假如心實生熱者，當益其腎，腎水滋足，熱將自除，腎虛水寒，當補心火，心火既降，寒將自除。此所謂寒之而熱者取之，陰熱之而寒者取之，陽也。又寒因熱用，熱因寒用，要在通其理類而已。又聞微者逆之，甚者從之，何謂也？蓋治寒以熱，必涼而行之，治熱以寒，必溫而行之，此亦欲其調和也。其間有正有權者，何也？蓋病有微有甚，微者逆治，理之正也，甚者從治，理之權也。然爲瘡科於補瀉汗下，標本逆從正權之理，烏可闕

明戴思恭證治要訣

○癰疽疔毒證治

發散諸般毒，多碾白芙蓉葉入草烏葉少許蜜調傅。重者，加入兩星末。凡諸毒用膏藥欲散，搓入麝香，欲潰，搓入雄黃。

一應毒證已作渴，或膿過多，防其爲渴，宜於千金內補散之外，兼進八味丸，用五味者佳。

發熱惡寒，狀如傷寒而痛者，其痛處欲爲癰疽，癰屬腑，故生淺，皮薄而腫高，疽屬臟，故生深，皮厚而腫墜。又有輕於癰疽者，名曰癰毒，癰壅也，疽沮也，癰節也。言氣血壅滯沮節也。並威靈仙飲微利之。或五香連翹散，佐以復元通氣散。若膿血結成，不可發散，已潰未潰，宜小托裏散，或千金內補散，加木香羌活白芍藥烏藥等分，渴加苦蕒根。此數藥皆治陽證。若陰證，宜於千金內補散減防風桔梗之半，倍加白朮，未效更加熟附，與諸藥煎服，尤佳。

外有服金石以助欲，至精氣既衰，藥毒偏勝，金石與肺同類，肺附於腎，所以多成發背之疾。又有用髓爲膿，亦治發背。蓋髓之陽氣皆聚於上甲，所以上甲可入藥也。治法同前。若毒發於陰，而又未可用附桂諸藥劑，外疹內寒，宜五香湯。

毒之初發，並宜酒調復元通氣散。或病在下者，酒糊丸通氣散，却欲木香湯吞下。

治諸毒方結成者，以皂角樹上所生之甚磨烏酢調塗，此甚須預藏在煙閣頭，緩急取用。

患背瘡人，及諸毒已潰後，血去過多，津液少者，宜換肌散毒，初發頭疼體痛，乍寒乍熱，恐挾外邪，宜香蘇飲，加川芎白芷防風當歸陳皮之類。

病消渴之人，多生毒，此乃津液已耗，虛陽外發，內外俱虛，此爲極病。凡消渴愈後生毒，毒愈後消渴，皆非可治之病也。

惡肉退去，好肉漸生，即用搜膿散翠霞散之類，紐之。若瘡中毒氣未盡，慎勿早斂，若早上生肌之藥，縱得平復，必再發，其間調理次第，臨時制宜，兼將護忌慎之法耳。

㊟總論

夫瘡腫之患，莫大乎癰疽，然而癰疽何以別之？經所謂榮衛稽留於經脈之中，則澀不行，血脈不行，則陽氣鬱遏而不通，故生寒熱穢毒之氣，騰出於外，畜結爲癰，久而不散，熱氣乘之，腐化爲膿，然而骨髓不焦枯，腑臟不傷敗，可治而愈也。何爲疽？五臟風毒積熱，毒熱熾甚，下陷肌膚骨髓皆枯，血氣涸竭，其腫色天，堅如牛領之皮，故命曰疽。癰者其腫皮薄以澤，此其候也。癰疽之生，有內有外，內生胃腹臟腑之中，外生膚肉筋骨之表，凡此二毒發無定處而有常名。夫鬱滯之本，始於喜怒憂樂，不時飲食，居處不節，或金石草藥之發動，寒暑燥濕之不調，內使陰陽之不平而蘊結，外使榮衛凝澀而腐潰，輕者起於六腑浮達而爲癰，氣行經絡而浮也，重者發於五臟沉澀而爲疽，氣行經絡而沉也。明乎二者，腫毒丹疹可以類推矣。

㊟疔瘡

夫疔瘡者，以其瘡形如丁蓋之狀者是也。古方論之，凡有十種，華元化載之五色疔，千金方說疔瘡有十三種，以至外臺祕要神巧萬全，其論頗同，然皆不離於氣客於經絡五臟內蘊毒熱，初生一頭腫痛，青黃赤黑無復定色，便令煩躁悶亂，或憎寒頭痛，或嘔吐心逆，以針刺瘡，不痛無血，是其候也。其候本因甘肥過度，不慎房酒，以致邪毒畜結，遂生疔瘡。內經曰：「膏梁之變，足生大疔。」此之謂也。其治之法，急以艾炷灸之，若不覺痛者，針疔四邊，皆令血出，以迴瘡錠子，從針孔紐之，上用膏藥貼之，仍服五香連翹湯漏蘆湯等，疎下之爲效。若或針之不痛無血者，以猛火燒針通赤，於瘡上烙之，令如焦炭，取痛爲效。亦紙前錠子用膏藥貼之，經一二日膿潰根出，服托裏湯散，依常療之，以取平復。如針不痛，其人眼黑或見火光者不治，此邪毒之氣入臟腑故也。養生方云：「人汗入肉食之，則生疔瘡。」

補之藥不能平，投以硝黃攻伐之劑亦非也。當推內經虛者補之，實者瀉之，熱者清之，寒者溫之之本旨。隨證用藥，臨機應變，庶不誤耳。大抵瘡瘍之證，皆由臟腑不和，氣血凝滯，喜怒不常，飲食不節，或腠理不密，邪氣客於經絡，或服丹石之藥，及膏粱厚味，不慎房室，精虛氣竭所致。故治其證者，當辨其表裏虛實，隨宜治之。若不推陰陽逆順，氣味攻守，率爾投藥，以致實實虛虛，或槩以王道爲萬全，猶執一而無權，適以害之矣。

靈樞經云：「癰疽不問虛實寒熱，皆由氣鬱而成。」經云：「氣宿於經絡，與血俱澀而不行，壅結而成。」此因喜怒憂思也。身有熱，被風冷搏之，血脈凝滯不行，熱氣壅結而成，此外因也。有陰虛陽氣湊襲，寒化爲熱，熱盛則肉腐爲膿，此寒熱風熱所傷也。有因服丹石炙燂麪濕牀被厚者，有因盡力房室精虛氣節者，爾雅云：「癰者節也，癰者壅也，疽者沮也。」是言陰陽不和，有所壅節，皆成癰疽也。又云：「陰滯於陽，則發癰，陽滯於陰，則發疽。」此二毒發無定處，當以脈辨之。浮洪滑數則爲陽，微沉緩濇則爲陰，陰則熱治，陽則冷治。治法有四節八事，初覺則宜消熱拔毒，已潰則宜撥膿止痛，膿毒則消惡肉，惡肉盡則長傳痂，次第既明，又須別其因以施治，觀病淺深凶吉，寒則溫之，熱則涼之，虛則補之，實則瀉之，導以鍼灼以艾，破毒潰堅，以平爲期也。

客問瘡瘍脈洪數，身作熱爲陽證，亦有死者，何也？曰：經云：「陰滯於陽，則生癰，脈見沉細弱澀，陽滯於陰，則生疽，脈見浮洪弦數。」此氣血爲證，瘡疽屬陰，屬陽之論也。彼瘡疽雖因積熱所成，若初起未成膿，脈洪數乃陰虛陽亢之證，若膿潰於內，不得發泄於外，身必發熱，故脈洪數瘡疽之病進也。膿既去，則當脈靜身涼，腫消痛息，如傷寒表證之得汗也。若反發熱作渴，脈洪數者，此真氣虛而邪氣實也，死無疑矣。

○治法三要

病機機要云：「瘡瘍者火之屬，須分內外以治其本，若其脈沉實，當先疏其內以絕其源也，其脈浮大，當先托裏恐邪氣入內也。有內外之中者，邪氣至盛，遏絕經絡，故發癰腫，此因失托裏及失疏通又失和榮衛也。」治瘡之大要，

癰疽疔毒此毒總名，亦舉其大槩耳。其他證狀不一，名稱亦異。未潰之際，憎寒壯熱，狂言妄語，如見鬼神，膿去已多，而大熱不休者，似爲難治。蓋毒之得膿，猶傷寒病證之得汗，汗已而反大熱，則爲壞傷寒矣。若淋洗貼傳，自屬外科。癰疽發背已潰，出膿過多而羸瘦者，芎歸湯。凡所服藥，並不可用白朮，能生膿故也。未潰與初發陰證用之，却可。若其人嘔，不喜食，不可用千金內補散，滯其脾，恐挾外邪未潰者，二陳湯加芎，或不換金正氣散已潰者，穀神嘉禾飲。

又一方，治毒並不喜食，於不換金正氣散，加白茯苓半夏等分，人參木香減半，亦名正氣散。

患癰毒人膿血已潰，所去過多，津液枯竭，多病於渴，縱有發熱躁擾等證，不可以治者，用益榮生津之劑。若大熱不止者，難治。

瘡毒久不乾成漏者，忍冬草浸酒常服。

瘡毒而大便堅者，升麻和氣飲，和消毒飲，加以身上發熱甚者，消毒飲，和敗毒散。

有火邪逼身，及因灸後偏身發爲赤核，腫痛旋盤，用荊防湯浸取洗。

露溘名爲羊核，生取石菖蒲爛研，以石首膠一兩許，火煨存性，研爲末，酒調服。

有不傳藥時大痛，傳卽不痛，有不傳藥時不痛，傳之則痛，蓋寒熱風濕并憂怒等氣，積而內攻，則痛不禁藥，拔出之故，不痛也。血死陰毒在中，愈服愈深，愈不覺痛，藥發之於外，故反痛也。

薛己醫按

○用藥總論

入病不同，藥性亦異，有是病而宜是藥，不可以誤施也。且如瘡疽痛息自甯，飲食知味，脈證俱緩，緩則治本，故可以

元戎云：「陷脈爲癰，留連肉腠，營氣不從逆於肉理，乃生癰腫。榮逆血鬱，則熱聚爲膿。」正理論曰：「熱之所過，則爲癰腫。」營氣不從，亦有不熱者乎？答曰：膏粱之變，芳草之美，金石之過，氣血不盛，榮衛之氣充滿而抑遏不能行，故閉塞血氣，腐而爲癰也。當泄之以奪盛熱之氣。若其人飲食疎，精神衰，氣血弱，肌肉消，薄營衛之氣，短促而滯，滯故寒薄，腠理閉鬱而爲癰腫也。當補之以接虛怯之氣，亦當以脈浮沉別之。既得盛衰，泄之則連翹大黃補之，則內托之類是也。

註按辨瘡瘍因熱因寒，及氣血鬱而成，當攻補之法不同，宜與前後諸篇兼看，殆無餘蘊矣。但世俗昧此理，而云是瘡不是瘡，且服五香連翹湯。然或中或否，致悞者多，蓋不審形氣虛實，瘡毒深淺，發表攻裏，所因不同故也。今以丹溪先生外科精要發揮諸法之義，附於後例之下，庶學者知所鑑焉。

⑤分三因

陳無擇云：發背癰疽者，該三因而有之，論曰：「癰疽瘰癧，不問虛實寒熱，皆由氣鬱而成。」經亦云：「氣宿於經絡，與血俱澀而不行，壅結爲癰疽。」不言熱之所作而後成癰者，此乃內因喜怒憂思有所鬱而成也。身有熱被風冷搏之，血脈凝泣不行，熱氣壅結而成，亦有陰虛陽氣湊襲，寒化爲熱，熱盛則肉腐爲膿者，此亦外因寒熱風濕所傷而成也。又服丹石及炙博酒麪溫牀厚被所致，又盡力房室精虛氣節所致者，此乃不因內外所傷而成也，故知三因備也。

註按所分三因雖備，但未具瘡瘍之邪，在經在表在裏之異，故其治亦不能詳備也。

⑥陰滯於陽，則生癰；陽滯於陰，則生疽

丹溪曰：精要云：「陽滯於陰，脈浮洪弦數，陰滯於陽，脈沉細弱，濡陽滯以寒治之，陰滯以熱治之。」切詳其意，陽滯陰滯，當作熱治寒治，求之寒熱，固可作陰陽論於陰於陽，分明是於氣於血，他無可言也。熱滯於氣，固無寒滯耶？寒滯於血，固無熱滯耶？何寒不能傷氣，熱不能傷血，耶？以予觀之，氣爲陽行脈外，血爲陰行脈內，相並分派，周流循環，

須明托裏疏通和榮衛之三法，內之外者，其脈沉實，發熱煩躁，外無焮赤，痛深於內，其邪氣深矣，疏通臟腑以絕其源。外之內者，其脈浮數，焮腫在外，形證外顯，恐邪氣極而內行，故先托裏也。內外之中者，外無焮惡之氣，內亦臟腑宣通，知其其在經當和榮衛也。用此三法之後，雖未差必無變證，亦可使邪氣峻減而易愈。

⑤灸法

元戎云：「瘡瘍自外而入者，不宜灸，自內而出者，宜灸，外入者托之而不內，內出者接之而令外。」故經云：陷者灸之，灸而不痛，痛而後止其灸。灸而不痛者，先及其潰，所以不痛而後及良肉，所以痛也。灸而不痛，痛而後止其灸，灸而痛者，先及其未潰，所以痛而次及將潰，所以不痛也。然此亦約法，因以東垣等法附於左，宜參用之。凡人初覺發背欲結未結，赤熱腫痛，先以濕紙覆其上，立候視之，其紙先乾處，即是結癰頭也。取大蒜切成片如二三錢厚薄，安於頭上，用大艾炷灸之三壯，即換一蒜片，痛者灸至不痛，不痛灸至痛時方住。最要早覺早灸為上。一日二日十灸十活，三日四日六七活，五六日三四活，過七日則不可灸矣。若有十數頭作一處生者，即用大蒜研成膏，作薄餅鋪頭上，聚艾於蒜餅上燒之，亦能活也。若背上初發赤腫一片，中間有一粒如黃粟米頭子，便用獨蒜切去兩頭，取中間半寸厚薄，正安於瘡上，著艾灸十四壯，多至四十九壯。

註按謂癰疽所發，宜灸之也。然諸瘡患久成漏者，常有膿水不絕，其膿不臭，內無歹肉，尤宜用附子浸透，切作大厚三二分，於瘡上著艾灸之。仍服內托之藥，隔三二日再灸之，不五七次，自然肌肉長滿矣。至有膿水惡物漸潰根深者，郭氏治用白麪硫黃大蒜三物一處搗爛，看瘡大小，捻作餅子，厚約三分，於瘡上用艾炷灸二十一壯，一灸一易，後隔四五日，方用翠霞錠子并信效錠子互相用之，緝入瘡內，歹肉盡去，好肉長平，然後貼收斂之藥內服。應病之劑，調理即瘥矣。蓋不止宜灸於瘡之始發也。大抵始發宜灸，要汗下補養之藥對證，至灸冷瘡亦須內托之藥切當，設有反逆，不唯不愈，恐致轉生他病。

也。若毒氣行於肺或脾胃之部分，毒之次也。若出於他經，又其次也。濕熱之毒，所止處無不潰爛，故經言「膏梁之變，足生大疔，受如持虛」，如持虛器以受物，無不受焉。治大疔之法，必當瀉其營氣，以標本言之，先受病爲本，非苦寒之劑，爲主爲君，不能除其苦楚疼痛也。諸瘡瘍有痛，往往多以乳香沒藥，雜以芳香之藥止之，必無少減之理。若使經絡通流，臟腑中去其壅滯，必無痛矣。苦寒之劑，除其疼痛，藥下於咽，則痛立已，此神品藥也。

瘡瘍食肉，乃自棄也。瘡瘍者，乃營氣而作也。今反補之，與自棄何異？雖用藥施治而不能愈。地之濕氣，自外而入內者，瘡癰當先服藥，而用針，如瘡癰小，不欲飲藥，或嬰兒之瘡，先當溫衣覆蓋，令其凝泣壅滯，血脈溫和，則出血立已者，不如此，血脈凝滯，便針則邪毒不瀉，反傷良肉，又益其瘡勢也。瘡瘍及諸病面赤，雖伏大熱，禁不得攻裏，爲陽氣拂鬱，邪氣在經，宜發表以去之。故曰：火鬱則發之。雖大便數日不見，宜多攻其表，以發散陽氣，少加潤燥之藥，以潤之。如見風脈風證，只可用發表風藥，便可以利通得大便秘澀，尤宜潤之，慎不可下也。瘡瘍鬱冒，俗呼昏迷是也，宜汗之則愈。驗瘡名色治之，當從素問針經聖濟總錄易老瘡論及諸家治瘡用藥法度，此爲緊要，臨病之際，宜詳審焉。

註按聖濟總錄能悉諸瘡之名色，但其用藥，則多主寒涼，而無通變之法，唯已上易老東垣等言，深插針經之大法，陳脈病治例之要，學者能熟此等議論，則臨證處方，便自胸中了然明白。

（八）膿潰論

夫癰疽瘡癰，皆由氣血壅滯而生也。當推其虛實表裏而早治之，可以內消，此卽托裏之意也。若毒氣已結者，勿泥此內消之法，當辨膿之有無淺深，若按之卽復起者，有膿也，不復起者，無膿也。大按方痛者，膿深也，小按便痛者，膿淺也，急酌量刺之。緩則穿通臟腑，爛筋骨，可不慎哉！但病者多喜內消，而醫者卽用十宣散及敗毒散流氣飲之類，殊不知十宣散雖有參芪，然防風白芷厚朴桔梗，皆足以耗氣，况不分經絡時令氣血多少而槩用之乎？敗毒散乃表散之藥也，雖有表證，不過一二服，况非表證而用之乎？流氣飲乃行氣散血之劑，若服之過度，則氣虛血耗，何以

一身無停止謂之脈，一呼脈行三寸，一吸脈行三寸，呼吸定息，共得六寸，一身通行八十一丈，得熱則行速而太過，得寒則行遲而不及，五味之厚七情之偏，運氣爲滯，津液稠厚積而久也，爲飲爲痰，滲入脈內，血爲所亂，因而凝濁，運行涸泣，或爲沸騰，此陰滯於陽也，正血滯於氣也，氣病今人或以藥助邪病，上生病血之病日增，溢出脈外，隧道隘塞，升降有妨，運化失令，此陽滯於陰也，正氣滯於血也，病分寒熱者，當是稟受之素偏虛邪之雜合，豈可以陽爲熱，陰爲寒耶？浮洪弦數，氣病之脈也，豈可遽以此作熱論？沉細弱澁，血病之脈，豈可遽以此作寒論？此萬病之根本，豈止疥癬瘡瘍癰疽而已？幸相評其是否。

①明本末

東垣曰：生氣通天論云：「營氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。」又云：「膏粱之變，足生大疔，受如持虛。」陰陽應象論云：「地之濕氣感則害人皮肉筋脈。」是言濕氣外傷則營氣不行，榮衛者皆營氣之所經營也，營氣者，胃氣也，逆氣也，營氣爲本，本逆不行，爲濕氣所壞而爲瘡瘍也。膏粱之變，亦是言厚滋味過度，而使營氣逆行，凝於經絡爲瘡瘍也，此邪不在表，亦不在裏，唯在其經中道病也。已上內經所說，俱言因營氣逆而作也。遍看諸瘡瘍論中，多言二熱相搏，熱化爲膿者，有只言熱化爲膿者，又言濕氣生瘡，寒化爲熱而爲膿者，此皆瘡疽之源也。宜於所見部分，用引經藥，并兼見證中分陰陽證，先瀉營氣，是其本，本逆助火，濕熱相合，敗壞肌肉而爲膿血者，此治之次也。宜遠取諸物以比之一歲之中，大熱無過夏，當時諸物皆不壞爛者，而壞於交秋濕令大行之際也。近取諸身，熱病在身，止顯熱而不敗壞肌肉，此理明矣。標本不得，邪氣不服，言一而知百者，可以爲上工矣。

營氣不從，逆於肉理，乃生瘡癰。且營氣者，胃氣也，飲食入於胃，先輸於脾，而朝於肺，肺朝百脈，次及皮毛，先行陽道，下歸五臟六腑，而氣口成寸矣。今富貴之人，不知其節，以飲食肥醲之類，雜以厚味，日久太過，其氣味俱厚之物，乃陽中之陽，不能走竅，先行陽道，反行陰道，逆於肉理，則濕氣大勝，則子能令母實，火乃大旺，濕熱既盛，必來剋腎。

自去，或自平，不能爲害，若年高怯弱之人，血液少，肌肉澀，必先迎而奪之，順而取之，是謂定禍亂以致太平，設或留而不去，則有爛筋腐肉之患。如劉大尹汪太夫人取之及時，而新肉卽生，得以全愈，金工部陸舍人取之稍遲，幾至不救。鄭揮使取之失期，大潰而斃，予常見腐肉旣去，雖少壯者不補其氣血，尙不能收斂，若怯弱者不取惡肉，不補氣血，未見其生也。

㊟ 腫瘍

腫高焮痛脈浮者，邪在表也，宜托之。腫硬痛深脈沉者，邪在內也，宜下之。外無焮腫，內則便利調和者，邪在經絡也。當調榮衛。焮痛煩躁，或咽乾作渴者，宜降火。焮痛發熱，或拘急或頭痛者，邪在表也，宜散之。大痛或不痛者，邪氣實也，隔蒜灸之，更用解毒。煩躁飲冷，焮痛脈數者，邪在上也，宜清之。惡寒而不潰者，氣實兼寒邪也，宜宣而補之。焮痛發熱，汗多大渴，便祕讖語者，結陽證也，宜下之。不作膿或熟而不潰者，虛也，宜補之。

㊟ 潰瘍

膿熱不潰者，陽氣虛也，宜補之。瘀肉不腐者，宜大補陽氣，更以桑木灸之。膿清或不斂者，氣血俱虛，宜大補之。膿後食少無睡，或發熱者，虛也，宜補之。倦怠懶言，食少不睡者，虛也，宜補之。寒氣襲於瘡口不斂，或陷下不斂者，溫補之。脈大無力，或濇微者，氣血俱虛也，峻補之。出血或膿，多煩躁不眠者，乃亡陽也，急補之。

㊟ 作痛

膿出而反痛者，虛也，宜補之。脈數虛而痛者，屬虛火，宜滋陰。脈數實而痛者，邪氣實也，宜泄之。脈實便祕而痛者，邪在內也，宜下之。脈濇而痛者，氣血虛寒也，溫補之。

㊟ 發熱

脈浮或弱，而熱或惡寒者，陽氣虛也，宜補氣。脈濇而熱者，血虛也，宜補血。午前熱者，補氣爲主，午後熱者，補血爲主。脈浮數發熱而痛者，邪在表也，宜散之。脈沉數發熱而痛者，邪在內也，宜下之。

爲膿此三藥者不可輕用明矣。若夫瘡旣成膿，皮膚不得疎泄，昧者待其自穿，殊不知少壯而充實者，或能自解，若老弱之人，氣血枯槁，兼或攻發太過，不行針刺，膿毒乘虛內攻，穿腸腐膜，鮮不誤事。如沈氏室乳癰膿成，予爲針刺及時，不月而愈。黃上舍腿癰膿熟，惡針幾至危殆，予爲刺之，大補三月而愈。練千兵腿癰脈證俱弱，亦危甚矣，予治以托裏得膿，急使針刺，彼固不從，致膿水開泄，淋漓不能收斂而斃。王安人發背待其自破，毒氣內攻，王貴腹癰潰透，腹脅穢氣從瘡口而出，予謂其決不起，果然。大抵瘡瘍之證，感有輕重，發有淺深，淺者腫高而軟，發於脈脈深者腫下而堅，發於筋骨。然又有發於骨髓者，則皮肉不變，膿成之時，氣血壯實者或自出，怯弱者不行針刺，鮮有不誤。東垣云：「毒氣無從而解，膿瘀無從而泄，過時不烙，反攻於內，內旣消敗，欲望其生，豈可得乎？」茲舉一二與同道裁之，使患者知所慎云。

⑨生肌止痛

夫肌肉，脾之所主也，潰後收斂遲速者，乃氣血盛衰使然。世之治者，但知生肌用龍竭之屬，止痛用乳沒之屬，恪守不移，予謂不然。蓋生肌之法，當先理脾胃，助氣血爲主，則肌肉自生，豈假龍竭之屬？設若膿毒未盡，就用生肌，反增潰爛，壯者輕者，不過復潰或遲斂而已，怯者重者，必致內攻或潰爛而不斂，亦危矣。蓋止痛之法，熱者清之，寒者溫之，實者損之，虛者補之，膿鬱者開之，惡肉侵蝕者去之，如是則痛自止，豈假乳沒之屬？如黃汝耘背發毒氣未盡，早用生肌，竟致潰爛，予以解毒藥治之得愈。許序班患此，毒氣始發，驟用生肌，其毒內攻而死。王汝道患腿癰，因寒作痛，與乳香定痛丸。周朝儀母患時毒，因熱作痛，與防風通聖散。丁蘭患臀癰膿潰，因虛作痛，與益氣養榮湯。劉貴患腹癰，因實作痛，與黃連內疎湯。王州守患腿癰，膿成作痛，予爲刺之。楊千兵母發背腐肉侵蝕作痛，予爲取之，痛卽自止。嗟夫！以寒治熱，以熱治寒，損實補虛，此用藥者之繩墨，若專用龍竭生肌，乳沒止痛，予恐其功不奏也。

⑩惡肉論

夫惡肉者，腐肉也。大凡離直瘡潰後，腐肉凝滯必取之，乃推陳致新之意。若壯者筋骨強盛，氣血充溢，真能勝邪，或

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百六十一

外科癰疽疔毒門三

明薛己醫按

○灸法用藥第一

精要曰：經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火，前輩又謂癰疽多生於丹石房勞之人。凡人四十以上，生發背等瘡，宜安心早治，此證如虎入室，禦而不善，必至傷人。宜先用內托散，次用連翹五香湯，更以騎竹馬法，或隔蒜灸，并明灸足三里，以發泄其毒，蓋邪之所湊，其氣必虛，留而不去，其病乃實。故癰疽未潰，臟腑畜毒，一毫熱藥斷不可用。癰疽已潰，臟腑既虧，一毫冷藥亦不可用。猶宜忌用敷貼之藥，閉其毫孔。若熱渴便秘，脈沉實洪數，宜用大黃等藥以泄其毒。後用國老膏萬金散蠟礬丸，遠志酒之類選而用之。

註按前證若熱毒蘊於內，大便祕結，元氣無虧者，宜用大黃等藥泄其熱毒；若陰虧陽湊，精虛氣節，脾胃虛弱者，宜用甘溫之劑培其本源。若瘡不焮腫，不作膿者，雖未潰仍須溫補；若瘡已潰而腫不退，痛不止者，仍宜清涼之劑治之。若病急而元氣實者，先治其標，病緩而元氣虛者，先治其本。或病急而元氣更虛者，必先治本而兼以治標。大抵腫高焮痛，膿水稠粘者，元氣未損也，治之則易；漫腫微痛，膿水清稀者，元氣虛弱也，治之則難。不腫不痛。

⑤作渴

尺脈大或無力而渴者，宜滋陰降火，上部脈沉實而渴者，宜瀉火，上部脈洪數而渴者，宜降火。胃脈數而渴者，宜清胃。火氣虛不能生津液而渴者，宜補中氣。脈大無力或微弱而渴者，宜補氣血。膿血大泄，或瘡口出血而渴者，大補氣血，如不應，急用獨參湯。

⑥作嘔

喜寒惡熱而嘔者，宜降火。喜熱惡寒而嘔者，宜養胃氣。脈實便秘而嘔者，宜瀉火。脈細腸鳴腹痛瀉而嘔者，托裏溫中。

⑦便秘

脈沉實而祕者，火在內也，宜泄之。脈濇而祕者，屬血少，宜養血。脈浮而祕者，屬氣虛，宜補氣。脈浮濇而祕者，氣血俱虛也，宜補氣血。

⑧疔瘡

脈浮數者散之，脈沉實者下之。表裏俱實者，解表攻裏。癰癢或大痛及不痛者并灸之，更兼攻毒。

補托其裏。然癰疽冠於雜病之首，治失次序，多致夭枉。故集得效灸法以貽學者，庶不致妄投也。

註按前證若發熱煩渴，大便秘結者，由邪畜於內，宜內疎黃連湯以泄內毒。若頭痛拘急，發熱惡寒者，由邪客於外，宜人參敗毒散以散表邪。若腫痛焮赤，發熱作渴，此毒氣凝於肉裏，宜仙方活命飲解散其毒。若食少體倦，發熱惡寒，此中氣虛弱，宜六君子湯以補脾胃。

④ 騎竹馬灸法第四

治一切瘡瘍，即用此法，無有不愈。其法令病人以肘凭几，豎臂腕要直，用篾一條，自臂腕中曲處橫紋，男左女右，貼肉量起，直至中指尖盡處截斷爲則，不量指甲。却用竹杠一條，令病人脫衣，正身騎定，前後用兩人杠起，令病者脚不著地，又令二人扶之，勿令僂，却將前所量臂篾，從竹杠坐處尾骹骨盡處直貼脊背，量至篾盡處爲則，用墨筆點定。此只是取中，非灸穴也。却用薄篾作則子，量病人中指節相去兩橫紋爲則，男左女右，截爲一則，就前所點記處兩邊各量一則，盡處即是灸穴。兩穴各灸五七壯，疽發於左則灸右，疽發於右則灸左，甚則左右皆灸。蓋此二穴心脈所過之處，凡癰疽皆心火留滯之毒，灸此則心火流通而毒散矣。起死回生之功，屢試屢驗。

註按前證若毒既解，而肌肉不生，當求其屬而補之。

男以左手，女以右手，先屈中指，用薄篾量取中間一節兩橫紋盡處爲同身一寸爲則子。此是第一次法。

先從男左女右臂腕中曲橫紋起，用薄篾一條量至中指齊肉盡處，不量指甲爲則，剪斷。此是第二次法。

先令病人脫去衣服，以大竹杠一條，跨定，令二人徐徐杠起，足要離地五寸許，兩旁更以兩人扶定，毋令動搖不穩，却以第一圖則子貼定竹杠，從尾閭起貼脊，量至則子盡，以墨點定記之，非灸穴也。此是取中穴止處，却以第二圖取同身寸則，取兩寸平摺自中穴量之，以中分取兩旁各一寸，方是灸穴也。此是第三次法。

⑤ 隔蒜灸法第五

或漫腫色黯不潰者，發於陰也。元氣虛甚，理所不治。若腫高焮痛者，先用仙方活命飲，後用托裏消毒散。漫腫微痛者，宜托裏散，如不應，加薑桂。若膿出而反痛，氣血虛也。八珍散不作膿，不腐潰，陽氣虛也。四君加歸芪肉桂，不生肌，不收斂，脾氣虛也。十全大補加薑桂，補熱內熱，陰血虛也。四物加參朮，欲嘔作嘔，胃氣虛也。六君加炮薑，自汗盜汗，五臟虛也。六味丸加五味子，食少體倦，脾氣虛也。補中益氣加茯苓半夏，喘促欬嗽，脾肺虛也。前湯加麥門五味，欲嘔少食，脾胃虛也。人參理中湯，腹痛泄瀉，脾胃虛寒也。附子理中湯，小腹痛，足脛腫，脾腎虛弱也。十全大補加山茱山藥肉桂，泄瀉足冷，脾腎虛寒也。前藥加桂附熱渴淋閉，腎虛陰火也。加減八味丸，喘嗽淋閉，肺腎虛火也。補中益氣湯加減八味丸。凡此變證，皆因元氣虧損，失於預補所致。故丹溪先生云：但見腫痛，參之脈證虛弱，便與滋補，氣血無虧，可保終吉。旨哉斯言！蓋古今虛實不同，因時施治，不無少異，是集治論義悉類此。

○備論第二

初虞世云：凡癰疽始作，須以大黃等藥急轉利之，勿以困苦爲念。若與其潰爛而死，不若利之而死，况有生道哉！古人立法，率用五香、連翹、漏蘆等藥，貧乏者單煎大黃湯以利之。至於膿潰，乃服黃芪等藥以排膿，千金外臺備矣。世以瘡發於外，不行轉利而死者多矣，悲夫！

註按前證若腫高焮痛，臟腑閉結，屬內外俱實，當用前藥瀉之。若漫腫微痛，臟腑不實，屬內外俱虛，當用內托補之。若漫腫無頭，肉色不變，當助胃壯氣，令其內消。若疼痛不止，焮腫不消，當用人參黃芪散以托裏排膿。若飲食少思，肌肉不生，當用參芪托裏散以補養脾胃。丹溪云：癰疽因積毒在臟腑，當先助胃壯氣，使根本堅固，次以行經活血藥佐之，參以經絡時令，使毒氣外泄，治之早者，可以內消，此內托之旨也。又云：腫瘍內外皆壅，宜以托裏表散爲主，如用大黃，甯無孟浪之非。潰瘍內外皆虛，宜以補接爲主，如用香散，未免虛虛之失。此蓋古今氣稟不同，治宜審之。

五分名熱腑穴二處各灸七壯，此能疎泄諸陽熱氣，永無癰疽之苦。或隔蒜灸，不論壯數則邪無所容，而真氣不損。但頭項見瘡，宜用騎竹馬法，及足三里灸之。

註按前論誠爲良策，其調理之法當求首論。

⑨灼艾痛癢論第九

伍氏曰：凡治癰疽發背疔瘡不痛者，必灸使痛，痛者必灸，使不痛。若初灸即痛者，由毒氣輕淺，灸而不痛者，乃毒氣深重，悉宜內服追毒排膿，外傳拔毒之藥。大抵癰疽不可不痛，又不可大痛，悶亂不知痛者難治。

註按前論唯疔瘡一證，其狀不一，其色不同，或如小瘡，或如水泡，或作痛，或麻木，或有紅絲，或寒熱頭疼，或嘔吐惡心，或肢體拘急，其候多端，非前灸法并解毒之劑，卒難濟事。若不省人事，或牙關緊急者，即以奪命丹爲末灌之。若生兩足，多有紅絲至臍，生於兩手，多有紅絲至心，生於脣面，多有紅絲入喉，俱難治。若針其紅絲出血，多有生者，若患於肢末之處，毒愈凝滯，藥難導達，艾灸之功爲大。如妄服疎利之劑，耗損真氣，不唯無以去毒而害反隨之矣。

⑩腦疽灸法第十

李氏云：腦疽及頸項有疽，不可用隔蒜灸，恐引毒上攻，宜灸足三里穴五壯，氣海穴三七壯，仍服涼血化毒之藥，或以騎竹馬穴法灸之。凡頭項咽喉生疽，古法皆爲不治，若用此法，多有生者。如五香連翹漏蘆等湯，國老膏，萬金散，皆可選用。

註按前證屬膀胱經，或濕熱上壅，或陰火上炎。若因濕熱，則病氣有餘，元氣不足，當用黃連消毒散以除濕毒，用補中益氣湯以滋化源。若因陰火，則元氣病氣俱不足，當用補中益氣湯，及六味地黃丸，以滋腎水。若腎水乾涸，中傳末證，急用加減八味丸及補中益氣湯，以固根本，引火歸源。若色黯不潰，或潰而不斂，名曰腦爛，不治。大凡

李氏云：治疽之法，灼艾之功勝於用藥。蓋使毒氣外泄，譬諸盜入人家，當開戶逐之，不然則入室爲害矣。凡瘡初發一二日，須用大顆獨蒜，切片三分厚，貼疽頂，以艾隔蒜灸之，每三壯易蒜，痛者灸令不痛，不痛者灸之令痛。瘡潰貼神異膏。如此則瘡不開，大肉不敗壞，瘡口易斂，一舉三得。此法之妙，人所罕知。若頭項見疽，則不可用此法。

註按瘡瘍之證，有諸中，必形諸外，在外者引而拔之，在內者疎而下之。苟或毒氣鬱結，瘀血凝滯，輕者藥可解散，重者藥無全功，是以灼艾之功爲大。凡灸法未潰，則拔引鬱毒，已潰則補接陽氣。每治四肢患瘡，氣血無虧者，祇以前法灸之皆愈。若中氣虛弱，不灸而服敗毒之藥，復傷中氣，未有不敗者也。其頭項患者，亦宜灸之，但艾炷宜小，而少其壯數爲善。

④尋頭灸法第六

李氏云：凡患背疽，漫腫無頭者，用濕紙貼腫處，但一點先乾處，乃是瘡頭，可用大蒜十顆，淡豉半合，乳香錢許，研爛置瘡上，鋪艾灸之，痛否皆以前法爲度。

註按前證或附骨疽，及臀腿諸毒，初起未明者，尋頭用灸，多自內消，其毒熾盛，更服活命飲，其功尤捷。若氣血虛弱，必以補托爲主，若背疽大潰，欲驗穿透內膜者，不可用皂角取嚏法，但以紙封患處，令病者用意呼吸，如紙不動者，未穿透也，倘用取嚏鼓動內膜，反致穿透，慎之慎之！

⑤蒜餅分輕重第七

伍氏曰：凡用蒜餅灸者，蓋蒜味辛溫，有毒，主散癰疽，假火勢以行藥力，有只用艾炷灸者，此可施於頑瘡痼發之類。凡赤腫紫黑毒甚者，須以蒜艾同灸爲妙。

註按前法誠有回生之功，若頑瘡痼疾，脾胃虛弱，營氣不能滋養患處，以致寒邪內襲而不愈，宜用小艾炷頻灸瘡口，以祛寒邪，補接營氣。其內補之法，說見首論及三十二論。

註按前證脈沉實，大便祕結者，屬內因也，宜疎利之脈浮，大便調和者，屬外因也，宜托裏之脈不浮不沉者，屬內外因也，宜調和榮衛，此亦治三因法也。若焮腫大痛，煩熱飲冷，大便祕結，脈洪數實者，爲純陽，宜苦寒之劑，清熱拔毒。若不腫不痛，瀉利不食，嘔吐足冷，是爲純陰，宜辛熱之劑，大補陽氣，不拘嚴寒盛暑，當捨時從證，若微腫微痛，似潰不潰，時出清膿者，爲半陰半陽，宜辛熱之劑，溫補胃氣。此亦治陰陽證法也，治驗詳見首論。

④素問要論第十四

素問云：陽氣淩襲，寒化爲熱，熱甚則肉腐爲膿。凡發背多因服金石而發者，有因上代曾服而發者，其候多發於脾，起如粟，或痛或癢，多致不救。外面如拳，古人云：外面如麻，裏面如瓜，有數十孔，以手按之，諸孔出膿，尋時失痞。凡有此證，可用淨土水調量大小作餅厚分許，以艾炷灸之，內服五香連翹湯，及鐵漿酢調蚌殼灰塗之，更以騎竹馬法灸之甚良。

註按前證仍參首論主治，恐其表裏熱毒之不同，元氣虛實之不一也。

⑤千金要論第十五

千金云：癰疽始作，或大痛，或小痛，或發如米粒，卽便出膿，宜急斷口味，利去其毒，用騎竹馬灸法，或就患處灼艾。重者四面中央總灸一二百壯，更貼寒藥，其效甚速。

註按前證若因元氣虧損，或因氣血相滯而患者，更當調補其內。

⑥別脈辨證論第十六

伍氏云：癰疽之疾，有二十餘證，標發、痲發、石發、岩發、蜂窠發、蓮子發、椒眼發、連珠發、竟體發、有腸癰內發、腦背發、眉發、頰發、肺癰瓜瓠發。大率隨病淺深，內外施治，不可遲緩。初發如傷寒脈浮而緊，是其候也。

註按前證其名雖殊，處治之法，詳具各論。其肺癰、胃脘癰別載。

腫焮痛甚，宜活命飲，隔蒜灸之，解散瘀血，拔引鬱毒，但艾炷宜小而少。若欲其成膿腐潰，生肌收斂，並用托裏爲主。

（二）護臟腑論第十一

李氏云：背疽之方雖多，得效者殊少。今擇用驗者錄之，庶不致誤人。如護心散，凡有疽疾，早進數服，使毒氣外出而無嘔吐之患，否則咽喉口舌生瘡，或黑爛如菌。若瘡發四五日之後，宜間用別藥治之。

註按護心散，乃解金石發疽之藥，若發熱焮腫作渴，飲冷而嘔者，宜用。若發熱焮腫作渴，飲湯而嘔者，不宜用。若脾虛停痰，或寒邪內侵，或痛傷脾胃，宜用六君子湯。若喉舌生瘡，口乾作渴，或小便頻數，宜用六味丸。大凡諸瘡作嘔，若飲冷便祕，是熱毒也，黃連消毒散解之。飲冷便和，是胃火也，竹葉石膏湯清之。懶食飲湯，是胃虛也，補中益氣湯以補之。大便不實，喜飲熱湯，是脾胃虛寒也，六君加炮薑以溫之。常見脾胃虛弱者，用前散反心間陰冷，無不致嘔。其喉舌生瘡，乃腎水枯涸，虛火上炎，其證甚惡，急用加減八味丸，亦有得生者。

（三）癰疽論第十二

馬益卿曰：夫人有四肢五臟，一覺一寐，呼吸吐納，精氣往來，流而爲榮衛，暢而爲氣色，發而爲聲音，陽用其形，陰用其精，此又常數之所同也。至其失也，蒸則生熱，否則生寒，結而爲瘤贅，陷而爲癰疽，凝而爲瘡癬，憤則結癭，怒則結疽。又五臟不和，則九竅不通，六氣不和，則流結爲癰，皆經絡澀滯，氣血不流暢，風毒乘之而致然也。

註按此論可謂善言人身之造化，瘡瘍之情狀者矣。治法當參詳前論。

（四）敘論第十三

癰疽之證，若七情虧損，氣血經絡壅結而成者，屬內因；若六淫外侵，氣血受傷，寒化而爲癰者，屬外因。若服丹石補藥，毒氣西阿房勞斫政者，屬內外因也。又曰：陰帶於陽則發癰，陽帶於陰則發疽。脈浮洪滑數爲陽，沉緩遲澀爲陰。

註按前證治法當與第十一論參看。

㊟嘔逆第十九

李氏云：癰疽嘔逆，是毒氣衝心，非脾胃之冷。當服內托散。楊氏云：鼻衄初愈，不會表汗，毒在經絡，則背發大疽。自肩下連腰脅，腫硬如石，其色紫黑，以涼藥投之，終夜大嘔，連進托裏散，嘔止瘡潰，赤水淋漓，四十日而愈。又有患癰者，痛過徹嘔，服此即止。今有病疽不服此藥者，故引楊氏之言，以解世人之惑。

註按用藥之法，有是病必用是藥，但今之脾胃虛寒，氣逆痰滯而嘔吐者，十居八九，熱毒內攻而嘔吐者，十纔一二，當參首論及第十一論主之。

㊟論源第二十

夫癰疽之源，因於氣或因於熱，以僕之管見，亦有因於膏粱房勞金石等藥者。故治法用菉豆、犀角、礬石、國老膏、追毒丸，其屬毒明矣。華佗中藏所言是毒，服宜熱敗毒之藥，不必疑矣。

㊟華佗論第二十一

夫癰疽瘡腫之作，皆五臟六腑畜毒不流，非獨因榮衛壅塞而發也。其行也有處，其主也有歸。假令發於喉舌者，心之毒，發於肌肉者，脾之毒，發於骨髓者，腎之毒，發於下者，陰中之毒，發於上者，陽中之毒，發於外者，六腑之毒，發於內者，五臟之毒，故內曰壞，外曰從，下曰逆。發於上者，得之速，發於下者，得之緩。感於六腑則易治，感於五臟則難瘳。又近骨者多冷，近膚者多熱，近骨者久不愈，則化成血蟲；近膚者久不愈，則傳氣成漏。成蟲則多癢少痛，或先癢後痛，成漏則多痛少癢，或不癢不疼。內虛外實者，多痛少癢，血不止則多死，潰膿則多生。或嘔逆無度，飲食無時，皆癰疽使然，證候多端，要當詳治。

⑦脈證第十七

陳無擇云：癰疽脈數，身無熱，反洒淅惡寒，若有痛處，乃發爲癰。以手掩上，若熱者爲有膿，不熱者爲無膿。若脈不數，不熱而疼者發於陰也，尤爲惡證。凡熱甚脈數，用漏蘆散，并單煮大黃等湯，不甚熱，脈緩弱，投五香連翹湯，仍依四節八事次序三，因以藥之，無有不濟者也。

註按前證洒淅惡寒，有屬瘡之表邪者，有屬脾肺之氣虛者。若潰後焮腫，作痛惡寒，發熱煩渴脈數，乃真氣虛而邪氣實也，仍參詳首論主之。

⑧用藥大綱第十八

李氏云：余之所著方論，靡不周備，但欲使治者一玩味，次第用之，無有不效。今略書用藥要領，節次於後。

一初患癰疽，便服內托散，以免後來口舌生瘡，仍用騎竹馬或隔蒜灸。

一服五香連翹湯，如大便秘即止，仍量人虛實。

一癰疽潰後，宜服排膿內補散，若嘔逆，用木香湯下。

一癰疽初作，便宜灼艾，及麥飯、石膏塗四圍中，留口出毒。如瘡小通傳之，既潰，用神異膏貼之。

一癰疽已潰，日用猪蹄湯淋洗，將愈之際，三日一次。

一癰疽將斂，宜用神異膏，如毒未盡，不可遽用生肌之劑。

一癰疽將安，宜用加味十全大補湯，補其氣血，庶肌肉易生。

一背疽多先渴而後發，或先疽而後渴，不救多矣。若服加減八味丸，非特杜絕渴疾，抑且大滋氣血，生長肌肉。

註按前證及諸治法，各附四十七等論，當審用之。

一癰疽嘔逆有二，一因初發不服內托散，伏熱在心；一因脾氣不正，若因伏熱在心者，心煩身熱，焮腫作痛，宜用內

⑤陰陽淺深緩急治法第二十五

曾氏云：凡癰疽其脈浮數洪緊，腫焮作痛，身熱煩渴，飲食如常，此六腑不和，毒發於外而為癰，其勢雖急，投以涼劑，多保生全。其脈沉細伏緊，初發甚微，或無瘡頭，身不熱而內躁，體重煩疼，情緒不樂，胃膈痞悶，飲食無味，此五臟不和，毒畜於內而為疽，急投五香連翹湯，甚者轉毒散，神仙截法，黃礬丸，國老膏，防托毒氣，免致變證內攻。尤宜當頭隔蒜灸，若塗毒藥，迷其腠理，投諸涼藥，虛其真氣，故其善惡之證，在乎醫之工拙耳。或噫氣痞塞，效逆，身冷自汗，目睛耳聾，恍惚驚悸，語言顛倒，皆惡證也。五善見三則瘥，七惡見四則危，五善併至，則善，無以加七惡併臻，則惡之劇矣。

註按前證善者，乃五臟未傷，病微邪淺，使能慎起居，節飲食，勿藥自愈。惡者乃五臟虧損之證。前哲雖云不治，若能補其脾胃，固其根本，多有可生者，豈可以其惡而遂棄之耶？

⑥善惡第二十六

問曰：「五善七惡，可得聞乎？」曰：「飲食如常一善也；實熱而大小便濇二善也；內外病相應三善也；肌肉好惡分明四善也；用藥如所料五善也。渴發而喘，眼角向鼻，大小便反滑一惡也；氣絲絲而脈濡與病相反二惡也；目不了了，睛明內陷三惡也；未潰肉黑而陷四惡也；已潰青黑，筋腐骨黑五惡也；發痰六惡也；嘔吐七惡也。」

註按善惡形證治法見附錄。

⑦生死第二十七

問曰：「病有甚而至生，有微而至死，病證難辨，生死何從決乎？」答曰：「發背潰透內膜者死；此言用藥已上未潰內陷，面青唇黑便汚者死；此言臟壞便瘀血潰喉者不治；陰患入腹者不治；入囊者不治；鬚深數寸者不治；在頤後一寸三分，名銳毒，亦不治；無此者生，流注雖多，療之必愈。」

註按瘡瘍生蟲，乃肝經風熱，其成漏乃元氣虛弱，其出血乃脾虛有火，其潰膿乃元氣充實。至於嘔逆等證屬脾胃虧損所致，當調補元氣，庶保無虞。

㊟論原有五第二十二

一天行，二瘦弱，氣滯三怒氣，四腎氣虛，五飲冷酒，食灸燔，服丹藥。

註按前證所因雖殊，其治法亦當別經絡，陰陽虛實，表裏腫潰，以助胃壯氣爲主，使根本堅固，庶保無虞。

㊟分表裏第二十三

伍氏曰：癰疽皆因喜怒不測，飲食不節，陰陽不調，臟腑不和，腠理不密，寒氣客於經絡，或榮血受寒，則滯而不行，衛氣從之，與寒相搏，壅遏不通，或陽氣蘊積則生寒熱，寒熱不散皆致前證。又曰：五臟六腑俞穴皆在背，凡患瘡證易傷臟膜，多致不救，腑氣浮行於表，故癰腫浮高爲易治，臟血沉寒主裏，故疽腫內陷爲難治。又曰：癰者節也，癰者瘳也，疽者沮也，一寸至二寸爲癰，三寸至五寸爲癰，五寸至一尺爲疽，一尺至二尺爲竟體疽。若脈洪數者難治，脈微瀯者易治。初覺宜清熱拔毒，已潰則排膿止痛，膿盡則長肌敷痂，當酌量輕重，形證順逆而審治之。

註按前證若飲食少思，用六君子湯以補脾胃，如不應，加薑桂以溫補之，使邪氣自退，其不起者由邪氣盛，正氣虛不能發也，於旬日之外見之。若已發出，用托裏消毒散以壯元氣，助令潰腐，不應，須溫補脾胃，其不起者由真氣虛不能潰也，於二旬之外見之。若已腐潰，用托裏散以補氣血，生肌肉，不應，當專補脾胃，又不應，須溫補脾胃，其不起者，乃脾氣虛不能收斂也，於一月之外而見之。凡此治法，竊常用驗，詳具首論。

㊟別內外第二十四

李氏云：疽初發一粒如麻豆，發熱腫高熱痛，色赤，此爲外發，勢雖熾盛，治得其法，可保其生。若初時不發熱，體倦怠，患處如故，數日不腫痛，內臟已壞，雖有虛扁之藥，亦未如之何矣。

◎治貴在早第二十九

伍氏曰：夫癰發背者，皮薄腫高，多有椒眼數十粒；疽發背者，皮膚頑硬，狀如牛頭之皮，二證皆宜灼艾。癰成膿則宜針，其針當以馬銜鐵爲之，形如薤葉樣，兩面皆利，可以橫直裂開五六寸許，取去毒血，其病頓輕。須先灸，而後裂，可服神仙追毒丸，利去毒根，次服排膿托裏等藥，調治。疽成膿，則宜烙，用銀篋大寸許長六寸燒赤，頻烙患處，以膿出爲效。大抵癰疽難於諸科，非心傳契妙，其可以易治耶？

註：按前證若氣血充實，其膿既成，宜速針之，勿藥可愈。若氣血虧損，膿不能出，或膿出反痛，須托裏養胃，庶保終吉。詳見第四十。

◎津潤墨圍第三十

伍氏曰：但覺背兩胛間赤痒腫痛，或有白粒，且以津唾時潤令濕，切勿抓破。大抵在背微有赤腫點，或因抓破，入浴犯水，或因飲食膾炙而作，初未辨證，且以津潤時用墨圍之。若腫赤，急就圍中灼艾，最善。人皆疑火熱太過，以致延蔓，誤者衆矣！

註：按疽發背，若有瘀肉腐爛，膿水淋漓，腫痛仍作者，此處有筋一層間隔，內膿不出故也。宜用針引之。老弱者若待其自潰，多致不救，治者審之！

◎看色灼艾防蔓第三十一

伍氏曰：瘡腫赤色，按之色不變者，此膿已成矣。按之隨手赤色者，其亦有膿也。按之白良久方赤者，此遊毒已息，可就赤白盡處灸斷，赤腫自消。凡癰疽以手按之，若牢硬，未有膿也；若半軟半硬，已有膿也。又按腫上不熱者爲無膿，熱甚者爲有膿，宜急破之。

註：按瘡瘍毒氣已結而不發者，法當補其血氣，使膿速成而針之。其膿既潰，宜培養脾胃，以生肌斂口。大凡瘡瘍

註按前證有因元氣虛弱而毒氣內陷者，有因初作失於內疎托裏和榮衛者，有因毒盛失於消解者，有因虛弱失於補托者，有因膿成失於針刺者，有因腐潰失於補養者。若發背腦疽，屬濕熱上壅者，黃連消毒散，補中益氣湯，以除濕毒，補脾肺，滋腎水。若鬚疽銳毒，屬風熱者，柴胡山梔散，以清肝火，養肝血。若陰虛，用六味地黃丸，以生腎水，滋化源。若患於小腹，補足三陰之血，養脾胃之氣，庶可保其生也。其流注之證，或因飲食勞倦，房室陰虛，或七情內動，六淫外侵，以致血虛互相凝滯，或產後血瘀，隨虛流注，或結塊，或漫腫，宜用益氣養榮湯，以固元氣，佐以葱熨解散凝滯，更以豆豉餅祛散寒邪。潰久內有瘀肉，用針頭散腐之，多有生者。設若不守禁調攝，多致不起，慎之。

⑤先明形證逆順第二十八

癰疽潰後，形有逆有順。白睛黑小一惡也，不能下食，納藥而嘔，食不知味，二惡也，傷痛渴甚，三惡也，體項不便，四肢沉重，四惡也。聲嘶色脫，唇鼻青黑，面目浮腫，五惡也，煩躁時嗽，腹痛渴甚，瀉利無度，小便如淋，六惡也。膿血大泄，腫痛尤甚，膿色敗臭，七惡也，喘粗氣短，恍惚嗜臥，八惡也，未潰黑陷，面青唇黑，便汚，九惡也。氣噎痞塞，欬嗽身冷，自汗無時，目瞪耳聾，恍惚驚悸，語言顛倒，十惡也。又腦爲諸陽所會，頸項近咽喉腎俞，皆致命之所，俱不可灼艾。

註按前證未潰黑陷，面青唇黯，便汚者，臟腑內潰之惡證也。氣噎痞塞，欬嗽身冷，自汗者，脾肺虛敗之惡證也。不食便瀉，腸鳴耳聾目瞪者，脾腎虛敗傳變之惡證也。治法詳見附錄。

⑥審內證用藥附

自瀉嘔吐，不准飲食，腎脈最虛，如是之疾，古人皆以爲不治，然亦有救療之理焉耳。

註按前論發內經之微旨，開萬世之聾瞶，其惠博矣。此證實命門火衰，不能生脾土而虛寒，以致自瀉嘔吐，或胃腸不利，或食而不化，或大便不實，宜用八味丸及六君子加薑附。若因房勞過度，真陽衰敗，或原稟不足，不能生

註按前證敗肉去而新肉生者，須先微赤，四沿漸生白膜者，此胃中生氣也，用六君子湯以培補之。若赤甚者，血虛而有火也，用四物加參、芪、白朮以調補之。若赤而不生膜者，氣虛也，用四君加當歸、黃芪。若色白而無神者，氣血俱虛也，用十全大補加薑、桂，如不應急加附子。大凡瘡疽潰後，歹肉漸去，新肉漸生，此乃脾胃之氣充實也。若惡濁已去，宜用當歸膏。

㊟體察愛護第三十五

伍氏曰：癰疽一證，病人當自體察。凡初作先以墨圍患處，却視浮沉聚散，膿出視其多少，肉生視其闊狹，飲食視其美惡，臟腑防其秘泄，瘡口防其奢裂，宜戒怒勞，調補元氣，保愛體察，慎不可忽。

註按前論卽丹溪先生所云癰疽當先助胃壯氣，使根本堅固。東垣先生教人以飲食有節，起居有時，素問反覆言之，可不慎哉！大凡泄瀉易損元氣，腫瘍犯之不能成膿，潰瘍犯之不能生肌，患者審之。

㊟香藥調治第三十六

伍氏曰：氣血聞香則行，聞臭則逆。大抵瘡瘍多因營氣不從，逆於肉裏，鬱聚爲膿，得香之味，則氣血流行，故當多服五香連翹湯，萬金散，金粉散。凡瘡本腥穢，又聞臭觸則愈甚，若毒入胃則欬逆，古人用之可謂有理。且如飲食調令香美，以益脾土，養其真元，可保無虞矣。

註按前證說見第十八十九。

㊟飲食居處戒忌第三十七

李氏云：病疽之人，當戒酒麵、炙博、醃臘、法酒、生冷、油膩、雞鵝、魚鮮之類，起居七情，尤當深戒。臥室潔淨，馨香，使氣血流暢，仍忌僧道、孝子、產婦、經婦、雞犬、猫畜，若背疽難於隱，凡宜用藜豆十斗作一袋，隱伏其上，解毒涼心也。

註按前論慎起居，薄滋味，恐病者好動四體，甘嗜性熱性寒之物，使火益熾而胃氣益衰，則所患淹滯不愈，又誰

膿血既潰，當大補血氣爲先，雖有他證，當以未治。

㊟瘡口冷澇難合第三十二

治癰久不合，其肉白而膿少者，此氣血俱虛，不能潮運而瘡口冷澇也。每日用艾葉一把煎湯，避風熱洗及燒松香烟熏之，更以神異膏貼之，必須守禁調理，否則不效。

註按前證果因寒邪凝滯，氣血不能榮衛，宜用斯法，祛散寒邪，補接陽氣，其功甚大。若因氣血虛弱，不能潮會瘡口，必用補脾胃生氣血爲善。丹溪先生云：諸經唯少陽厥陰之生癰疽，宜預防之，以其多氣少血也。血少則肌肉難長，瘡久未合，必成敗證。苟反用驅利毒藥，以伐其陰分之血，禍不旋踵矣。

㊟用藥溫涼防祕泄第三十三

伍氏曰：凡瘡家皆宜宣去其毒，蕩滌陳莖，宜用神仙追毒丸，六味車螯散，五香連翹湯，千金漏蘆湯，更當詳辨稟賦強弱，臨時加減。大抵治瘡要法，須臟腑堅而不祕，通而不泄，則真氣不耗，邪無所留，如祕結神效麻仁丸。凡瘡潰後，尙覺虛熱，可與五香湯加大黃，確且如治瘡溫藥，先用桂以通血脈，宣導百藥，冷藥必用地黃補不足，益氣填髓，近用乳香散，乳香消毒，菉豆清熱，真良藥也。

註按大腸祕結，果因血燥，胃氣不虛，最宜前藥。若因精血枯涸，用八珍桃仁、麻仁。其潰後發熱，若因氣虛，用四君、黃芪、當歸血虛用四物、白朮、茯苓，氣血俱虛，用八珍、黃芪。若大便秘，小便赤，用四物麥門五味。如不應，急用加減八味丸，或六味丸。若下後元氣傷而發熱，用六君、當歸，胃氣虛而發熱，用補中益氣湯。大凡二便，肝腎主之。經云：腎主五液，開竅於二陰。若津液滋潤，大便通利，若津液不足，必因脾氣虧損，當培養化源。

㊟生痴切護第三十四

伍氏曰：癰潰之後，敗肉漸去，新肉漸生，日見堆阜，方成白膜，新肉，當滋養平復，保無虞。大凡瘡口未可速合，日用豬

④敷神異膏第四十

凡疽證先以麥飯石膏塗之，俟瘡根漸收，却敷神異膏斂之。夫癰疽之發有淺深，故收斂之功有遲速，斷不可早用收口之藥，恐毒氣未盡，後必復發，爲患匪輕。但麥飯石膏難於修合，用神異膏亦效。

註按前證若毒已解，而不生肌收斂者，元氣虛也，用六君子湯壯其脾胃，則肌肉自生，設有餘毒，亦能自解。

⑤口緊小硬第四十一

李氏云：大抵疽口緊小而硬者，蓋因風毒所勝，合用蜈蠍散搽瘡口，以神異膏貼之。

註按前證乃風寒滯於瘡口而未傳於內也。凡傷損之證，尤多此患。經云：風者善行數變，入臟甚速，死生在乎反掌，當急分表裏虛實而治之。其邪在表者，善伸數欠，筋脈拘急，惡寒惕擗，脈浮而弦，宜羌活防風湯和解之；傳於裏者，舌強口噤，項背反張，筋惕搐搦，痰涎壅盛，胃腹滿悶，或便閉溺赤，時或汗出脈洪數而弦，宜大芎黃湯疏導之；其汗初出者，由風熱鬱於裏，亦宜大芎黃湯之類下之；若熱既退，臟腑已和而汗仍出者，表虛也，宜白朮防風湯以實其表。然解散和解除導三法，此治暴患之證，氣血未損者；若膿痰內焮而見前證者，宜針之，急投十全大補，或口噤遺尿，乃氣血虛極，亦用十全大補加炮附子。大抵此證若因膿血去多，宜以補中益氣加羌活主之；或人素多痰，因傷損而見風證，宜二陳白朮芎歸梔子芩連氣虛加四君，血虛加四物，血氣俱虛內熱甚而生風者，宜四物參朮柴芩梔子，若因怒傷而見前證，宜小柴胡湯倍加川芎山梔天麻釣藤鉤。若患破傷風，至三五年忽然復發，或跌撲而患者，皆氣虛有痰所致也，用二陳參朮芎歸主之。

⑥喉舌生瘡如菌第四十二

李氏云：癰疽不服內托散，或失宣內毒，致咽喉口舌生瘡，甚則生紅黑菌，害人甚速，當用琥珀犀角膏治之。向有患此證者，諸法不效，余用此藥一日而安。

咎哉！不若預爲之防，當以古人之言爲戒，如菘豆性寒，主丹毒煩熱風疹，或金石所發實熱煩渴，飲食如常，證屬純陽者宜用，否則不可用也。

⑤更易良方第三十八

李氏云：常見世間醫者，每有妙方，祕而不傳，或更改以惑人，誠可惡也。余思西華麥飯石膏，守死不傳，其立心私刻，君子責之矣。昔趙公宣教字季修來宰龍泉，兼程而進，患鼻衄，日出數升。時家兄教以服藕汁地黃膏。趙叩諸醫云：此爲戒服之劑，乃數易醫無效。家兄陰餽前汁，服三日而疾愈。兄曰：此卽前所獻之方。趙驚歎曰：「向非醫者譎計以惑我，早信此方，豈久受此困也！」今以屢試屢驗，不可易者，如因熱毒衝心而嘔，用肉托散一名萬金散，因脾胃虛弱而嘔，嘉禾散，熱毒腫痛麥飯石膏，陰虛作瀉，加減八味丸。此四方屢爲醫人眩惑，使人忽用，深憫患者之受苦，故舉趙公之事以例之。

註竊以爲方者做也，做病因以立方，非謂內經無方也。若執古方以治今疾，猶折舊字以對新字，其長短大小，豈有舍匠氏之手而能合者乎？設或有合，以爲亘古不易之方，此又先王普濟之神術，奚必祕而私之耶？余嘗觀太無先生治滇南，一僧遠遊江浙，思親成疾，先生惠之以飲食藥餌，復贈金一鎰以資其歸，此固我醫道之當然也。今之醫者，或泥古，或吝祕，或嗜利以惑人，其得罪於名教多矣。

⑥麥飯石膏第三十九

李氏云：麥飯石膏，治發背癰疽，神妙，惜世罕知，有患者因膿不潰，以毒藥卷之，其勢益甚，毒延咽喉，脚膝，皆爲不治。余用此膏，一夕頓潰。凡疽得膿，其毒始解，或有不潰者，須用此膏，故錄之，俾精擇修合以收十全之功也。

註按前證屬腑屬陽，而氣血未損者，用前膏敷之，固無不愈。然亦有屬臟屬陰，而氣血有虧者，當審其因而調治，其內可也。大凡瘡瘍之作，由胃氣不從，瘡瘍之潰，由胃氣腐化，瘡瘍之斂，由胃氣營養，余常治初結成膿者，托而

李氏論云：凡癰不可食牛、羊、雞、鵝、蝦、魚、酒、麪、煇炙之物，犯之必發熱，宜服梔子黃芪湯。大凡臟腑已利，瘡毒已潰，氣血既虛，最當調護。若發熱而服涼藥，無不致禍。

註按前證，若飲食傷脾胃而發熱，用六君、神麴、山楂；若陰血不足而發熱，用四物、參朮黃芪。若膿血出多而發熱，用十全大補湯。東垣先生云：胃為五臟之根本，胃氣一傷，諸臟皆虛，七惡蜂起，可不慎哉！

㊟作渴調補精氣第四十七

伍氏云：癰疽發熱大渴，毒氣熾盛，急用神仙追毒丸驅下惡毒，次以清臈湯、萬金散、五香連麴湯、六味車螯散、千金漏蘆湯選用之。渴不止，用祕傳金粉散、人參黃芪散、內補散之類以補津液，生血氣，其渴自止。

註按前證若脈沉實，大便秘結，宜用前藥驅逐積毒。若發熱作渴，飲食如故，大便如常，屬胃經實熱，用竹葉石膏湯以清胃熱，生津液。若發熱作渴，飲食少思，大便不實，屬胃經虛熱，用竹葉黃芪湯以補胃氣，生津液。若發熱惡寒，若內熱晡熱，口乾作渴，屬氣血不足，用八珍、麥門、五味以補肝脾，生精血。

㊟將安發熱作渴第四十八

李氏云：凡疽愈後，忽發渴而不救者，十有八九，或先渴而患疽者，尤為難治，急用加減八味丸，可免前患。如能久服，永不作渴，亦無疽證，且氣血皆壯，真神劑也。

註按前證屬腎水枯涸，虛火上炎，口乾作渴，飲水無度，或唇乾作裂，小便頻數，或痰氣上壅，煩躁不甯，或二三年先作渴飲水，或口舌生瘡，兩足發熱，痰氣上壅，或瘡愈三四年而口乾作渴，小便頻數，急用前藥，多有復生者，能逆知其因，預服前丸，可免此患。若兼手足厥冷，真陽虛也，宜服八味丸。大凡瘡後審其腎水不足，用加減八味丸。中氣虛弱，用補中益氣湯。氣血虛弱，用十全大補湯。陽氣虛寒，加薑桂，如不應，用八味丸。

㊟口乾作渴不同第四十九

註按前證多因酒色過度，虧損腎水，虛火上炎，或五疔元氣消燬，虛火上攻而致，治當滋其化源，最忌黃蘗知母之類，恐復傷胃氣也。

替針丸第四十三

曾氏曰：癰疽膿熟，塗以替針丸，瘡口自開。古人云：癰疽能殺人，若針藥得其宜，則生，失其宜則死，可不慎哉！

註按瘡瘍之證，若毒氣已結腫赤熾盛，中央肉死黯黑者，內用托裏健脾之劑，外用烏金膏塗之，則黯處漸低，赤處漸起，至六七日間，赤黯之界自有裂紋，如刀劃狀，其黯漸潰，若用鉞鋒利剪除去尤好，須使不知疼痛，不見鮮血爲善。若膿未流利，宜用針於中引之，若膿水已出，腫痛仍作，乃內筋間隔，亦用針引之。若元氣虛弱，誤服剋伐之劑，患處不痛，或肉死不潰者，急溫補脾胃，亦有復生者，後須純補脾胃，庶能收斂。若妄用針刀，去肉出血，使陽隨陰散，是速其危也。若膿潰而煩痛未痊，脈洪滑大散者，真氣虛而邪氣實也，爲難治。脈微濇遲緩者，邪氣虛而真氣將復也，爲易治。

割傷第四十四

李氏云：癰疽有悞搽毒藥，或針刀開割，瘡口不合，不可用澀斂之藥，宜用猪蹄湯，北艾湯間洗，傳貼神異膏，及服內補十宣散，內托黃芪丸。

註按經云：脾主肌肉，脾健則肉自生。然其勢熾甚，宜用前藥以消其毒，毒將盡，宜用四君湯以養脾。

寒熱多汗用藥第四十五

李氏云：有數人病背疽，或先寒後熱，先熱後寒，或連日或間日，必嘔痰大汗而止，皆用柴胡、恆山，不應。余謂此因脾氣不正，復感寒邪痰盛而作，遂先用不換金正氣散，次用排膿內補散，木香湯，三日即愈。

註按前證若外邪既去而仍作，宜用六君子湯以補脾胃，大凡胃氣虛而作嘔者，必喜溫熱，毒內攻而作嘔者，必

註按前方誠有回生之功治法見前論。

㊟調節飲食當平胃氣第五十三

論曰素問云形不足者溫之以氣精不足者補之以味。大凡瘡疽當調脾胃，蓋脾爲倉廩之官，胃爲水穀之海，主養四旁須進飲食以生氣血，宜用茯苓開胃散，人參內補散，內補十宣散。

註按人參順氣散，因脾肺腎氣盛壅遏，宜用此以疎泄之。若氣虛壅滯，必用益氣養榮湯以調補之。今之患者，多因氣血受傷，當隨證而施治。若胃氣鬱滯，宜用茯苓開胃湯。若胃氣虛弱，用四君子湯。若胃氣下陷，用補中益氣湯。若脾氣虛弱，用六君子湯。若脾氣鬱結，用歸脾湯。

李氏曰胃氣弱不進飲食，合服嘉禾散，每五兩加人參、丁香、沉香、白豆蔻，各二錢。有一貴人苦疽，用藥失序，脾虛不食。余欲用嘉禾散，或云內有丁沉香，乃別服藥，不應仍用前散，飲食頓進。

㊟成漏脈例第五十四

經云：陷脈爲漏，留連肉腠，蓋脈得寒則下陷，凝滯肌肉，故曰留連肉腠，是爲冷漏，須用陷脈散、桂附丸溫補之。

註按瘡瘍爲漏，皆因元氣不足，營氣不從，逆於肉裏，或寒氣相搏，稽留血脈，腐潰既久，陽氣虛寒，外邪乘虛下陷，卽成是患。若治其初患，當內用參芪歸朮溫補脾胃，外用桑枝葱熨，接引陽氣，使自消散。若久而不能成膿，亦用前二法補助以速之。若膿既成而不潰，用艾於當頭灸數炷以出之，却服十全大補湯，患者又當懷起居，節飲食，庶幾收斂。若用冷針開刺久而內出青膿，外色黑黯，或誤用生肌散速其收斂，反助其邪，必成敗證。

㊟基針法第五十五

洪丞相治癰疽，初作先以筆管一箇，入螞蟥一條，以管口對瘡頭，使基吮瘡膿血，其毒卽散，如瘡大須換三四條，若吮正穴，基必死矣，累試累效。若血不止，以藕節上泥塗之。若瘡頭未明，以井邊泥塗上先乾處卽是。

李氏云：癰疽已安之後，或未安之際，口舌燥黃如雞內金者，乃腎水枯竭，心火上炎，此證最惡。古人云：玉華池竭七朝亡。若誤投以丹藥，禍在反掌，急用加減八味丸、桑枝煎、五味子湯以滋補之。

註按前證若不慎房事，虧損真陰而虛火上炎，亦多患此。若發熱作渴，或口舌生瘡，或小便頻數，或莖中作痛，亦宜用前藥。其桑枝補血氣生津液，輕身明目，補肺腎之良劑也。五味子湯乃六一散、生脈散之複方，滋化源之良劑。若腎水既涸，虛火上炎，而口燥作渴者，須佐以加減八味丸。詳見附錄用藥關鍵。

⑤腎虛發熱第五十

李氏曰：一癰疽之熱，未有不自腎虛而得之者，必須五更服加減八味丸。

註按癰疽皆由腎經濕熱，虛火上炎，中傳惡證，若非加減八味丸滋腎水以制心火，補中益氣以生化源，欲望其生難矣。啓元子曰：大寒而甚熱之不熱，是無火也，當助其心，大熱而甚寒之不寒，是無水也，當益其腎。夫寒之不寒，責其無水，熱之不熱，責其無火，熱之不久，責心之虛，寒之不久，責水之少。竊謂無火者，當用八味丸以益其心，無水者，當用六味丸以滋其腎。

⑥將安當補第五十一

李氏云：疽疾將安，每日當服十全大補湯以補氣血，宜與排膿內補十宣散相間服。

註按前云潰瘍屬氣血俱虛，固在所當補，若患腫瘍而氣血虛弱者，尤宜預補，否則雖潰而不斂矣。凡大病之後，氣血未復，多致再發，若不調補，必變爲他證而危，或誤以爲瘡毒復發，反行攻伐，速其不起，深可爲戒也。詳見附錄用藥關鍵。

⑦服藥捷徑第五十二

李氏云：凡患瘡疽而腎脈虛者，急服補藥，尚恐有誤，如鹿茸、附子之藥，是猶抱薪救火，反益其勢而平補之藥，亦難

汗氣無暇，體便熱，汗道不通，力不支，氣逆，耳聾目眩，小便自遺，或時淋瀝，瀉利腸鳴，裏急腹痛，玉莖短縮，冷汗時出，齒浮痛，肢體麻痺，或厥冷身痛，咬舌嚙唇，舌本強硬，餽逆喘促，脈微沉細，此危殆之證，但見一二，急用大劑參附湯補之，多得復生。

一瘡瘍潰後發熱煩躁，若發熱無寐，血虛也，聖愈湯；自汗不止，氣虛也，四君子加黃芪五味子；發熱煩躁，肉瞤筋惕，氣血虛也，八珍湯；大渴面赤，脈洪大而浮，陰虛發熱也，當歸補血湯；肢體微熱，煩躁面赤，脈沉微陰盛發躁也，四君薑附。

一瘡瘍大便秘結，若作渴飲冷，其脈洪數而有力者，屬實火，宜用內疎黃連湯；若口乾飲湯，其脈浮大而無力者，屬氣虛，宜用加味八珍湯；若飲食雖多，肚腹不脹，此內火銷鑠，切不可通，若腹痞脹而不通者，乃因直腸乾涸，以豬膽汁導之；若誤行疏導，復傷元氣，則不能斂潰。

一瘡瘍大便泄瀉，若因寒涼傷脾，六君加砂仁；脾氣虛弱，六君煎送二神丸；脾虛下陷，補中益氣，送二神丸；命門火衰，用八味丸料，煎送四神丸；腎虛不固，薑附湯加茱萸五味；脾腎虛寒，參附湯送四神丸；脈沉而細，飲食不下，用薑附湯，多有復生者。

一瘡瘍小便頻數，或莖中澀痛者，乃腎經陽氣虧損，陰無以化之惡證也，用加減八味丸以補陰；足脛逆冷者，用八味丸以補陽；小便頻而黃者，四物加參朮麥門五味，以滋肺腎；小便短而黃者，補中益氣加山藥麥門五味，以補腎；若熱結膀胱而不利者，五淋散以清熱；脾肺氣燥而不化者，黃芩清肺飲以滋陰；若膀胱陰虛，陽無以生者，宜滋腎丸；膀胱陽虛，陰無以化者，宜腎氣丸；若老人陰痿，精內敗者，用加減八味丸，加車前牛膝，如不應，加附子，若大小便牽痛，愈痛則愈，愈便則愈痛，以前藥加附子多有生者。苟用黃蘗知母淡滲之劑，既瀉真陽，復損真陰，速其危矣。一瘡瘍作渴，厥痛發熱，便利調和者，上焦熱也，用竹葉石膏湯；腫痛發熱，大便秘澀者，內臟熱也，用四順清涼飲；厥

註按癰疽既成，毒血凝聚於外，可用此法；吮去固善，但能治其末耳。又當審其邪在表裏，併元氣虛實而藥之，斯內外合一，而為萬全之治也。

⑤ 藥括關鍵處治

一瘡瘍用藥，當審其經絡受證，標本虛實以治之，不可泥於熱毒內攻，專用寒涼剋伐之劑，虧損脾胃氣血，多致有誤。若腫高焮痛者，邪氣實也，先用神仙活命飲，後用托裏消毒散。漫腫微痛者，真氣虛也，用托裏散，如不應，加薑桂。若不作膿不腐潰，陽氣虛也，用四君子加黃芪肉桂。若膿既出而反痛，氣血虛也，用八珍散。不生肌不收斂，脾氣虛也，四君子加芍藥木香。又當舍時從證，如腫痛煩躁發熱，飲冷便秘，脈洪數實，是為五實，雖在嚴寒，必用大苦寒之劑，瀉其陽以救其陰；若脈細皮寒瀉利腸鳴不食嘔吐手足逆冷，是為五虛，雖在盛暑，必用大辛熱之劑散其陰以回其陽，若執其常法，則誤矣。

一瘡瘍作嘔，如熱盛焮痛，邪氣實也，用仙方活命飲解之，若因作膿焮痛，胃氣虛也，用托裏消毒散主之。膿熟脹痛，氣血虛也，用托裏散，或針以泄之。焮痛便秘，熱蘊於內也，用內疎黃連湯導之。寒藥傷胃者，托裏建中湯；食少胃寒者，托裏益中湯；中虛寒淫者，托裏溫中湯；肝木乘脾土者，托裏益清湯；胃脘停痰者，托裏清中湯；脾虛自病者，托裏益黃散；鬱結傷脾者，托裏越鞠湯。

一瘡瘍用圍藥，如腫痛熱渴，證屬純陽，宜內服濟陰丹，外敷抑陽散。若似腫非腫，似痛不痛，似潰不潰，屬半陰半陽，宜內服沖和湯，外敷陰陽散；若微腫微痛，或色黯不痛，或堅硬不潰，證屬純陰，宜內服回陽湯，外敷抑陰散。

一瘡瘍作痛，若大便祕結者，用內疎黃連湯；熱毒熾盛者，仙方活命飲；瘀血凝滯者，乳香定痛散；作膿而痛者，托裏消毒散；膿脹而痛者，針之；膿潰而痛者，補之；氣虛而痛者，四君歸芪；血虛而痛者，四物參芪；腎虛而痛者，六味地黃丸；口乾作渴，或小便頻數，加減八味丸。

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百六十二

外科癰疽疔毒門四

明李梴醫學入門

○癰疽證治

癰者壅也，為陽屬六腑，毒騰於外，其發暴而所患浮淺，不傷筋骨。疽者沮也，為陰屬五臟，毒攻於內，其發緩而所患深沉，傷筋蝕骨。凡年壯氣血勝毒則順，年老毒盛氣血則險。有內因飲食積毒者，經曰：膏粱之變足生大疔，榮氣不從，逆於肉理，榮氣即胃氣，胃和則榮衛順而滋養皮膚，膏粱金石厚衣烘被，以致蘊熱臟腑，濕熱聚下，燒燂腎水，陰火熾盛，八脈沸騰，經隧凝滯，故水穀精微不能上行陽道，反逆聚肉之腠理而成癰。有外感風寒濕氣蘊毒者，經曰：地之濕氣，感則害人皮肉；又曰：諸癰腫筋變骨痛者，此寒氣之腫，八風之變也。蓋風濕外侵，鬱久為熱，自膀胱左遷移熱小腸，小腸移熱於膽，風性上衝，瘡形高色赤作痛，小則為疔，大則為癰而已，非若疽之自裏也。有因心氣鬱結，饑飽勞役，房室過度，水竭火炎，痰氣凝滯而成，所謂相火能為瘡瘍諸痛，瘡瘍皆屬心火是也。因火有君相，瘡分微甚，或鬱痛而不甚腫，或虛腫而不甚痛，雖然病該三因，總皆濕熱。丹溪云：人身血行脈中，氣行脈外，氣血周流不息，惟寒濕搏之則凝滯而行遲，火熱搏之則沸騰而行速。氣為邪鬱，津液為痰為飲，積久滲入脈中，血為之濁，此陰

腫痛盛者，熱毒蘊結也，用仙方活命飲；漫腫微痛者，氣血虛壅也，用補中益氣湯；若因胃火消燦而津液短少者，用竹葉黃芪湯；若因胃氣虛而不能生津液者，用補中益氣湯；若因胃氣傷而內亡津液者，用七味白朮散；若因腎水乾涸作渴，或口舌乾燥者，用加減八味丸，或先口乾作渴，小便頻數而後患疽，或疽愈後作渴，飲水，或舌黃乾硬，小便數而疽生者，尤其惡也，苟能逆知其因，預服加減八味丸，補中益氣湯，以滋化源，可免是患。

一瘡瘍出血，因五臟之氣虧損，虛火動而錯經妄行也；若因肝熱而血妄行者，四物加炒梔、丹皮、蒼朮；肝虛不能藏血者，六味地黃丸；心虛不能主血者，四物加炒連丹、皮、蒼朮；若脾虛熱不能統血者，四君加炒梔、丹皮；若脾經鬱結者，用歸脾湯加五味子；若脾肺氣虛者，用補中益氣加五味子；若氣血俱虛者，用十全大補；若陰火動者，用六味丸加五味子。

一瘡瘍用針，當辨生熟淺深：若小按即痛者，膿淺也；大按方痛者，膿深也；按之而不復起者，膿未成也；按之而即起者，膿已成也；若膿生而即針，則徒泄其氣血而膿反難成；若膿熟而不針，則腐潰益深，瘡口難斂；若瘡深而針淺，則內膿不出，外血反泄；若瘡淺而針深，則內膿雖出，良肉反傷，其元氣虛弱，必先補而後針，不論尻神，若膿出而反痛，或煩躁嘔逆，皆由血氣虧損，宜急補之。不論尻神者，蓋因患處已潰故也。一瘡瘍肌肉不生，若赤色而不生者，血熱也；四物湯加牡丹皮、晡熱內熱，血虛也；四君子加歸地、丹皮；若膿水清稀，氣血俱虛也；十全大補湯，食少體倦，脾氣虛也；補中益氣湯，煩熱作渴，起居如常，胃火也；竹葉黃芪湯，煩熱作渴，日晡熱甚，腎虛也；用加減八味丸。

論多骨疽

多骨疽者，由瘡瘍久潰，氣血不能營於患處，邪氣陷襲，久則爛筋腐骨而脫出，屬足三陰虧損之證也；用補中益氣湯以固根本；若陰火發熱者，佐以六味丸，壯水之主，以鎮陽光；陽氣虛寒者，以八味丸益火之源，以消陰翳；外以附子、蔥熨法祛散寒邪，補接榮氣，則骨自脫，瘡自斂也。夫腎主骨，若腎氣虧損，其骨漸腫，在苒歲月潰而出骨，亦用

癱手太陽陽明經胃脘癱足陽明經若少陽少陰太陰多氣少血厥陰太陽多血少氣肉皆難平惟手足陽明氣血俱多分經用藥則不犯經禁病禁以致妄下妄汗且瘡屬腎經者最重脾肺二經者次之他經者又次之腦乃諸陽所在咽喉飲食所通腎命根所係皆至險之地又不可多著艾灸俗拘於人形瘡樣而忽經絡謬哉

毒因外感發者內無便溺阻隔外有六經形證腫痛雖甚飲食如常脈浮數邪在表也宜托裏微汗以表散之如發腦項背分黃連消毒散尻臀分內托羌活湯臂上白芷升麻湯乳臂內托升麻湯兩脅十味中和湯腿外側內托酒煎湯腿內近膝股內托芪柴湯通用敗毒散九味羌活湯辛熱手足太陰經分自汗浮腫流注四肢附子六物湯辛溫發熱十六味流氣飲賽命丹暑月內托復煎散寒月內托十宣散或不換金正氣散丹溪治形實脈浮數冬月背生紅腫及胛骨不痛者用桂麻各半湯加生附酒蘖苦蕒仁甘草節羌活青皮人參黃芩半夏薑煎服六貼而愈此正內托法也有謂瘡家身痛不可汗汗之則發瘡者邪不在表而誤汗也

內傷飲食積毒者腫痛異常外無六經形證內有便溺阻隔口渴煩躁脈沉實爲邪在裏急與寒涼攻裏內疎黃連湯瀉心湯活命飲四順清涼飲輕者清熱消毒飲加紫草或清心散滲之

內積熱毒外又感邪宜發表攻裏五香連薤湯防風通聖散毒盛者解毒湯下神芎丸濕盛者除濕丹

毒因內傷虛損房勞鬱怒而發者形雖腫痛外無六經之形證內無便溺之阻隔知邪在經也不可妄施汗下只宜補形氣調經脈和榮衛或專補脾胃可也鬱怒者十六味流氣飲虛勞者托裏消毒散內托復煎散補中益氣湯古人治癰以寒藥者正治法也治疽以熱藥者從治法也蓋藥性熱則宣行寒則疎泄疽乃有形之物非熱藥從治豈能行之乎此內托內疎正治從治之義也

潰後氣血大虛惟恐毒陷托裏之法一日不可缺也古方托裏散托裏清中湯托裏定中湯托裏和中湯托裏建中湯托裏抑青湯托裏益黃湯托裏益氣湯選用蓋托裏則氣血壯而脾胃盛膿穢自排毒氣自解死肉自潰新肉自

滯於陽而爲癰；血爲邪鬱，隧道或溢或結，積久溢出脈外，氣爲之亂，此陽滯於陰而爲疽。蓋陽氣無形，陰血有質，必濕熱泣血而後發爲癰疽。故局方曰：癰疽皆熱盛血也。又曰：二熱相搏，熱化爲膿，蓋熱非濕則不能腐壞，肌肉爲膿。譬如夏熱諸物皆不壞爛，壞爛者必在交秋濕熱大行之際，此理甚明。

癰疽有大而愈者，有微如豆而死者。陽發初起皮薄作熱，色赤焮腫疼痛，潰後肉色紅活，此爲外發，更加身健能食，發熱便秘，脈數有力，爲純陽易治。陰發初起皮厚不熱，色黯微腫硬，如牛領之皮，不痛陷軟，不作膿，不潰微開，闔破後肉色紫黑，此爲內發，未潰臟腑已經壞爛，更加身倦少食，不熱便利，脈軟無力，爲純陰不治。又有半陰半陽似腫非腫，似痛非痛，似赤非赤，似潰非潰，脈數無力，如陽多陰少，用藥托裏，變陽者生；陰多陽少，用藥托亦不起，投陰必死。就中尤以有熱無熱爲死生妙訣。蓋陽證有熱，則氣血行而生肌，陰證無熱，則氣血滯而不斂。遇有熱者，切不可退熱，但宜溫藥清滲些，小癰毒無熱亦不妨。

癰疽雖止發於一經，或兼二經，多有挾風挾濕，挾痰挾氣，挾血挾陰虛等證。大槩風氣食三種，俱以不換金正氣散加川芎木香爲主，兼風多痒，加祛風藥，兼氣多痛，加調氣藥，兼食多發寒熱，加消積藥，兼濕多腫，加滲濕藥。又云：熱瘡焮痛，虛瘡淡白，風寒瘡口帶白。古方外因四氣，單用大黃半生半熟，甘草節等分爲末，每空心酒下一匙，以利爲度，內因七情，單用遠志爲末，酒調二錢，澄清服，以查敷患處，不內外因金石炙煨房勞國老膏一切熱毒，槐花酒，金石藥毒，則堅硬如石，不痛，宜甘草黑豆煎湯解之。虛勞瘦弱榮衛否澀，患處重著如負石，然因其有骨蒸潮熱也，治宜滋補，故不可用養命丹等香燥疎泄之藥，亦不可過用降火滯脾之藥，惟腎氣丸托裏散甚得其宜。且古方謂毒藥衝蒸癰疽極重。

近骨者多冷，久則化血爲蟲，多痒少痛；近虛者多熱，久則傳氣成漏，多痛少痒。

腦發屬腎脈足太陽經，鬢發手足少陽經，眉發手足太陽少陽經，頤發髭發，足陽明經，腮發手陽明經，背發中屬督

人身氣血遇溫則散遇寒則凝。凝敷寒涼閉塞，腠理氣凝，血瘀舊肉不潰，新肉不生，則毒反內攻，難以潰斂，甚則不起。必內分陰陽用藥，外分陰陽敷圍，內外夾攻，藥氣相通爲妙。純陽證，內服內疎黃連湯，清熱消毒飲之類，外敷抑陽散；半陰半陽證，內服托裏消毒散，外敷陰陽散；純陰證，內服補中益氣湯，加薑附入酒煎，外敷抑陰散。點瘀爐灰膏，以去惡肉藥線，三品錠子以透膿管，皆欲敗腐盡除，不至侵蝕筋骨，非得已而用之也。

癰疽不可不痛，不可大痛，未潰前痛者爲熱毒便祕，宜內疎黃連湯解毒湯，作膿痛者排之，膿脹痛者針之。已潰膿出反痛者，虛也，氣虛四君子湯加歸芪；血虛四物湯加參芪；氣血俱虛，托裏益氣湯；脾虛者，托裏和中湯；腎虛者，腎氣丸。因登廁犯穢氣觸者，藥中加乳香、芷芍之類和之。風寒逼者，加防風、桂枝之類溫散之；燥者，潤之；濕者，導之。果係瘀血惡肉凝滯者，方可乳香止痛散和之。

瘡口不斂，由於肌肉不生，肌肉不生，由於腐肉不去，腐肉不去，由於脾胃不壯，氣血不旺，必以補托爲主，而佐以行經活血之藥，則肌肉受毒者自生，死者自潰，又何待於點割也。大要氣虛體倦，食少者，補中益氣湯；血虛晡熱內熱者，四君子湯加歸地、牡丹皮；膿水清稀者，氣血俱虛，十全大補湯，或不痛，或大痛，或不赤，或內膿不潰，或外肉不腐者，氣血虛敗，桑枝灸法，十全大補湯加薑桂壯其陽氣，則四畔卽消，瘡頭卽腐。若脾胃虛弱，慢腫不赤者，六君子湯倍白朮。若初起腫痛，或因剋伐及入房，以致色黯而不痛者，乃陽脫變陰，急用古參附湯以救之。間有血分虛熱者，瘡口肉色必赤，四物湯加山梔、連翹。氣分虛熱煩渴者，竹葉黃芪湯。要知瘡口難斂，或漸大漸開出血者，危俗皆以腫痕所至爲暈，非真暈也。暈生於瘡口之畔，狀如紅筋，二暈三暈尙可，四暈五暈者死。

洗藥疎通氣血，膿血掀聚之時，所賴朝夕煖酢醃洗敗肉，或洗毒散肉汁湯，風冷瘡口白者，乾艾煎湯亦好。膏藥多熱，輕小瘡癩貼之卽消，發表不遠，熱之意也。若大毒初起，用之迷塞凝滯，爲禍不小。惟潰後只用白蠟膏、太乙膏，或水粉膏外護，不致破傷風寒。

生瘡口自斂；若不務補托而誤用寒涼，反助邪火，膿多臭穢，甚則脈洪大渴，真氣虛而死矣。丹溪云：但見腫痛，參之脈證虛弱，更與滋補，乃可萬全，又不必泥氣質素實，及參芪滿中滯痰也。但初潰時間有熱毒盛者，量加消毒清劑，如發背搭肩，膜破穿心，必死，尤宜托裏，免致毒陷，托裏即護心也。若毒氣上攻，心神昏悶欲嘔者，間服護心散以救之；如帶表邪面赤等證，勢未甚起者，內托復煎散，或內托十宣散，暫服，若無熱毒表邪，但見穢氣觸犯虛熱，少食不睡者，便進人參黃芪湯，但見膿多心煩少睡者，便進聖愈湯，但見脾虧氣弱，不能生肌收斂者，便進補中益氣湯，但見腎虛不能消潰收斂，或晡熱作渴者，便進八味丸，或腎氣丸，緊急不及作丸，大料煎服，預防救危，始終妙劑。若不務根本而專用敷圍生肌之藥，則斂口太速，毒反內攻，或旁邊再發一癰者，有之，或愈後而惡證頓起，大命隨去者，有之，惟務內治而不貴外治者爲高。

形傷則痛，氣傷則腫，或先痛後腫，傷乎血，先腫後痛，傷乎氣，腫痛並攻，氣血俱傷，皆因臟腑不和而非外治能調，古法隔蒜灸法，豆豉餅，惟外傷成瘡者不宜，自內發者，痛則灸至不痛，不痛則灸至痛時方住。早覺早灸爲佳，一日二日，十灸十活，三日四日十灸七活，五日六日十灸四活，過七日則不可灸矣。其餘點割敷透，間有毒盛者，量用之則可。

癰疽毒氣已成，宜托裏以速其膿，膿成者當驗其生熟淺深而針之。若腫高而軟者，發於血脈，腫下而堅者，發於筋脈，肉色不變者，附於骨也。按之熱者有膿，不熱者無膿，按之便痛者膿淺，大按方痛者膿深，按之陷而不起者膿未成，按之而復起者膿已成，按之都軟者無膿，不痛者血瘤，痛者氣瘤，按之一邊軟者有膿。若膿生而用針氣血既泄，膿反難成，若膿熟而不針，腐潰益深，瘡口難斂。若瘡深而針淺，內膿不出，外血反泄，瘡淺而針深，內膿雖出，良肉受傷，元氣虛者，必先補而後針其膿，諸證自退。若瘡毒熾盛中有肉黯者，宜內壯脾胃，外塗單巴豆膏，令其黯處漸低，不愈所高，六七日間赤黯之處，自有裂紋，如刀割狀，黯肉漸潰，當用鉞針利剪徐徐引去。若膿出肉腐，腫痛仍作，必

便秘因熱毒入臟，嘔哕心逆，發熱腫硬，便秘結固，宜通之。又有伏熱陽氣拂鬱，面赤便秘者，為邪火在經，宜汗以發之。潰後氣虛，血涸便秘者，十全大補湯，或因入房傷腎便秘者，加薑附以回陽氣，則大便自潤。凡便秘能食而肚腹不脹者，切不可下，若腹痞脹而秘者，豬膽法，用豬膽一枚，剪去頭入鹽酢少許，以鵝管插入膽中，灌穀道內，須臾自通。小便淋澀，頻數短少，或莖中澀痛，皆腎虛惡證。

膿血既泄，腫痛尤甚，膿色臭敗者，胃虛火盛，二惡也。人參黃芪湯，或十全大補湯，加麥門冬、五味子。

目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳人上視者，肝腎陰虛，而目系急，三惡也。腎氣丸料，或八物湯，俱加炒山梔、麥門冬、五味子。

喘粗短氣，恍惚嗜臥者，脾肺虛火，四惡也。六君子湯，加薑棗，或袖中益氣湯，加麥門冬、五味子。心火剋肺金，人參平肺散，陰火傷肺，腎氣丸料，加五味子煎服。肩背不便，四肢沉重者，脾腎虧損，五惡也。袖中益氣湯，十全大補湯，俱加山藥、山茱萸、五味子。

不能下食，服藥而嘔，食不知味者，胃氣虛弱，六惡也。六君子湯，加木香、砂仁，甚則加附子；挾痰者，托裏清中湯；挾火者，托裏益黃湯。

瘡腫時作嘔，熱毒攻心，潰時作嘔，陰證，潰後作嘔，脾虛。如熱盛，痲痛，活命飲，護心散；作膿，痲痛，托裏消毒散；膿熟，脹痛，托裏散，或針以泄之。痲痛便秘者，內疎黃連湯。寒涼傷胃者，六君子湯，加乾薑、木香、木乘土位，加芍藥、柴胡、胃脘停痰，加桔梗。脾虛自病，或水侮土，加益智仁、砂仁，鬱結傷脾，加川芎、山梔、蒼朮、香附。濕氣侵胃，倍白朮；白朮生肌，斂口妙劑。又有登廁觸穢作嘔者，仍宜補胃。

脾肺俱虛，七惡也。袖中益氣湯，加薑棗，或六君子湯，加炮薑，甚則加附子，或十全大補湯，加炮薑。陽虛皆因誤服寒涼，或潰後勞役，或吐瀉之後，或誤入房夢遺，或外邪所乘，初則虛火假證，仍發熱頭疼，良久寒戰。

婦人調血開鬱爲主，值經閉及潰後月水又發，所患堅硬不破，不腫不疼者，凶。小兒主生胎毒，或有飲食積熱者，藥稍宜清涼。如素稟受體薄及稍長而久病者，仍以補托氣血脾胃爲主治之。

脈證俱熱者，未潰先內消解毒，已潰後托裏消毒。脈證俱虛者，未潰前托裏消毒，已潰後托裏補中，治其瘡而諸證自退。瘡爲本病爲標，若病急而元氣實，暫治其標，病緩而元氣虛，只治其本。心通諸竅，臟腑所包者一膜耳，若憂驚入心膜破必死，藥中常加茯神遠志爲妙。

五善動息自甯，飲食知味，一也；便利調勻，二也；膿潰腫消，水鮮不臭，三也；神彩精明，語音清明，四也；體氣和平，五也。此屬腑證，病微邪淺，若能慎節，勿藥自愈。七惡乃五臟虧損之證，外似有餘而內實不足，法當純補胃氣，多有可生，不可因其惡而遂棄不治。大抵元氣虛弱，或膿水出多，氣血虧損，或汗下失宜，榮衛消燦，或寒涼剋伐，氣血不足，或峻厲猛劑，胃氣受傷，以致真氣虛而邪氣實矣。

大渴發熱，或泄瀉淋閉者，邪火內淫一惡也。

凡瘡腫發熱，潮熱煩躁，或失血過多，或潰膿大泄，或汗多亡陽，或下多亡陰，以致陰血耗散，陽無所附，浮於肌表而非火也。若發熱不寢，虛熱也，聖愈湯兼汗不止，氣虛也，單人參湯發熱煩躁，肉暈筋惕，氣血俱虛也，八物湯大渴面赤，脈洪大而虛，陽虛發熱也，古歸芪湯微熱煩躁，面赤脈沉而微，陰盛發躁也，四君子湯加薑附。

凡渴不可專泥於火，若熾痛發熱，便利調和者，竹葉石膏湯腫痛發熱，大便祕澀者，四順清涼飲熾痛熾盛者，活命飲，膿水多者，聖愈湯胃傷內亡津液者，錢氏白朮散腎水乾涸者，八味丸有先作渴，小便頻數而後患疽者，或愈後作渴，或舌黃乾硬，小便頻數而後患疽者，尤其惡也，宜預服八味丸，補中益氣湯以滋化源，可免是患。蓋癰疽未有不因腎虛而作，切忌知母黃蘗，損陽則陰氣無由而生。

世高曰：聖京馬車者六君子湯加沙二，或托裏建中湯，托裏溫中湯，脾虛下陷者，補中益氣湯，吞二神丸，命門火衰。

多有紅絲至心生唇面口內，多有紅絲入喉者，俱難治，須急看以針挑撥其絲出血以泄其毒氣，方可保生。瘡頭黑硬如釘，四畔帶赤如火盤根，突起寸餘，隨變焦黑，未幾腫大而光轉爲濕爛，深孔透肌，如大針穿之狀，其形初起大小不一，或如水泡，如吳萸，如豆，如石榴子，其色有五，內經分應五臟，各有所屬部位。局方分別一十三種，疔外又有魚臍疔，瘡頭黑深，形如魚臍，破之黃水滲出，四畔浮漿，其毒尤甚，用絲瓜葉連鬚，葱韭葉搗爛，以酒和服，其查貼腋下，如病在左手貼左腋下，在左足貼左跨下，右手足同在中貼心臍，並用布縛住，候肉下紅絲處皆白則安。有潮熱者亦宜，却令人抱住，恐其顛倒則難治，或用蛇退燒灰雞子清調敷。又一種水疔，用黃荊葉十四片，獨頭蒜三箇，百草霜二錢，搗酒服，取汗大效。諸證惟嘔吐最危。

治分虛實，實者初服賽命丹三九，以葱酒發汗，表證多者追疔湯，或敗毒散，加蟬蛻、殭蠶、金銀花；裏證多者活命飲，五聖湯，便利滿澀者，黃連消毒散，此散初起服之內消，欲作膿者，托裏消毒散。虛者初服保生錠子以解毒，或蟾肝丸，有表邪不敢汗者，補中益氣湯，加防風白芷，裏證不敢下者，蜂蛇散，腫痛欲作膿者，托裏散，內托十宣散，不能潰者，大料參芪歸朮補之，或補中益氣湯，合生脈散以防毒陷。

豁心氣者，疔毒入心則神昏口乾，煩悶恍惚似醉，嘔吐不定，危證也。實者用萬病解毒丹，以黃連當歸煎湯化下，虛者用古芎歸湯，加茯苓、茯神、遠志、蓮肉清之。毒上攻心嘔者，護心散，有因服賽命丹吐者，亦宜此解之。恍惚亂坐臥不甯，煩渴身痛便祕者，漏蘆飲子，煩躁作渴者，竹葉黃芪湯。

外治輕者，單蟾酥爲末，以白麪和黃丹搜作丸，如麥米大，用針挑破頂頭，以一粒納入效；重者賽金丹，危篤者提釘錠子。

凡暴死者，多是疔毒，急用燈照遍身，若有小瘡，宜急灸之，并服賽命丹，亦有復醒者。如偏僻之處，藥難尋覓，唯灸有回生之功，若專疎利表散者危。

咬牙，腹痛雷鳴，泄瀉飢逆，自汗盜汗，陽虛寒氣所乘之證，入惡也。急用托裏溫中湯，後用六君子湯加附子，或加薑桂甚者，用大劑參芪歸朮，倍加薑附，以手足溫爲度。

潰後發熱惡寒，作渴怔忡，睡臥不甯，陽衰陰盛，發躁脈洪大，按之微細，或無，此陽虛極，驀然牙關緊急，腰背反張，變爲瘡癩陰病，或無汗惡寒，或有汗不惡寒，九惡也。俱宜八味丸料加參芪歸朮大劑煎服。

原稟瘦怯，或房慾竭精，或瘡出膿多，或誤汗下，以致日晡潮熱，口乾作渴，夜寐不著，瘡出紫血，四物湯、托裏益氣湯、腎氣丸主之。

便汚黑者不治，便血瘀滯者，犀角地黃湯救之。

瘡瘍時或愈後，口鼻吐衄，牙宜齟露，皆因瘡瘍出血，虛火動而錯經妄行，當求其經，審其因而治之。肝熱則血妄行，四物湯加山梔、牡丹皮、黃芩、白朮，肝虛則不能藏血，腎氣丸、心火不能生血，四物湯加炒黃連、牡丹皮、芩朮，脾虛熱不能統血，四君子湯加炒山梔、牡丹皮，脾經鬱結者，歸脾湯加五味子，脾肺氣虛者，補中益氣湯加五味子，氣血俱虛者，十全大補湯，陰火動者，腎氣丸加五味子。大凡失血過多，而見煩熱發渴等證，勿論其脈，急用單人參湯補之。經云：血生於氣，苟非甘溫參芪歸朮之類，以生心肝之血，決不能愈，發熱脈大者死。

正傳以善爲順，以惡爲逆，瘡瘍仍忌倒陷，又增爲九逆，殊爲有理。

非癰非疽，非瘡非癬，狀如惡瘡，或癢或劇，名曰無名腫毒，隨其見證，在表在裏，在經用藥外，以槐枝煎洗淨後，以赤小豆、吳萸、白膠香、黃連、黃蘗、貝母、硫黃、糯米、黃丹、輕粉爲末，麻油調搽，一切惡瘡人所不識者皆同。

○疔瘡證治

經曰：膏粱之變，足生大疔，恣食辛熱厚味，炙博腥葷，及誤食自死禽獸，蘊毒於中，而卽發者有之，或卒遇大風大霧，大暑大寒，天地暴沴之氣，襲注經絡，觸動其毒而發者，或因感死畜蛇蟲毒氣而發者，其死尤速，初發或因衣物觸

十九歲、二十六歲、四十九歲、五十六歲、五十七歲、六十二歲、八十歲、九十一歲以上八人百神在肝肺俞不宜患癰腫見血者死。

十一歲、二十三歲、二十四歲、五十八歲、九十六歲以上五人百神在脅肋不可患癰疽見血者死。
十四歲、二十九歲、三十九歲、四十六歲、五十二歲、六十歲、六十九歲、七十六歲、八十一歲、八十八歲、九十五歲以上一人百神在下部不可患瘡漏疾見血者死。下部尤忌見勞瘵人不宜下部出膿難瘥。
十一歲、十五歲、二十七歲、六十三歲、七十五歲以上五人百神在尻尾間不可患癰疽見血者死。
十三歲、二十八歲、五十二歲、七十二歲、九十三歲以上五人百神在足下不可患癰疽見血者死。
二十一歲、三十八歲、四十一歲、五十歲以上四人百神在遍身不可患瘡腫見血者不治。

○虛實寒熱宜忌

凡發背及癰疽皆在背上，不問大小，有疹無疹，或熱或不熱，或冷或不冷，但從小至大，腫起至一尺以上者，其亦腫焮熱者，即用緊急收赤腫藥圍定，不令引開，中心即用抽膿聚毒散貼之，急令散毒外透，內服排膿縮毒內托湯藥，候膿成相次破穴，看瘡大小深淺內發其膿汁，膿水大泄，急須托裏內補，雖破穴膿汁不多，再須排膿拔毒透後，慎不令再腫，須疹止腫消，患人自覺輕便，即是順疾也，最宜節慎飲食，其熱毒方盛，或發大渴，多飲冷水及冷漿之類，此是毒氣攻心，令口乾煩渴，但以心氣藥內補臟腑即止矣。

○不可患癰疽者七處

眼後虛處，頤接骨處，陰器根上毛間，胯與尻骨接處，耳門前後車骨接處，諸因小腹風水所成癰疽及頷骨下近耳後虛處，鼻骨中並能害人，但以諸法療之，或有得瘥，惟眼後虛處最險。

○疔瘡

③紅絲瘡證治

因喜怒不常，血氣逆行而生於手足間，有黃疱，其中忽紫黑色，即有一條紅絲，迢遞直上而生，若至心腹則使人昏亂不收。或有生兩三條紅絲者，急以針橫截紅絲所到之處刺之，令其出血，以膏藥貼，或嚼萍草根敷之，立愈。

④多骨疽證治

此證由瘡久潰，氣血不能榮於患處，久則腐爛，有骨脫出，宜補脾胃，壯元氣，十全大補湯，腎氣丸主之，外以附子餅灸，或葱熨法，祛散寒邪，補接榮氣，則骨自脫，瘡自斂。若腎氣虧損，其骨漸腫，荏苒歲月，潰膿出骨，亦當用葱熨法。若投以剋伐，則正氣益虛，邪氣益甚，鮮有不誤。

有上齶腫硬，年餘方潰，半載未愈，內熱體倦作渴，用補中益氣湯，腎氣丸。元氣漸復，出骨一塊，仍服前藥而愈。有足背腫落一骨者，有手背腫落一骨者。

樓英醫學綱目

①行年血忌

十歲、二十二歲、三十三歲、七十三歲，已上四人，百神在上部，不可患癰疽發背，見血者死。申子辰年血忌，餘年不妨男女同。

二十五歲、三十一歲、六十八歲、七十四歲，以上四人，百神在額，不可患瘡腫，見血者死。

十八歲、二十四歲、三十五歲、四十五歲、五十六歲、六十七歲、七十二歲、八十九歲，以上八人，百神在兩肩隅，不宜患癰疽瘡腫，見血者死。

十二歲、二十七歲、三十六歲、五十九歲、六十六歲、九十七歲，以上六人，百神在中部，不可患癰疽發背，見血者死。已

經絡之中，則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫寒氣化爲熱，熱勝則腐肉，肉腐則爲膿，膿不瀉，則爛筋，筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，不得泄瀉，血枯空虛，則筋骨肌肉不相榮，經脈敗漏，熏於五臟，臟傷故死矣。又生氣通天論云：勞汗當風，寒薄爲皴，鬱乃痲。又云：陽氣者，開闔不得，寒氣從之，乃生大僂，榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫，是亦寒邪從勞汗之隙，及陽氣開闔不得其理之隙，久客之爲癰腫也。所謂體虛外感，及身熱搏於風冷者也。治法則精要十宣散，五香湯，潔古蒼朮復煎散等發表之劑是也。內因者，陳無擇云：癰疽瘰癧，不問虛實寒熱，皆由氣鬱而成。經云：氣宿於經絡，與血俱滯而不行，壅結爲癰疽，不言熱之所作而後成癰者，此乃因喜怒憂思有所鬱而成也。治之以遠志酒，獨勝散，兼以五志相勝之理，如怒勝思之類是也。不外因者，經所謂膏粱之變，足生大疔，受如持虛。又東方之域，委鹽之地，其民食委嗜鹹，安其處，美其食，委熱中鹹勝血，故其民黑色疎理，其病爲癰疽。又有服丹石法酒而致者，亦膏粱之類是也。李東垣曰：膏粱之變，亦是滋味過度，榮氣不從，逆於肉理，榮氣者，胃氣也，飲食入胃，先輸於脾，而朝於肺，肺朝百脈，次及皮毛，先行陽道，下歸五臟六腑，而氣口成寸矣。今富貴之人，不知其節，法酒肥羊，雜以厚味，積久大過，其氣味俱厚之物，乃陽中之陽，不能走空竅而先行陽道，乃反行陰道，則濕氣大勝，子令母實，火乃大旺，濕熱既盛，必來剋腎，若不慎房事，損其真水，水乏則從濕氣之化而上行，其瘡多出背上及腦，此爲大疔之最重者。若毒氣出肺，或脾胃之部分，毒之次也，若出於他經，又其次也，濕熱之毒，所止處無不潰爛。故經言膏粱之變，足生大疔，受如持虛者，如持虛器以受物，則無不受矣。治大疔之法，必當瀉其榮氣，以標本言之，先受病爲本，非苦寒之劑爲主，爲君，不能除其苦楚疼痛也。如東垣治元好問丹溪治老婦腦疽，皆用好酒，故以三黃大黃酒製治之。又如排膿散當歸散之類是也。又有盡力房室，精虛氣積之所致者，亦屬不外因，當以補虛內托爲主，亦忌用五香之藥，耗真陰而助邪熱，治之之藥，如內固黃芪湯神效托裏散之類。經云：五臟菹熱，癰發六腑。又云：六腑不和，留結爲癰。又云：諸痛痒瘡，皆屬於心，肺乘肝則爲癰，腎移寒於肝，癰腫少氣，脾移寒於肝，癰

疔瘡皆生四肢，發黃疱，中或紫黑，必先痒後痛，先寒後熱也。

疔瘡者必發於手足之間，生黃疱，其中或紫黑色，有一條如紅線直上，倉卒之際，急宜以針於紅線所至處刺出血，然後以蟬酥乳香膏等藥，於正瘡上塗之。針時以病者知痛出血為好，否則紅線入腹攻心，必致危困矣。一法於所屬經絡各瀉之。

王肯堂證治準繩

○癰疽之源

方書敘癰疽之源有五：一天行時氣，二七情內鬱，三體虛外感，四身熱搏於風冷，五食炙博，飲法酒服丹石等熱毒，總之不出於三因也。外因者運氣癰疽有四：一火熱助心為瘡，經云少陰所至為瘡疹，又云少陰司天熱氣下臨，肺氣上從，甚則瘡瘍。又云少陰司天之政，初之氣寒，乃始陽氣鬱，炎暑將起，中外瘡瘍。又云少陽所至為瘡瘍，又云少陽司天之政，風熱參布，太陰橫流，寒乃時至，民病熱中，外發瘡瘍。初之氣候乃太溫，其病膚腠中瘡，二之氣火反鬱，其病熱鬱於上，瘡發於中，三之氣炎暑至，民病膿瘡。又云太陽司天之政，初之氣候乃大溫，肌肉瘡瘍。此皆常化病之淺也。又云少陰司天熱淫所勝，甚則瘡瘍。又云少陰司天客勝則瘡瘍。又云少陰之復，病癩疹瘡瘍癰疽瘰癧。又云火太過，曰赫燿飄驟，瘡疽血流。又云火鬱之發，民病瘡瘍癰腫，此癰疽為病之甚也。二曰寒邪傷心為瘡瘍。經云太陽司天之政，三之氣寒氣行，民病寒反熱中癰疽。注下又云太陽司天寒淫所勝，血變於中，發為癰瘍，病本於心。又云陽明司天之政，四之氣寒雨降，民病癰腫瘡瘍是也。三曰燥邪傷肝為瘡瘍。經云木不及曰委和，上商與正商同其病，支發癰腫瘡瘍，邪傷肝也。又云陽明司天燥淫所勝，民病瘡瘍瘰癧，病本於肝是也。四曰濕邪瘡瘍。經云太陰司天濕氣變物，甚則身後癰。又云太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外是也。此四條所謂天行時氣者也。素

亦痛，餘處發，猶可唯虛處及近筋骨處，若膿毒未潰，即傷爛筋骨肉，損爲疽者，屬五臟毒氣深沉，多氣伏硬堅實，而不宜緩慢，治之須內實五臟，外透皮膚，令軟勻和，即膿透，宜用內托實臟氣之藥，排膿勻氣，乃可不比癰之毒氣浮淺也。毋作一類治之。凡一切腫瘡，始覺患起高腫，五七日忽平陷者，此是內攻之候也。急以內托散及內補湯藥，補填臟腑，令實，最怕透膜，膜穿十無一生矣。婁全善云：癰之邪淺，其稽留壅遏，獨在經脈之中，而專攻於外，故初發時自表便發熱，患處便如碗如盆，高腫而痛，甚者縱欲下陷，緣正氣內固不肯受，故或便秘，或發渴，發逆以拒之，是以骨髓終不焦枯，五臟終不傷也。疽之邪深，其稽留壅遏，內連五臟而不專攻於外，故身體或無熱，患處或不腫痛，甚者聲嘶氣脫，眼黑眼小，十指腫黑，如墨多死也。治之之法，癰之初發，當以潔古法爲主，表者散之，裏者下之，火以灸之，藥以敷之，膿未成者，必消膿，已成者速潰也。疽之初發，當以鬼遺方爲主，補填臟腑，令實，勿令下陷之邪蔓延，外以火灸引邪透出，使有穴歸著而不亂，則可轉死回生，變凶爲吉。今世外科不分癰疽，一例宜熱拔毒，外以五香耗其氣，內以大黃竭其血，終不能自悟其藥之非，惜哉！集驗云：癰疽之名，雖有二十餘證，而其要有二，陰陽而已。發於陽者爲癰，爲熱爲實，發於陰者爲疽，爲冷爲虛，故陽發則皮薄色赤，腫高，多有椒眼數十而痛，陰發則皮厚色淡，腫硬狀如牛頸之皮而不痛。又有陽中之陰，似熱而非熱，雖腫而實虛，若赤而不燥，欲痛而無膿，既浮而復消，外盛而肉腐。陰中之陽，似冷而非冷，不腫而實亦微而燥，有膿而痛，外雖不盛而內實煩悶。陽中之陰，其人多肥肉緊而內虛。陰中之陽，其人多瘦肉緩而內實。而又有陽變而爲陰者，草醫涼劑之過也。陰變而爲陽者，大方熱藥之驟也。然陽變陰者，其證多猶可返於陽，故多生，陰變爲陽者，其證少，不能復爲陰矣，故多死。然間有生者，此醫偶合於法，百中得一耳。觀此則癰疽但有陰陽深淺，內外虛實之分，而無大小之別，精要乃謂二寸至五寸爲癰，五寸至一尺爲疽者，謬也！

③脈法

腫筋，此皆臟腑之變亦屬內因者也。東垣曰：生氣通天論云：榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。又云：膏粱之變，足生大疔，受如持虛。陰陽應象論云：地之濕氣，感則害人，皮肉筋脈是言濕氣外傷，則榮氣不行，營衛者，皆營氣之所經營也。營氣者，胃氣也，運氣也，榮氣爲本，本逆不行，爲濕氣所壞，而爲瘡瘍也。膏粱之變，亦是言厚滋味過度，而使榮氣逆行，凝於經絡，爲瘡瘍也。此邪不在表，亦不在裏，唯在其經中道病也。已上內經所說，俱言因營氣逆而作也。偏看諸瘡瘍論中，多言二熱相搏，熱化爲膿者，有只言熱化爲膿者，有言濕氣生瘡，寒化爲熱而爲膿者，此皆瘡疽之源也。宜於所見部分，用引經藥，并兼見證，中分陰證陽證，先瀉營氣是其本，本逆助火濕熱相合，敗壞肌肉而爲膿血者，此治次也。宜遠取諸物，以比之一歲之中，大熱無過夏，當是時諸物皆不壞爛，壞爛者，交秋濕令大行之際也。近取諸身，熱病在身，止顯熱而不敗壞肌肉，此理明矣。標本不得，邪氣不服，言一而知百者，可以爲上工矣。

○癰疽之別

靈樞經云：榮衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行，則衛氣從之而不通，壅遏而不得行，故熱。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿，然不能陷骨髓，不爲焦枯，五臟不爲傷，故命曰癰。熱氣滄盛，下陷肌肉，筋髓枯，內連五臟，血氣竭，當其癰下筋骨，良肉皆無餘，故命曰疽。疽者，上之皮天以堅，上如牛領之皮，癰者，其皮上薄，以澤，此其候也。鬼遺方云：癰之痛只在皮膚之上，其發如火焚茅，初如黍米大，三兩日如掌面大，五七日如碗面大，卽易治。如腫冷發渴發逆，治之難愈。疽發或如小瘡，觸則徹心痛，四邊微起，如橘皮，其色紅赤，不全變膿水不甚出，至七八日疼悶喘急不止，若始發腫，高五七日，忽平陷者，此內攻之候也。又云：癰疽有三等，毒氣浮淺屬腑，毒氣沉深屬臟，毒氣猛烈而行經絡，或淺或深，而定五臟六腑皆受其毒，難爲調理，唯宜急切於癰發諸處，不問虛實，高腫起盛，光澤疼痛，只在皮膚之上，熱極脹滿，或有癢疹，別無惡候，初用溫藥平氣，次用排膿發穴。

治癰所謂平氣者，乃犀角飲之類，其方用犀角、連翹、漏蘆、甘草、當歸、肉桂，皆發表之藥也。所謂發穴者，乃棘針之

緩 腫瘍爲可治，大而緩爲虛潰瘍，緩而澀者愈，以其病脈相應及胃氣充也。

沉 腫瘍爲邪氣深，潰瘍爲遺毒在內，寸沉爲胃有痰。

伏 腫瘍爲陰中伏陽邪，潰瘍爲陽伏陰中，爲內蝕爲流注，浸淫難治。

虛 腫瘍便宜補而內托，潰瘍膿既泄，宜大補氣血。

弱 腫瘍爲元氣不足，宜內補托裏，潰瘍爲病脈相應，宜補。

結 腫瘍爲邪氣結，潰瘍漸勻則愈，不調則危。

促 腫瘍爲熱爲病進，潰瘍爲熱不減，漸進則死，漸退卽生。

代 腫瘍爲氣血敗壞，元氣損傷，潰瘍爲元氣竭絕。

④分經絡

人身之有經絡，猶地理之有界分，治病不知經絡，猶捕賊不知界分，其能無誅伐無過之咎乎？况手足十二經絡，有血氣多少之分，如手少陽三焦，少陰腎，太陰脾，多氣少血，手厥陰心包絡，太陽小腸，足太陽膀胱，多血少氣，手陽明大腸，足陽明胃，多氣多血，此其大較也。多血少氣者易愈，多氣少血者難療，氣多之經，可行其氣，血多之經，可破其血，不可執一也。

頭部： 巔頂足太陽，厥陰督脈； 頭角直耳上中是少陽； 中行前直鼻上巔，後直鬚中上巔督脈； 第二行足太陽，一寸五分，各開兩旁爲頭第三行，第三行足少陽。

面部： 額足少陽陽明，鼻手陽明太陽，足陽明督脈，人中督脈，手足陽明，脣足陽明，脣內足厥陰； 承漿

足陽明任脈，上齒足陽明，下齒手陽明，舌足太陰少陰，目內眦手足陽明，手足太陽，目銳眦手太陽，手

足少陽，眉至額直鼻而上督脈，直目內眦而上足太陽，直目瞳子而上足少陽，直銳眦而上手足少陽，頰直目

沉實發熱煩躁，外無焮赤痛，其邪深在裏，宜先疎通以絕其源。

浮大數焮腫在外，當先托裏，恐邪入內。

脈不沉不浮，內外證無知其在經，當和榮衛。

脈數身無熱，內有癰膿。

脈數，應當發熱而反惡寒，若有痛處，當發癰。若數脈不時見，當生惡瘡。

浮 腫瘍爲虛爲風，潰瘍爲虛，宜補。

洪 腫瘍爲虛爲熱，盛宜宣熱拔毒，年壯形實宜下；潰瘍爲邪氣盛，服藥久不退者，難治。

滑 腫瘍爲熱，潰瘍爲熱爲虛爲邪氣未退。

數 腫瘍爲病進爲熱，數而洪者欲膿；潰瘍爲難愈，數甚者難治。

散 腫瘍爲氣不收斂，潰瘍爲痛未退，洪滑大散難治。

芤 腫瘍爲血虛，潰瘍爲虛，爲脈病相應。

長 腫瘍宜消退之法，潰瘍爲易愈，謂長則氣治也。

牢 腫瘍爲邪盛爲欲膿；潰瘍爲邪氣不退。

實 腫瘍爲邪氣太盛，潰瘍爲邪不退，爲實緩豁大者爲虛。

弦 腫瘍爲痛，爲欲膿，弦洪相搏，外緊內熱，爲疽發也；潰瘍爲血虛爲痛，

緊 腫瘍浮而緊，發熱惡寒，或有痛處，是爲癰疽；潰瘍主氣血沉澹爲痛，爲有外寒。

澹 腫瘍爲氣實，爲氣滯，潰瘍爲血虛，爲病脈相應。

短 腫瘍爲元氣不足，潰瘍爲大虛宜補。

手太陰肺南星、款冬花、升麻、桔梗、山藥、檀香、五味子、糴米、阿膠、葱白、麥門冬、杏仁、白芍、芍藥、黃芩、白朮、天門冬、梔子、黃芩、石膏、白豆蔻、砂仁。檀香、豆蔻爲使。

足太陰脾、萊菔、草豆蔻、砂仁。人參、益智爲使。防風、代赭石、益智、甘草、半夏、赤茯苓、當歸、蒼朮、白朮、麻子仁、黃芪、膠飴。

通入手足太陰肺脾、白芍、藥酒、浸升麻、芍藥、木瓜、延胡索、藿香、砂仁。

手陽明大腸、升麻、麻子仁、秦芫、薤白、石膏、白芷、肉豆蔻、白石脂、砂仁。白石脂爲使。

足陽明胃、丁香、草豆蔻、砂仁、防風、石膏、知母、白朮、神麴、葛根、烏藥、半夏、升麻、葱白、蒼朮、白芷。

通入手足陽明、酒麻黃、連翹、升麻、白朮、酒大黃、葛根、石膏、白芷、檀香。佐以他藥。

手少陽三焦、川芎、酒大黃、柴胡、青皮、白朮、黃芪、熟地黃、石膏、細辛、附子、地骨皮。

足少陽膽、半夏、草龍膽、柴胡。

通入手足少陽、青皮、柴胡、川芎、連翹。

手厥陰心、包絡、牡丹皮、白朮、沙參、柴胡、熟地、敗醬。

足厥陰肝、草龍膽、山茱萸、阿膠、瞿麥、桃仁、蔓荊子、代赭石、當歸、甘草、青皮、羌活、吳茱萸、白朮、紫石英。

通入手足厥陰、青皮、熟地、柴胡、川芎、皂角、苦茶、桃仁。

手太陽小腸、白朮、生地黃、赤石脂、羌活、赤茯苓、砂仁。赤石脂爲使。

足太陽膀胱、滑石、蔓荊子、猪苓、澤瀉、桂枝、茵陳、白茯苓、黃蘗、羌活、麻黃。

通入手足太陽、蔓荊子、防風、羌活、藁本、酒大黃、黃蘗、白朮、澤瀉、防己、茴香。

手少陰心、麻黃、代赭石、桂心、當歸、生地、黃連、紫石英、梔子、獨活、赤茯苓。

足少陰腎、知母、地骨皮、黃蘗、阿膠、猪膚、元參、牡丹皮、敗醬、牡蠣、烏藥、山茱萸、猪苓、白茯苓、檀香、甘草、益智、天門冬、澤

內眥而下足陽明，直目瞳子而下足陽明，頰車足少陽陽明，耳手足少陽手太陽，目系手少陰足太陽，
頸項部：項中間督脈，拔項大筋中足太陽，當完骨下手少陽，項大筋之前耳之後也，當耳下足少陽，當
曲頰下手太陽，曲頰前一寸手陽明，挾喉兩旁動脈足太陽陽明，缺盆中任脈，咽手太陰少陰足太陽，當

喉嚨足少陰陽明，喉嚨後足厥陰。

肩部：前廉手陽明，後廉手太陽，上廉手足少陽。

背部：中行督脈，第二行足太陽，第三行足太陽。

膺臂部：中行任脈，第二行足少陰，第三行足陽明，第四行足太陰。

腹部：中行任脈，第二行足少陰，第三行足陽明，第四行足太陰。

腋下：中間手厥陰，前手太陽，後手太陰。

脇部：腋直下脾樞足少陽。

臑部：前廉手陽明，後廉手太陽，外廉手太陽，內廉手少陰，內前廉手太陰，內後廉手少陰。

臂部：上廉手陽明，下廉手太陰，外廉手少陽，內廉手厥陰，內上廉手太陰，內下廉手少陰。

股脛部：前廉足陽明，後廉足太陽，外廉足少陽，內廉足厥陰，內前廉足太陰。

諸經向導藥

太陽經，上羌活，下黃蘗。

陽明經，上白芷升麻，下石膏。

少陽經，上柴胡，下青皮。

太陰經，上桔梗，下白芍藥。

寒盛熱之氣若人飲食少思精神衰夢榮德氣滯寒掉而氣難才當存之以和居性之氣此治風實之方治
瘡疽痛息自甯飲食知味脈證俱緩緩則治本故可以王道平和之藥徐而治之亦無不愈若脈實焮腫煩躁寒熱
脈證俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰或膿水清稀或泄利腸鳴飲食不入
嘔吐無時或手足逆冷此脈證俱虛非大補不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證者當辨表裏虛實隨宜
治之庶得萬全。

㊟內消

癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺深大小經絡處所
形脈虛實如發於腦背腰項臀膻者皆太陽經也宜黃連羌活背連脅處爲近少陽宜柴胡並宜敗毒散仙方活命
飲形實脈實者宜漏蘆湯內疎黃連湯追毒丸等疎利之氣虛者參芪爲主血虛者芎歸爲主佐以消毒之藥隨分
野以引經藥行至病所六經分野上有癰疽其五經各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉惟少陽一經雖曰氣
多血少而氣血皆不足也治與氣虛血虛同法凡苦蕒射干穿山甲金銀花夏枯草蟾酥連翹地丁黍粘子木鼈子
之類爲內消之藥仙方活命飲內消丸柞木飲子牛膠飲子車螯散返魂丹消毒飲爲內消之方衆皆知之殊不知
補瀉虛實平治寒溫使氣血各得其常則可內消也其外用紫葛湯淋洗及用散塗膏貼者亦使氣血和平而腫熱
消退也。

㊟內托

癰疽已成血氣虛者邪氣深者邪氣散漫者不能突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或雖得膿而
根脚紅腫開大或毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結核無膿者皆氣血虛氣血既虛兼以六淫之邪而變生諸證必
用內托令其毒熱出於肌表則可愈也凡內托之藥以補藥爲主活血祛邪之藥佐之或以芳香之藥行其鬱滯或

瀉、五味子、丁香、獨活、或用梢。吳茱萸、砂仁、黃蘗、茯苓為使。桔梗、或用梢。

通入手足少陰、五味子、細辛、熟地、澤瀉、地榆、附子、知母、白朮。

命門、附子、沉香、益智、黃芪。

⑥善惡

瘡瘍，舊分五善七惡。動息自甯，飲食知味，一善也；便利調勻，二善也；膿清腫消不臭，三善也；神采精明，語聲清爽，四善也；體氣和平，五善也。煩躁時嗽，腹痛渴甚，或泄利無度，小便如淋，一惡也；膿血大泄，腫焮尤甚，膿色臭敗，痛不可近，二惡也；喘粗短氣，恍惚嗜臥，三惡也；目視不正，黑睛緊小，白睛青赤，瞳子上看，四惡也；肩背不便，四肢沉重，五惡也；飲食不下，服藥而嘔，食不知味，六惡也；聲嘶色敗，鼻青赤面，目四肢浮腫，七惡也。五善見三則瘥，七惡見四則危。

⑦虛實

夫瘡疽膿潰腫毒浸淫，證候危惡者，須辯虛實。况夫虛者難補，實者易瀉，補瀉之法，不可輕用；若或少差，利害甚大。然而虛實多端，有瘡之虛實，有臟腑虛實，有血氣虛實，又有上實下虛，真虛邪實者，不可不辯也。

夫腫起堅硬膿稠者，瘡疽之實也；腫下軟慢膿稀者，瘡疽之虛也。瀉利腸鳴，飲食不入，嘔吐無時，手足並冷，脈弱皮寒，小便自利，或小便時難，大便滑利，聲音不出，精神不爽者，悉臟腑之虛也。大便硬，小便澀，飲食如故，腸滿膨脹，胃膈痞悶，肢節疼痛，口苦咽乾，煩躁多渴，身熱脈大，精神昏塞者，悉臟腑之實也。如膿水清稀，瘡口不合，聚腫不赤，肌寒肉冷，自汗色脫者，氣血之虛也；腫起色赤，寒熱疼痛，皮膚壯熱，膿水稠粘，頭目昏重者，氣血之實也。頭疼鼻塞，目赤心驚，咽喉不利，口舌生瘡，煩渴飲冷，睡語咬牙者，上實也；精滑不斂，大便自利，腰脚沉重，睡臥而不甯者，下虛也。肩項不便，四肢沉重，目視不正，睛不了了，食不知味，音嘶色敗，四肢浮腫者，真氣之虛也；腫焮尤甚，痛不可近，積日

紫黑色外月宜... 靛子去其歹肉稍淨却用緩慢碧玉錠子生肌總名青金錠子不拘日數直待歹肉去淨單用膏藥貼之候膿水盡肌肉平方許貼生肌斂口之藥若依此法免教人受刀剪針烙之苦如是無頭癰腫待膿成用針刺破方依法收功也。

○淋洗

古人論瘡腫初生經一二日不退即須用湯水淋射之其在四肢者濡漬之其在腰腹及背者淋射之其在下部委曲者淹漬之無非疎導腠理通調血脈使無凝滯也集驗云淋洗之法每用藥二兩水三升煎取一升半去查以淨帛或新綿蘸之乘熱濕其患處漸覺喜濕仍淋浴之稍冷則急令再換慎勿冷用腫瘍宜紫葛湯一日五七次洗之每洗後拭乾視瘡頂上有白粒如米大者以五灰膏點破之瘡眼傅老皮散次用水調大鐵箍散圍貼四邊紅腫處用正鐵箍散水調貼瘡口再洗則先去舊藥每一次洗換新藥如前潰瘍用豬鬃湯一日一二次洗之仍用大鐵箍散如前圍貼瘡口上用追毒拔毒等藥貼之敗肉去後間二三日一換之可換長肉膏貼之淋洗之功癰疽初發則宜拔邪氣可使消退已成洗之則疎導腠理調和血脈探引熱毒從內達外易深為淺縮大為小紅腫延蔓洗之則收股紫黯黑洗之紅活逐惡氣祛風邪除舊生新如瘡口冷滯不收者濃煎北艾湯洗燒松香兔毛熏之淋洗之藥可與鐵箍散並行。

大抵灸烙濕漬各有所宜凡疽則宜灸不宜烙癰則宜烙不宜灸丹瘤腫毒宜濕漬之腫皮光軟則宜針開之以洩其毒認是疽瘡速以艾炷如菉豆許大灸二百壯灸後覺似熾痛乃火氣下徹毒氣隨火而出若其瘡痒宜淡豆豉以椒薑鹽葱和搗捻作餅子如三錢厚安瘡頭上灸之覺太熱即取起又安其上餅乾再易新者若其瘡痛即須更灸壯數以多為妙已成膿者不可灸當針開之初覺背上有瘡疼痒略異認是發背即取淨土水和捻作餅子徑一

加溫熱之藥禦其風寒，大抵托裏消毒散，托裏散，小托裏散，十宣散皆爲要藥，但用隨時加減耳。如冬月并氣滯之人，五香連翹湯，虛弱人去大黃，素不宜寒藥者，小五香湯，形脈實，膿色稠不可用補藥者，忍冬丸之類，大膿出，敗肉去，紅腫消，當用黃芪人參當歸白朮大劑補之，令氣血滋茂，新肉易長也。

③敷貼

瘡腫初生，似有頭而未起，卽當貼溫熱藥，引出其熱毒，火就燥之義也。若瘡腫初生卽高起，四畔焮赤，宜搗生寒藥貼，折伏其熱勢，去逐其邪惡，撲火之義也。大抵敷貼之法，欲消息腫毒，疏通血脈，寒熱錯綜，皆期於不成膿也。凡腫皮厚者，以軟帛或綿紙塗藥貼之，待其藥乾方換，腫皮薄者，用疎紗或薄紙塗藥貼之，其藥未乾，卽當換之。至膿潰之後，卽貼溫肌生肉膏藥，要在逐臭腐，排惡汁，取死肌，生良肉，全藉溫熱膏劑之力也。切勿用寒涼藥水調貼，令血滯而難瘥，蓋血脈喜溫而惡寒故也。

集驗云：癰疽無頭起者，用神疔膏、靈龜膏、拔毒膏、正鐵箍散貼，卽令消退；膿潰者，用靈龜膏貼之，或用追毒膏去膿，或用筒子收膿。有頭疽瘡，每於洗後視赤暈闊狹，用涼水調大鐵箍散成膏，隆冬用溫水調，如人肉溫，貼之，腫亦盛，用生地黃自然汁調貼，圍貼之法，從四畔紅暈處圍貼，用皮紙掩上。瘡有旋生白粒散漫如米如豆者，用銀篦尾撥去瘡眼，用老皮散傳之，再換新藥傳上。凡熱多則赤，焮腫散熱甚則紫黑，外寒鬱之亦紫，血虛兼寒則青白。大鐵箍散，正鐵箍散，乃常用之藥。或因風寒熱及穢氣厭觸等證，四時寒熱不同，又宜從權設法。熱者宜三黃散，熱甚宜三消散，風者加羌活防風，若氣滯者加木香，寒鬱加桂枝穢氣觸者宜加香藥熏之，腫處脆嫩者去白芨。去貼藥時看毛下竅中，當有汗珠，此則血脈疎通，熱毒消散，赤暈漸縮，膿潰痛止，變逆爲順，皮毛潤活，要作良肉，但疽頂有些少腐，不用刀剪，如藥下不生汗珠，腐敗必闊，必多也。膿後圍貼，則收散漫遺毒，盡隨膿出，瘡口貼拔毒膏藥，如膿出不

醫部彙考三百六十三

外科癰疽疔毒門五

明王肯堂證治準繩

○腫瘍

集驗論瘡瘍之法，其名有三：曰癰、曰癰、曰疽。癰者初生突起，浮赤而無根脚，腫見於皮膚間，止闊一二寸，有少疼痛。數日後則微軟，薄皮剝起，始出清水，後自破膿出，如不破，用替鍼丸拔毒膏貼之，膿出即愈。癰者初生紅腫，突起無頭，使用火鍼鍼之，即散，不散，鍼侵根脚，闊三四寸，發熱惡寒，煩渴，或不發熱，抽掣疼痛，四五日後按之微軟。此證毒氣浮淺，春夏宜用防風敗毒散，加葱頭薑棗煎服，秋冬去薑棗葱頭，加木香，身半已上，加苦蕒，身半已下，宜加射干。治早者即散，或用追毒丸，返魂丹，復元通氣散，微利之，膿成用鉞針破開，或用替針丸咬開。又一等皮色不變，但略微腫，肌肉內痛，夜間痛甚，發熱惡寒，煩渴，此熱毒深，亦名爲疽，謂其能傷筋脈骨髓也。日久按之，心中微輓，膿成後，用火烙烙開，以決大膿，外用拔毒乳香膏貼之，宜服內托之藥。初發急用大針於腫硬處針之，則散。疽者初生白粒，如粟米大，便覺癢痛，觸著其痛應心，此疽始發之兆也，急用火針於白粒上針開，或誤觸破，或入湯便覺微赤腫痛。三四日後不散，根脚赤暈展開，須詳看之，方見其暈闊狹，如闊四五寸左右，渾身發壯熱微渴，瘡上亦熱，此疽也。用

寸，厚二分，貼瘡上，作艾炷灸之，一炷一易，其瘡粟米大時，可灸七七壯，如錢大者，日夜不住灸，以瘥爲度。其疔癭惡瘡，諸法不驗者，取蟻螬剪去兩頭，安瘡口上，以艾灸之，七壯一易，不過七枚，無不效者。又法以乞火婆蟲同前灸之，累試累效，人皆祕之，往往父子不傳。

腫硬痛深脈沉者邪在內也宜下之如黃連內疎湯仙方活命散苦參大夕無折腫尸貝仁不語才牙不語

宜調和榮衛如托裏榮衛湯白芷升麻輩。

痲痛躁煩或咽乾作渴者宜降火如黃連解毒湯。

痲痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之如荆防敗毒散人參敗毒散輩。

大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒如仙方活命散。

煩躁飲冷痲痛脈數者邪在上也宜清之如清涼飲或金銀花散。

惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之如十宣散。

痲痛發熱汗多大渴便秘識語者結陽證也宜下之如黃連內疎湯破棺丹輩。

不作膿或熟而不潰者虛也宜補之如補中益氣湯八物湯十全大補湯輩。

痲痛或不痛及痲木者邪氣盛也隔蒜灸之。

腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之如仙方活命飲。

腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之如清心湯或防風通聖散加黃連。

○潰瘍

集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣漸退氣血亦虛脈之洪數漸宜減退當內補托裏必使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯中用桂是也氣滯加香附如毒勢大退氣血未復多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿根脚赤暈反展開闊或不痛或大痛此毒氣不退金銀白芷散十宣散去厚朴倍人參川歸黃芪加忍冬藤連翹犀角苦蕒根消毒之藥春未夏間及

火針於初起白粒上刺入一寸餘，徑寸之間，四邊刺四處，使用四味紫葛湯淋洗，一日夜共五六次洗之，洗了以輭帛拭乾，看疽上或有漸生白粒如黍米，或多或少，可用銀篦兒挑去，勿令見血，或有少血亦不妨，不見血尤妙。却用老皮散傅之，用涼水調大鐵箍散圍貼，却留瘡口，瘡口處用水調正鐵箍散貼之，未可用膏藥。如再要洗，須先去圍藥令淨，然後洗之。一次洗，一次檢點疽上漸生白粒，有則如前挑之。六七日瘡頭無數如蜂房，膿不肯出，仍淋洗圍貼，冬月用五香連翹湯，大黃一味隨虛實加減，夏秋用黃連羌活散，春末夏初用防風敗毒散，加葱白棗煎服，秋去之，加木香。若形氣實脈洪滑有力，痛腫焮開，壯熱便閉，於五利大黃湯，漏蘆湯，返魂丹，追毒丸，復元通氣散藥一方，以通利之，若大便潤便止藥。四十歲已前可用之，虛弱年老之人，雖有便閉之證，須慎之勿令過也。瘡熱暈赤焮開圍貼，如赤暈收斂，却再換鐵箍散，不及用火針，證七八日後，中間初起白粒處，此竅已潰通內大膿，可用皮紙捻小紙紐，捻八竅中令透，漸漸流出，可不用針砭。如要膿透，必以大針刺開，或周圍四五處，其竅四邊如蜂房處，膿不肯出，用正鐵箍散香油調貼。一證初生白粒，誤觸後便覺情懷不舒暢，背上沉重，如負五七升米樣，身體煩疼，胃膈痞悶而躁，飲食無味，怕聞食氣，所謂外如麻裏如瓜者，疽毒深惡，內連腑臟也。三五日內皆可用烙於中間左右上下，令毒氣通暢後，膿從諸竅而出，五六日不散，疽頂生白粒如椒者，數日後漸生多，間有大如蜂房蓮子者，指捺有膿血而不流，時有清水流出，微腫不突，根脚紅暈，漸漸展開，或癢痛，或不痛，或根脚暈紫赤，焮開至七八寸，疽不甚熱。此證甚重，用紫葛湯加米酢一盞淋洗，可使紅活，如法去白粒，傅老皮散，圍大鐵箍散，瘡口塗正鐵箍散，每用前法，如得根脚紅暈收，疽突，此藥力到，變重爲輕。如起第一顆，頂上白粒雖有膿，而紐引不透，接之猶硬，或漸不疼，便宜用火烙開透，若根脚仍舊紫黑，瘡反陷下，如牛領之皮，漸變黑色，肌骨腐潰，恍惚沉重，用拔毒乳香膏貼四邊，仍用大鐵箍散圍脚，用豬蹄湯洗。此數項變證必多，又宜隨證調理，脈若虛弱，便用大料人參當歸濃湯調解毒行經之藥。凡癰疽必服萬全散，夏月用桃紅散，服以護心，若見膿之後，當以潰瘍法調理。

膿也。小按便痛薄皮剝起者膿淺也。按之四痛皮色不變不高阜者膿深也。淺者宜藥點初高尖者宜釵金針烙。更詳虛實何如。腫處軟而不痛者血瘤也。發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣瘤也。虛腫而黃者水也。氣結微腫久而不消，後亦成膿。此是寒熱所爲也。留積經久積陰生陽寒化爲熱，以此潰必成癰。宜早服內寒藥以排之。諸癰瘤疔贅等，至年衰皆自內潰，不一於補養而妄行攻蝕，必有性命之憂。至於癰癰結核寒熱發渴，經久不消，其人面色痿黃，被熱上蒸，已成膿也。治見本條。手足指稍及乳上宜膿熟大潰，方可開之。麻豆大肢節上癰，稍覺有膿，便須決破，遲則成攣曲之疾。

取膿：凡瘡腫以手指從瘡旁按至四畔上赤黑者，按之色不變，膿已結成；又按之隨手赤色，此亦有膿；按之白，良久方赤，遊毒已息，可就赤白色盡處灸斷，瘡肉平實，久而方消。

夫癰則皮薄腫高，疽則皮厚腫堅，初發並宜灼艾，惟癰膿成則宜針，疽膿成則宜烙。

切宜熟視詳審，候其潰熱膿透於外，其勢盈盈欲出，只用替針丸自瘡頭咬開，不半日許，其膿自出，切不可用針刀也。

鬼遺云：凡癰覺在虛處及眼不見處，皆是惡證。如發高腫紫赤，皮薄光澤，覺裏有膿毒，諸藥貼熨不破者，用熟銅針於油火上燎透，先用黑筆點定，却當頭以針淺刺入，隨針出膿者順也。有不隨針出膿，當用白紙作紐，紐入針孔引出膿毒，當時腫退可及三分，如腫不退，是一逆也。腫不退，疹不除，但膿出，二逆也。膿疹不退，患人不覺瘡輕，三逆也。雖用針破出膿，亦無所濟，須急用引膿托裏湯藥，以助其勢力可也。更有癰生實處，不問淺深，如有膿，即用針烙，無害，稍緩即恐傷筋骨內疼。凡近筋脈骨節處，不得亂行針烙，反致他病也。

患疽初生赤硬，或在虛處，毒氣淺，或在實處，毒氣深，切須仔細辨認，仍問患人疼痛覺深覺淺。其患處瘡頭不拘多少，其間須有一箇最大者，即是大膿竅，當用熟鐵大針頭如釵脚者，於麻油燈上燒令熱透，以大頭處按定插入一

秋初，宜加酒芩、黃連、黃蘗、羌活，腰已下可去桔梗，見膿後須以補氣血藥爲主，解毒藥助之，或不宜於補藥者，宜忍冬丸、四圍腫焮處，用毫針燒赤刺之，約一米深，紅腫則縮，服藥脈得和緩爲佳。或破後不潰，瘡口堅硬者，風也用蜈蠍散傅之；或蠱肉不腐，用雄黃輕粉敷之。大忌紅腫不退，或飲食進少，從權且調理脾胃，或兼他證，又另議藥治。腐肉不知痛癢，正黑者可去之，但不可傷四畔，及裏面之良肉，當去外之黑腐者，下皆去黃白如絮之狀。膿內有紅血絲絡，又不可動，此中大膿，次日必自脫落，庶免傷其良肉，若怕刀砭，三四日必自脫落，但用刀去者，新肉易長，毒氣漸消。凡腐肉亦有長肉膏貼，間日用豬蹄湯洗，新肉長如梅李，如石榴子，紅活可愛，日見堆阜，或上有白膜，皆是吉兆。若腐敗去後，下面良肉色白而平，略無紋理，亦不如粟，不見漸生之意，或膿水清淡，或臭，此積毒內連五臟，血氣枯竭，乃是危證。肉不能長，氣血不榮，衛氣不護，瘡則風寒著之，用北艾、黃芪湯熏洗，長肌肉藥傅之，用乳香膏長肉等膏貼之。或肉雖長起色紫者，遺毒也，用地榆湯活血散敷，追毒膏貼之，卽自紅活。瘡口漸收，仍用長肉膏貼，或瘡口癢，用細茶葱鹽煎湯熱洗，或瘡口易收，乃氣血中熱毒，故不分消，卽使長肉，必防流注之患，或更迷塞瘡口，如錢大時，恐轉他證危殆。凡癰疽瘡口已收，但皮嫩未可便去膏藥。鬼遺方云：凡發背及癰疽，皆在背上，不問大小，有疼無疼，或熱或不熱，或冷或不冷，但從小至大，腫起至一尺已上者，其赤腫焮熱者，卽用緊急收赤腫藥圍定，不令引開中心，卽用抽膿聚毒散貼之，急令散毒外透，內服排膿縮毒內托湯藥，候膿成相次破穴，看瘡大小深淺，內發其膿汁，膿水大泄，急須托裏內補，雖破穴膿汁不多，再須排膿拔毒，透後慎不令再腫，須疼止腫消，患人自覺輕便，卽是順疾也，最宜節慎飲食，其熱毒方盛，或發大渴，多飲冷水及冷漿之類，此是毒氣攻心，令口乾煩渴，但以心氣藥內補臟腑卽止矣。

內補謂參芪之屬，排膿謂皂角刺之屬。

若嘔逆直視，讖語如醉者，不可治矣。又有內疔一證，與外疔之證大同，但瘡形不現，過數日間有一處腫起者，即是內疔所發之處，但腹痛甚者，便須作內疔治之，不可緩也。緩則殺人。

華元化云：疔有五色，屬五臟。紅屬心，發於舌根；青屬肝，發於目下；黃屬脾，發於口脣；白屬肺，發於右鼻；黑屬腎，發於耳前。以種類言之，千金方外臺秘要神巧萬全方皆稱一十三種，殆不止也。

麻子疔狀如麻子，稍黑四邊微赤，多癢少痛，忌食麻子油、亚麻衣，并入麻田中行，見穿麻布人。火疔發於頂門，或發於面，身熱如火，狀如湯火燒灼，瘡頭有黑鬚，四邊烟焰，又如赤粟米，忌火灸燒針烙。脾疔生於脣四白，眉疔生於眉，髭疔生於髭中。龍泉疔生於脣上。虎鬚疔生於脣下。魚尾疔生於眼角外。顴骨疔生於顴骨上，

亦名赤面疔，其狀色白頂陷如錢孔，鼻有紫色者大凶。耳疔生於耳中，亦名黑疔，連腮赤腫。鼻疔生於鼻內，痛引腦門，不能運氣，鼻如大瓶黑色者不治。頰疔生於面頰骨尖高處。氣疔形如氣泡，感怒而生。腐疔色白有

胞，三日內頂陷，狀如初灸瘡，因夏月造豆腐時人汗滴於內食之而生，忌食豆腐。鬼疔因中陰邪之毒而生。瓜藤疔延蔓無數，忌瓜田中行。石疔皮肉相連，堅韌如石，刺之不入，肉微痛，忌砂礫。鹽膚疔大如匙面，四邊皆赤，有黑點如粟粒起，忌食鹹物。水洗疔狀如錢形，或如錢孔，瘡頭白裏黑，鬚汁出而中韌，極癢透骨，搔則快然，忌水

洗渡河及飲漿水。浮瀉疔其狀圓曲少許不合，長而狹如薤葉，大內黃外黑，黑處刺不痛，黃處刺則痛。三十六疔，其狀頭黑浮起，形如黑豆，四畔起大赤色，今日生一，明日二，後日三，乃至十，若滿三十六，藥所不能治，未滿者可治，俗名黑胞，忌噴怒畜積愁恨。猪疔形圓而小，瘡口內有油。羊疔形長而白色。牛疔形圓而小，瘡內無油，胞起掐不破，有寒熱。狗疔色赤而長，或帶尖，與牛疔同，無忌不殺人。驢馬疔其狀三角，頂上有黑點，根脚有赤色，或突起。水疔狀如泡，因飲隔宿水而生，忌飲水。臍疔生於臍。脅疔生於脅。刀鏹疔狀如薤葉，長寸許，肉黑如燒烙，忌刀針。暗疔生兩腋下而無頭，但腋下堅韌，四肢拘急，寒熱大作，陰囊腫痛，罌丸附生，突兀如疔，寒熱併

寸或至二寸，膿當下；恐未有膿毒出，却用白紙作緝子，緝入候次日取出，其膿即隨緝下矣。膿色黃白，即好；若赤黑色，防後有鮮血出，即患人寒戰不禁。其有虛處，不得妄行針烙。

④多骨疽

或問足脛生疽，既潰甚久而不愈，腐爛出骨者，何如？曰：此名多骨疽，亦名剩骨，又名朽骨。蓋因毒氣壅盛結成此骨，非正骨也。宜服勝金丹，十全大補湯加牛膝，防己、紫金丹、烏金散，人參養榮湯加木瓜、牛膝，防己相間服。此疽因未潰之前，補劑太過，故結毒而不散耳，宜授仙紙黃龍膏貼之。

⑤惡瘡

諸痛癢瘡皆屬於心，諸濕腫滿皆屬於脾，心主血，脾主肉，血熱而肉濕，濕熱相合，潰敗肌膚，浸淫不休，不可以定名命之，故謂之惡瘡也。然有辨焉：如疥癬癰疹之屬，怫鬱氣血在皮膚腠理間者，可以表而散內，經有謂汗之則瘡已者是已。若鬱氣血在肌肉之分，外連皮膚，作寒熱而生膿者，或七情所招，或膏粱之變，皆宜解內熱，不宜汗也。張仲景所謂瘡家不可發汗，汗之則瘡者是已。一瘡而有宜汗不宜汗之別，熱有淺深表裏故也。故瘡在皮膚，則當因其輕而揚之，汗之，浴之外，以殺蟲潤燥和解凝結涎沫之藥，傅之瘡在肌肉，則當因其重而減之，瀉經絡之熱，清涼氣血，外以化膿生肌膏，傅之，瘡在頭顛，則當射而取之，用酒製寒涼劑，更以風藥升而上之，外以殺蟲解熱藥，傅之。能明此三者，其於治瘡思過半矣。

⑥疔瘡

疔瘡者，以其瘡形如丁蓋之狀而得名，皆生頭面四肢，發黃疱，中或紫黑，必先癢後痛，先寒後熱。凡人一二日間，惡寒發熱，四肢沉重，心悸眼花，頭疼體痛，稍異如常之證，須宜徧身尋認，如有小瘡，與常患之瘡稍異，即是疔也。大抵起紫疱者多，起堆核者少，發於手上者多，發於別處者少，生兩足者多有紅絲至臍，生兩手者多有紅絲至腋，生唇

凡疔瘡必有紅絲路，急用針於紅絲所至之處出血，及刺疔頭四畔出血。若針之不痛，或無血者，以針燒紅，頻烙患處，以痛爲度。若下部所患，多宜隔蒜灸之，痛則灸至不痛，不痛則灸至痛，若灸而不痛者，宜明灸之，及針疔四畔，出去惡血，却以稜針深刺破疔頭，瘡口用海馬拔毒散敷之，或雄礬丹敷之，待疔四圍發黃，飽浮腫，知痛爲佳。若疔未發，用火針四畔亂刺，如有紅絲脈盡處，亦以火針三向刺斷，刺了卽敷藥。若疔不痛不發者，用艾火於疔瘡上灸之，三壯，候瘡邊起黃，飽發後，方可貼膏藥。凡疔腫皆刺中心至痛，又刺四畔，令出血，去血傳藥，藥氣入針孔佳。若不針透瘡內，不得力也。若起紫飽，初然切不可針破，服藥趕出，自破出血水爲妙。若服藥後又不破，方以針挑破無妨。若起紫飽腫痛者，以萬病解毒丸外塗內服。若成膿不乾者，以米酢調鐵鏽塗之，自然凸出膿水卽乾。

多有患此不覺而暴死者，用燈照看，徧身有小瘡，卽是疔毒，宜灸瘡處候甦，更服敗毒藥，并追疔奪命湯。若內疔之證，用化毒丸置舌上，含化出涎，或只用蟾酥一粒，重者二粒，置病人舌上，含化後，良久用井水漱去毒涎爲妙。若牙關緊急及喉內患者，並宜含蟾酥丸，或朱墨丸，良久用井水漱去，更宜服二九，少停又服二九，又服奪命丹，或雄黃丸，通利一行，得利爲度。又用霹靂火汗之，再用前藥調之。或初生一箇，次生二箇，逐漸流注者，急將初生者用鐵筒拔毒膏點破，消蝕惡肉，卽不流注，却以油髮蛇退、土蜂房、皂角刺各另燒存性，等分，白芨減半爲末，揆之以平瘡口，此卽前所謂三十六疔者也。其魚臍疔瘡頭深黑，破之黃水滲出，四畔浮漿，其毒尤甚，通用前法，及服萬病解毒丸，以清心行血。

治法，表實者宜解表，以荆防敗毒散，追疔奪命湯，初發之時，必發熱身疼，此乃毒氣在表，故發表則毒從毛腠而出。裏實者宜攻裏，以救命追黃湯，連薤攻裏散，表證皆罷，毒氣入裏，口渴便秘，毒在內也，故攻裏則毒從臟腑而出。表裏俱實者，宜解表和裏，以化毒消腫和裏散，加紫河車、獨腳蓮、紫金藤、苦花子，其證發熱身疼，口渴便秘，乃表裏俱見，故攻發並用也。

作，亦名暗疔。寸疔生手指骨節間。虎口疔生合谷穴。魚臍疔狀如魚臍。茱萸疔中凹邊突。蛇眼疔頭黑

皮浮，形如小豆，狀似蛇眼，忌惡眼看，并嫉妬人見之及觸毒藥。紅絲疔一名血箭疔，一名赤疔，一名紅演疔，生於

舌根下，或生頭面，或生手足骨節間。其證最急，宜迎其經刺出惡血，則愈。稍遲毒氣攻心，嘔噦迷悶者死。若絲近心

腹者，就於絲盡處刺出惡血，更挑破初起瘡頭，以泄其毒。芝麻疔走注不定，偏身疼痛，不能轉側。爛疔潰出膿

水，大如匙，面色稍黑，有白斑，忌沸湯熱食爛物。雖疔瘡頭稍黃，向裏繫亦似灸瘡，四面炮漿起，心凹色赤，大如錢，孔忌

孔，又有一枚在他處，以水噴之，則見大忌房事。雄疔其狀頭黑，繫突起，四畔仰炮漿起，有水出色，黃大如錢，孔忌

房事。黃疔有眼在皮，發如齒齧之色，手足麻木，涎出不語者死。黑疔狀如黑炮。櫻桃疔狀如櫻桃。蛇頭疔

生手指頭兩旁，狀如蛇頭，甚腥穢，紫黑色，痛引心，有潰爛脫落者。足面疔狀如粟米，癢極入骨，急隔蒜灸之。大抵

如豆，如白，如金箔，如茱萸，如石榴子，或發疹搔破而青黃赤色汁出，或衣物觸著而疼痛忽生，或白而腫實，或赤而

浮虛，其狀不一。初覺頂不起者，急隔蒜灸之，灸而有炮者吉，無者凶。服汗劑得汗，則生，無汗則死。刺出紫血者危，出

黑血者死。緩者，一日瘡疔炮色微白，二日炮色大白，三日色微紫，四日色真紫，皆緩之候也。急者，五日色微青小緊，六日色深青大緊，七日色黑，其形如魚臍，或如灸瘡之狀，皆急之候也。凡生疔瘡，身熱頭疼，手足溫和，飲食如常，疔之四圍赤腫，名曰護場，可治。凡生疔瘡，眼白睛癡不轉，渴欲飲水，內熱

瘡盛，唇舌青，臥牀不能起，五心腫頭運，眼花氣粗，食不進，脈伏讖語，惡心腹痛，冷汗出手足冷，滑泄無度，疔之四圍無赤腫，名曰不護場，不可治。瘡證急者有應，如生一疔之外，別處肉上再生一小瘡，卽是有應，可用針挑破護場。瘡四圍有赤腫生多瘡者，謂之滿天星，飲食如常，頭痛身熱，手足溫。

或起紫泡，或起堆核，腫痛創人發熱煩悶，頭疼身痛，骨節煩疼，先用天馬奪命丹，次用四神丸解毒消瘴散，次以七神散，又以萬病解毒丸，却瘴消毒散，兼服朱墨丸，并用祛瘴散，多用毛屎梯根磨水服，或仙人掌磨水服，如不熱磨酒服，大熱不退者，宜用退熱消毒飲，又要以箍瘴散箍住，不使走散，又以洗瘴散淋洗，次以刷瘴散塗刷，若成瘡，以揆瘴散揆之，好膏藥貼之。

若患疔瘡，始初不覺，不會用前法出汗，過數日，外證皆罷，或在胃腹之間，或在胃之下腫起，此乃毒氣入裏所致，用霹靂火治之，若服當歸散，外證不解者，亦急用霹靂火發散。

若疔瘡在兩脅間，毒氣欲奔心，乃危急之證也，可急於瘡尖上用艾炷灸三五壯，仍於灸穴前後左右針出少血，灸瘡四圍有炮起，吉無炮凶。若疔在虛軟不便處，不可用針，只可用松針法針斷紅絲路，若生兩膊間，毒氣欲奔腎者，用松針法於兩膊紅絲路盡處針斷出血。若生頭面上者，可於項間紅絲路盡處針斷出血。若各處紅絲路亦有，不現者，亦可以消詳用松針法針之。凡用松針者，蓋因紅絲路不現，無可下針，故用此法於項下、脅下、腋膊虛軟之處，針斷紅絲路，不使毒氣攻心攻腎而已。

若手足厥冷，六脈俱絕者，此毒氣已深，氣血爲毒氣所併，不能流通，故體冷而脈不見。宜木香流氣飲連進數服，氣血通流，脈自回矣，然後依法治之，萬不失一。

內疔之證，與外疔並同，亦發寒熱，頭疼身痛，但瘡形不現。不過數日，胃背腹脅頭面手足間，或有一處腫起，卽內疔所發之處，急用霹靂火如前不護場汗法，於腫處出汗，若身體寒熱雖未有腫起，但腹痛甚者，便須作內疔證，用後法治之，不可緩也！

治內疔，蟾酥須於取時用桑葉小錢大，入蟾酥搗和得所，丸如珍珠大，陰乾用。

腫勢盛脈浮數者，宜散之，蟾酥丸、返魂丹。

毒勢盛脈沉實者，宜下之，奪命丹、萬病解毒丸。

無表裏證，服散毒消毒藥後，以復元通氣散加麝香少許。

虛弱人以五香連翹湯，合十宣散，稍虛者，只以人參敗毒散。

按五香連翹湯，乃溫熱走竄之藥，既是虛人，豈其所宜？當用薛氏法為良。

疔毒拔出，用金銀白芷散，十宣散，調理未潰者，不須此藥。

初發惡寒發熱，或拘急，或頭疼，或寒熱交作，或肢體重痛，或大便秘結，宜以敗毒散加防風、荆芥、連翹、黃芩、青木香、

金銀花、天花粉、大黃、生地黃。若無惡寒，但發熱者，可服切瘡消毒散、十神散、萬全散。若表證皆罷，毒氣入裏者，可用

雄黃丸。

怯弱之人，不可用峻厲藥攻之，宜隔蒜灸五十壯，以人參敗毒散數劑。若生道遠位僻之處，非峻厲則藥力不到；若

以峻厲，則胃氣先傷，虛虛之禍，有所不免，不若灸之為宜。

疔瘡四畔紅赤，漸散開闊，走散不止，此名疔瘡走黃，宜以通聖消毒散通利兩三行，次去大黃，砂硝調理而愈。或解

毒消瘴散，亦可用之，有效，此宜作瘴氣治之無誤。

疔瘡腫硬，脈數煩躁，喜冷口渴便秘，宜以連翹攻裏散一服，次用蟾酥丸。若兼有表邪者，以荆防敗毒散加金銀花、

天花粉、大黃、連翹，脈實有熱，更加黃連、黃芩，或只加苦花子，退熱治瘴之妙藥也。

若因剝割疫死牛馬猪羊，替悶身冷，遍體俱有紫泡，此疔毒也，急灸泡處，良久遂甦，即以人參敗毒散加防風、荆芥投之。

若忽然惡寒作嘔，肩臂麻木，手心瘙癢，遂替悶不自知覺，但有一泡，此疔毒也，急灸五十壯而甦，又五十壯知痛，投

氣所侵燥爲陰虛內熱消燥津液不能滋潤臟腑以波及皮膚枯槁倒卓金妙少方心氣耗散西清氣衰身重不節所動。此六淫者皆從外而入之，體實之人遇而不中者有，體弱之人感而隨發者多，又有感之不發，邪氣客於臟腑經絡關節之內，積襲日久，或待內傷，或因外感邪氣觸而發之，既發之後，當察寒熱溫涼邪正勝負而治之。膏粱厚味多無忌，勞傷房慾致虧陰。

註膏粱者，醇酒肥鮮炙博之物也。時人多以火炭烘熏，或以油酥燻煮，其味香燥甘甜，其性鹹酸辛辣，又至於醜藏厚料，頓煮重湯，以取其爽口快心，不顧其消陰燻臟。又得於寵妾滿前，精神飛曠，溫牀厚被，爐火圍匡，每至於未飢先食，未冷先綿，快意從心，色力太過，稍有不及，便去與陽，惟取快意於一時，不覺陰消於平日。况所生是疾者，不起於藜藿，蓋屬於膏粱，誰識膏粱味短，不及藜藿味長。凡知命者當遠之避之，擇而用之可也。故將五臟多乖變，自然六腑不調勻。

註五臟屬五行金木水火土是也，常欲相順相生，所謂木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，此五臟相合相生，稟太和之氣，其疾何以生焉？是爲疾者，五臟必相反相剋，所謂木剋土，土剋水，水剋火，火剋金，金剋木，此五臟相刑相剋，理返互變之機，其疾再無不作者。所謂相生者，昌相剋者，亡，此誠爲萬物生剋一定之理，豈止於疾病言哉？又謂五臟不和，則六腑不通，六腑不通，則九竅疲癢，九竅疲癢，則留結爲癰，蓋癰疽必出於臟腑乖變，開竅不得宣通而發也。治當寒邪而痛者，以溫熱散之；濕腫強痛者，滲而導之；燥搐攣痛者，滋而潤之；泄而痛者，溫之；塞而痛者，通之；虛而痛者，補之；實而痛者，瀉之；陰陽不和者，調變之；經絡祕澀者，沖和之；膿脹而痛者，開之；惡肉侵蝕者，去之；勞而痛者，逸之；損而痛者，續之；此等皆爲活法，惟在用者詳之。

發於心上多危險，五臟相干事可明。

註五臟者，心肝脾肺四臟皆係於背，惟腎經一臟獨居於下，雖居於下，其本臟精華津液，元氣元神，盡行灌溉，榮

陳實功外科正宗

○原委論第一

癰疽發背爲何生好身軀出此形。

註凡人處世而無疾病者，水升火降，精祕血盈也。養生篇曰：毋搖爾精，毋勞爾形，皈心靜默，可以長生。此皆遠世俗忘名利，無貪嗔，却疾病，惟修身保命之士所能。今人豈能及哉？蓋謂靜則生水動則生火，又水能生萬物，火能剋萬物，故百病由火而生。火既生，七情六慾皆隨應而入之。既入之後，百病發焉。發於內者爲風勞，蠱膈痰喘，內傷發於外者，成癰疽發背，對口疔瘡，此皆言其大略也。故成癰者壅也，六腑毒騰於外，其發暴而所患浮淺，因病原稟於陽分中，蓋陽氣爲陽，屬輕清浮而高起，故易腫易膿易斂，誠爲不傷筋骨易治之證也。疽者沮也，爲陰屬五臟，毒攻於內，其發緩而所患深沉，因病原稟於陰分中，蓋陰血重濁，性質多沉，故爲傷筋蝕骨難治之證也。凡年壯氣血勝毒則順，年老毒勝氣血則險，治法載於第二論中，宜詳觀之。

內被七情干臟腑，憂愁思慮總關心。

註七情六慾者，皆盜人元氣之賊也。人能疎於此者，無不多安多壽。人若親於此者，無不有損有傷。但人能味之者，鮮矣！蓋情慾之動作，無所不好，無所不爲，故喜傷心，怒傷肝，憂傷肺，思傷脾，悲傷魂，恐傷腎，驚傷膽，此等七情，皆耗人一身元氣之萌孽也。至於六慾者，耳聽聲音，眼觀物色，鼻聞香氣，舌貪滋味，心惟天地，意幌萬方，此等六慾，皆損人三世鍾靈之真性也。又所以爲苦爲疾爲實爲疹，以及休廢諸衰敗病諸瘡，盡皆出於此等之情慾也。醫者患者，亦宜慎察之！

六淫傷氣血風寒暑濕火相臨。

註蓮子蜂窠，多生於背，與心相近，與脊中平，輕者形長高腫，或偏半背，重者形斜平塌，兩脅俱傷，孔似蜂窠，突如蓮子，瘡形可畏，常能多險多生，老弱不堪，反取常安常穩。大規只怕不純陽，治法何妨瘡勢惡，護心護膜，丸丹須要調停，執藥執方，活法在乎醫意。機參總論，法決存亡。

腰間腎俞發難生。

註腎俞發者，生於兩腰內腎陷肉之間，或正中亦發，凡生於此者最為險候。蓋內腎乃為性命根本，藏精藏氣藏神，又謂受命先天，育女育男育壽。凡此皆推腎臟一竅而言也。其為疾因房勞過度，氣竭精傷，慾火消陰，外陽煽惑，以致真水真陰，從此而耗散，既散之後，其臟必虛，所以諸火諸邪乘虛而入。既入之後，渾結為瘡。如木臟稍有真陰制火，瘡形自可紅活，高腫為膿，治以人參養榮湯，加山萸五味子黃蘗知母，及加減八味丸以救其源。若瘡形色紫黑，乾枯堅硬，不作膿者，為真陰內敗，再無可生之理，必死在十五日前後為期也。

督脈經虛從項發，俗名對口故相稱。

註對口者，生於項後而對前口者是也。但有偏正之不同，發於正者，屬督脈所主，發於偏者，乃太陽膀胱所司，二者皆起於濕熱上攻凝結而成也。督脈者發瘡雖正而反為易治，因督脈起於下而貫脊行於上，故毒氣得之反能衝突高腫，使邪毒不致下流低陷，乃為外發，故多易治。膀胱者發瘡雖偏而每為難治，蓋膀胱之脈起於巔頂，貫項兩旁，順下而行，乃與瘡毒交會下流，故瘡多平塌，又太陽膀胱主司寒水，其質多冷多沉，故瘡於此多難起發，形色多難紅活，堅硬難潰。又易流注兩肩胛項，作腫十五日外無膿者，必然變黑歸陰，故多不治。俗呼以正為重，以偏為輕，此皆庸說，不得其消息故也。治以黃連消毒飲主之，餘皆降火化痰解毒清心，托裏為要也。何期耳後多生發，天疽銳毒果非輕。

注於上。故四臟之火，皆賴一臟之水以濟之，所謂五臟根本皆係於背，即此之意也。凡發癰疽者，未有不先傷五臟而後發之，况背乃太陽膀胱督脈所主，太陽者六經之首領也，督脈者十二經絡之總脈也，所以瘡生於背，毒犯於此，况心又屬君主之位，豈容毒相犯之？凡發於此，故多成危險，難治之證，醫者不可不慎而察之。

心之已下多成順，六腑之因亦許輕。

註凡瘡生於心之以下者，除腎俞一穴外，皆爲緩。六腑者，足陽明胃經，手太陽小腸經，足太陽膀胱經，手厥陰心包絡經，手少陽三焦經，足少陽膽經，此經其名屬腑，其形在下，其氣主表，其病爲癰，故疾發於五臟者爲重，生於六腑者爲輕，此爲表裏臟腑輕重之別也。

脾家積毒生肩脊

註發生於肩下脊上者，乃因飲食膏粱積毒所致。發出高腫鮮明根脚，不過兩肩者爲順，先宜解毒護心爲主，次宜內托清心爲要，間用蠟礬丸護心散，防毒攻心，如腫平堅硬，漸大漸開，攻注兩肩胛項或腫而不定者，危。

心經火毒對心臨。

註對心發者，乃心火妄動熱極而發之也。况心爲一身之主宰，周身蘊熱，流會於此，共結爲患，又稱毒剗君位，最易傷人，刑截督經，害非輕淺。况此穴背脊多坑，固難起發，瘡形落陷，腫不高尖，治當大降心火，急疏蘊熱，頂用針通，隨行拔法，務使毒氣內外疎通，各從門出，庶不內攻，方爲成效。保至十五日後，內無變證，得膿爲解，如是期變證，漸生堅硬，漸大不作膿者，死在二十二朝前後。但此證貴在乎早治，十中可保其三、四也。

兩肩左右雙生發，肺肝積受不虛名。

註左搭屬肝，右搭屬肺，生於左右肩骨移動之處爲可治。古云左搭串右，右搭串左，俱爲難治，予以爲不然。每醫左右相串者，未嘗見其死，惟在治法得宜耳。治之先用萬靈丹發汗，疎通內外，次以酒肝解鬱湯，柴胡清肝湯氣

看法全在日力精巧與心相應。一、察明表裏。透備參妙。二、定治法。凡初起之時，以毒氣未入於內，故宜先發。陽表裏寒熱虛實，俱當先灸。輕者使毒氣隨火而散，重者拔引鬱毒，通徹內外，邪得火引，毒氣混合，為陽方能發。腫作痛，然後可汗可攻，或消或托，兼求標本參治，必以脈合藥，以藥合病，如此治之，自然無錯矣。故藥難執，方全在活法，大抵首尾俱不可損傷元氣，脾胃為要。

內服蟾酥丸一服。外將神火照三枝。

註凡瘡初起七日之前，或已灸之後，未服他藥，宜用蟾酥丸一服，得汗解為妙。或萬靈丹發汗亦可。所謂毒氣隨汗而散，最為捷徑。如二藥服後，或發汗不出，此乃表裏閉密之故，毒亦不輕，當神妙拔根方施治。神燈照法甚妙，亦不可用之太早，如瘡四五日之間，形未聚，毒未出，若用之早，恐留鬱而內毒反致難出，須用在八九日之後，瘡勢已定，毒氣已聚，未成膿腐之時，用此照之，已成者自消，未成者自消，不潰者自消，不脫者自脫，亦且能解毒活血，消腫散瘀，誠良法也。

用膏貼頂上，敷藥四邊圍。

註凡瘡最忌風寒所襲，初起之時，或已灸之後，俱當用太乙膏蓋貼頂上，功效在於拔毒提頂提膿，防禦風寒不入。如焮痛高腫，陽瘡七日已後，瘡頭自有黃色稠膿，相粘膏上，餘腫紅色，光亮鮮明，每日宜用葱湯洗淨，換膏貼之，其正膿定在十一日前後出也。此為易治易安之證。如七日之後，瘡不大腫，高四邊，又不焮痛，瘡頭亦無膿意，相粘，此為陰陽相等之證，宜用化腐紫霞膏塗瘡頂上，外以膏藥蓋之，換至十日，外瘡頂漸腐，餘腫漸高，似有膿意之象，其正膿只在十五日之後可出也。此為以險成順之證。至於二十日已後無膿者，乃純陰之證，縱治亦無效矣。又如瘡之四邊根脚餘腫，其功又在敷藥收束根本，庶不開大。初起時宜用金黃散敷於四邊，能拔毒消腫，止痛，既潰後當用鐵桶膏箍之，庶瘡根漸收漸緊。但諸瘡原因，氣血凝滯而成，切不可純用涼藥，冰凝肌肉，多致

註發生於耳後一寸三分致命之處，誠爲險惡之候，又左爲天疽，右爲銳毒。天者妖變之物也，故屬肝木，銳者鋒利之器也，是屬肺金。二者皆起於積想勞心，謀慮不決，致火旺而又鬱，鬱而又旺，以成此疾也。故形多堅硬，頭多隱伏，未潰先黑，未膿先腐，臭穢易生，元氣易敗，毒氣多致不得外發，後必內攻而死。但此證初生起於隱微，令人多不知覺，及其知覺，毒已入內矣，如紅活高腫易膿易腐者無妨。

又有脫疽生手足，丹房補術孽根因。

註脫疽之發，脫者落也，疽者黑腐也，此毒皆起於丹石補藥，房術祕法，與陽澀精，幸圖不洩，藥性暴烈，或洗或嚼，或噙於口，或藏臍下，霸阻精道，久戰不弱，取藥一時，恣情戲謔，毒積臟腑，真陰枯灼，種禍在身，終久必發，此是因發者難生，多生手足，發在骨筋，初生如粟，色似棗形，漸開漸大，筋骨伶仃，烏烏黑黑，痛割傷心，殘殘敗敗，汚氣熏人，延至踝骨，性命將傾，此非天命，自喪其身。古人有法，截割可生，今人誰肯，割截爲名，治法雖有，詳在後文。

漫腫難治，痲腫易，總論中間法可憑。諸瘡另自分門說，豈許輕干案此呈？

註漫腫者，肉腫瘡不腫，痲腫者，瘡腫肉不腫是也。此二者發瘡陰陽之大體，辨證順逆之要節，由此觀之，一決而可定也。初起理當升發，潰後不可用內消，宜用托藥，如不應者，乃毒勝氣血，死在旬日。或已發出而不腐潰，根腳堅硬，或軟而散大者，急投托藥大補脾胃，不應死在二旬。若已潰而色不變紅活，亦不生肌收斂，瘡口暈大，腫痛不減，胃氣不回，急須峻補，不應者，乃脾崩，死在月餘。

○治法總論第二

癰疽發背怎生醫？不論陰陽先灸之。不痛灸至痛，疼灸不疼時。

註凡看大瘡，先要從容立定主意，以見標日期爲始，到今幾日，看瘡形與日期可否相對，相應則多吉，不應則多凶。次看受病之源，發於何臟腑，出於何部位，但身體有上下，部位有險否，形色辨順逆，精神論有無，再看年紀老幼。

頭點入寸許，開竅發泄，使毒氣無從而出，必致內攻也。惟內有膿，及便多，出此膿，則其毒自出。此毒一月，其毒自出。瘡雖不腐潰，形尚紅活，焮熱腫痛，此雖膿遲，後必自出，不必針之。蓋緣元氣不能充足，或失用補托之藥，又悞用寒涼，或蓋覆未暖，多致膿遲。有此證者，宜用補中健脾大托補藥，以得膿爲效。又以十五日，至二十一日爲期。過此外者，縱有稀膿，但元氣被毒相拒，日久必致耗散，誠難歸結也。

半月之後膿亦少，須將藥筒對頂拔提，有膿血之交粘，必腐肉之易脫。

註如瘡半月後仍不腐潰，不作膿者，毒必內陷，急用鉞針品字樣，當原頂寸許，點開三孔，隨瘡之深淺，一寸二寸，皆可入之，入針不痛，再深入，不妨隨將藥筒預先煮熟，對孔竅合之，良久候溫取下。如拔出之物，血要紅而微紫，膿要黃而帶鮮，此爲血氣營運活瘡，其人必多活。又謂膿血交粘，用藥可全，色鮮紅活，腐肉易脫。如拔出瘀血紫黑色，敗氣穢，稀水無膿者，此爲氣血內敗死瘡，所謂氣敗血衰，神仙歎哉！此等之瘡難久候，其人必在月終亡。

且如斯時內有膿而不得外發者，以針鉤向正面鉤起頑肉，用刀剪當原頂剪開寸餘，使膿管得流通，庶瘡頭無閉塞。

註已用藥筒拔膿之後，外既有孔，內竅亦通，瘡期又當大膿發泄之候，如尚膿少，此瘡頭必有瘀腐塗塞，內肉亦有頑膜阻隔，多致膿管不通難出也，須用針鉤鉤起瘡頂頑肉，以鉞針利剪，隨便取去寸餘頑硬之肉，取之微痛，或有血出，俱不妨隨用兩手輕重得宜，從瘡根焮處漸漸捺至中間，剪出膿管處內有聚膿，自然湧出，以黃色稠厚爲吉，其膿日漸多者爲輕，反此爲慮，務使塗塞者開之，令膿毒外發也。

頻將湯洗，切忌風吹。

註凡瘡未潰前，或已用照藥後，俱要煎葱艾湯，每日淋洗瘡上一次，甚者早晚二次，使血氣疎通，易於潰散。又已潰時及藥筒提拔之後，尤宜避風，先去舊藥，用方盤靠身瘡下放定，隨用豬蹄湯以軟絹淋湯瘡上，併入孔內，輕

難腐難斂，必當散滯行瘀，拔毒活血藥用之，方爲妥當也。

氣盛兮頂自高而突起，血盛兮根脚束而無疑。

註氣血者，人之所原稟，老者或有餘，少者亦有不足，之命脈，全賴於此。一或有乖，百病生焉。獨瘡科尤關係不淺，但腫瘍時，若無正氣衝托，則瘡頂不能高腫，亦不能焮痛潰膿，若無真陰相滋，則瘡根不能收束，色亦不能紅活收斂。凡視瘡之頂高根活，不論老少，定知氣血有餘，故知老幼俱可無妨，又宜交會明白。交會者，瘡根與好肉交界之處，高低自然分別，明白瘡形與好形各無混雜，自然分明也。以此觀之，了然明白矣。

高腫起者，忌用攻利之藥以傷元氣，平塌漫者，宜投補托之劑以益其虛。

註凡瘡初發自然高起者，此瘡原屬陽證，而內臟原無深毒，亦且毒發於表，便宜托裏以速其膿，忌用內消攻伐之藥以傷脾氣，膿反難成，多致不能潰斂。又瘡初起不高不赤，平塌漫者，此乃元氣本虛，急宜投托裏溫中健脾之藥，催托毒氣在外，庶無變證矣。

內熱甚者，量加消毒清劑，便祕燥者，必須通利相宜，使臟腑得宣通，則氣血自流利。

註腫瘍時內熱口乾，脈實煩躁，便祕喜冷者，此爲邪毒在裏，急與寒涼攻利，宜內疎黃連湯，四順清涼飲，內消沃雪湯，俱可選用。又兼有表證者，防風通聖散，去麻黃或雙解散，加桔梗、天花粉。又或小便利者，兼入天水散、五苓散，俱可合用，務使二便通利，以杜其源。又有元氣素虛者，恐不勝前藥，以托裏消毒散加蜜炒大黃，或兼豬膽套法，亦得通利爲度，首尾俱要閉而不結，通而不泄，得臟腑和平，表裏透徹，方可使用托裏排膿內補之藥。又如潰瘍時，雖有口乾便閉，臟腑不和，小水不利等證，此因潰後膿水出多，內亡津液，氣血虛耗，不能榮潤臟腑所致，其人必脈細而數，口和而乾，飲食減少，好飲熱湯，此乃虛陽之火爲病，非前說有餘所比，只宜養氣血、滋津液，和

臟腑，理脾胃，如此治之，則二便自和，亦無變證，常有誤行攻利，多致不救者。

病生焉，故知脾胃不可不愛護矣。

冬要溫牀暖室，夏宜淨几明窗。

註：凡人之氣血喜暖而惡寒，蓋遇寒則結，遇熱則散，况瘡乃肌肉破綻之病，若不防禦，則風寒最爲易襲，凡看瘡時，冬要著柴炭之火，烘烘暖氣，逼盡餘寒，夏宜淨几明窗，庶外風不入，然後方可揭膏洗貼瘡上。常見患者，夏月縱意當風取涼，或睡臥陰濕之處，冬又不從溫牀暖室，多致寒侵，輕則有妨生肌完口，重則變爲崩塌，不膿不斂陰證。

飲食何須戒口，冷硬膩物休餐！

註：人賴飲食以生養，要適其時。如腫痛自然傷胃氣，諸味不喜，直待潰後膿毒一出，胃氣便回，方能思食。但所喜者，便可與之以接補脾胃，如所思之物不與，此爲逆其胃氣而反致不能食也，但不可太過，然生冷傷脾，硬物難化，肥膩滑腸，故禁之。

癰疽雖屬外證，用藥卽同內傷。

註：如癰疽腦項疔毒大瘡，形勢雖出於外，而受病之源實在內也，治之豈可捨內而治外乎？所以外不起者，內加托藥，表熱甚者，內必清解，血虛宜用四物湯，氣虛宜用四君子，脈虛足冷溫中，脈實身熱涼膈，以此推之，內外自無兩途。

脈虛病虛，首尾必行補法，表實裏實，臨時暫用攻方。

註：丹溪云：凡瘡未破，毒攻臟腑，一毫熱藥，斷不可用。凡瘡既破，臟腑已虧，一毫涼藥，亦不可用。誠哉是言也！茲說又有不然。且如初病未破時，脈得微沉緩濇細數浮空，外形又兼身涼自汗，便利嘔吐少食，瘡形又不起發，不掀

手捺淨內膿，庶敗腐宿膿隨湯而出，以淨爲度。再以軟帛疊成七八重，勿令大乾，帶湯覆於瘡上，兩手輕盈，旋按片時，帛溫再換，如此洗按四五次，使血氣疎通，患者自然爽快。亦取瘀滯得通，毒氣得解，腐肉得脫，疼痛得減，此手功之要法。大瘡不可缺也。候腐脫已見紅肉時，洗後隨用玉紅膏，用搥脚挑膏於手心，捺化捺塗新舊肉上，外用太乙膏蓋之，四邊脚根已消處，不必箍藥，每日如此用之，不數日間膿腐盡脫，新肉頓生，更加內補調理得宜，輕瘡只在月餘，大瘡不過七十日，必完口而愈。

關節在於斯時，變生出於此候。

註陽瘡以十四日爲關，陰瘡二十一日爲節，此時務要出膿勢定，膿出則腐脫，腐脫則肌生，肌生則收斂，收斂則瘡平，亦由次序來也。如期不得膿者，後必有變，所謂一關順後必多順，一關逆後必多逆也。

治當大補，得全收斂之功，切忌寒涼，致取變生之局。

註凡瘡潰後，五臟虧損，氣血大虛，外形雖有餘而內臟實不足，法當純補，乃可無虞。但見已潰時發熱惡寒，膿多自汗作痛者，便進十全大補湯，但見虛熱少睡，飲食不甘者，便進黃芪人參湯，但見皮寒骨熱，效嗽有痰者，便進托裏清中湯，但見四肢倦怠，肌肉消瘦，面黃短氣者，便進人參養榮湯，但見膿多心煩，少食發躁不睡者，便進聖愈湯，但見脾虧氣弱，身涼脈細，大便溏泄者，便進托裏溫中湯，但見飲食不甘，惡心嘔吐者，便進香砂六君子湯，但見脾虛下陷，食少虛熱間作者，便進補中益氣湯，但見腎虛作渴，不能相制，心火者，便進加減八味丸，做此選用。蓋托裏則氣血壯而脾胃盛，膿自排，毒自解，死肉潰，新肉生，飲食進，瘡口斂。若不務補托而悞用寒涼，謂之真氣虛而益虛，邪氣實而益實，多致瘡毒內陷，膿多臭穢，甚則脈洪大渴，面紅氣短，此真氣虛而死矣。

蓋瘡全賴脾土調理，必要端詳。

註脾爲倉廩之官，胃爲水穀之海，胃主司納，脾主消導，一表一裏，一納一消，運行不息，生化無窮。至於周身氣血，

致內攻以成不救者多矣。如變在十一日未出膿之前形勢與好肉相平，不疼不熱，軟慢相兼，瘡孔止流清稀肥水，更兼身體不熱，脈亦微細，飲食厭餐，精神昏短，此乃瘡毒變入真陰，雖強投溫中健脾之劑而不應者，百無一生。如變在十五日之後，已出膿時，毒氣已將外發，或調攝失宜，悞餐冷物，忽變為陰者，急投托裏溫中湯，十二味異功散，輕者十全大補湯，俱倍加參芪桂附以救之，須得瘡熱作痛，膿出身溫，脈起食進者為吉。若瘡原本於陽，自多得生也。

豈期陰變為陽，首尾得辛熱扶妝，病分真似，理究陰陽。

註發於陰者，為疽，為冷，為硬，為虛。此原屬陰證，難治。患者知覺欲其生，而故將辛香酒煎大方熱藥以助之，醫者又欲患處高腫焮熱作膿，敷以熱藥，圖其起發，故瘡得藥性大熱而轉陰為陽。雖得微腫微熱微痛微膿，但瘡形終不似真陽紅活，亦不能得其真厚黃膿，以瘡原本於陰，故多死。若治法得宜，內外融和，奇偶中節，十中亦有一二可生者，要如救焚拯溺，可施者毋待少頃，切似履冰臨淵，可禁者毋妄絲毫也。

既有針工之異說，豈無線藥之品詳！

註腫高而軟者，發於肌肉，膿熟用針只四五分，腫下而堅者，發於筋脈，膿熟用針只六七分，腫平肉色不變者，毒氣附於骨也，膿熟用針必須入深寸許，方得見膿。又輕按熱甚，便痛者，有膿且淺且稠，重按微熱，方痛者，有膿且深且稀，按之陷而不起者，膿未成，按之輒而復起者，膿已成，按之都硬不痛者，無膿，非是膿即瘀血也。按之都軟不痛者，有膿，非是膿即濕水也。所謂有膿即當針，膿孔宜順下。若膿生而用針，氣血反泄，膿反難成。若膿熟而不針，腐潰益深，瘡口難斂。若膿深而針淺，內膿不出，外血反泄，膿淺而針深，內膿雖出，良肉受傷。元氣虛者，必先補而後針之，諸證悉退。又有氣癭腫而綿軟不痛者，血癭腫而內壘成塊者，頑毒結之日久，皮腐肉紫，根硬四邊紅。

不痛，無潰無膿，此等證皆緣氣血虛弱之故，若執前云，未破毒攻臟腑之說，必投涼藥攻之，復損元氣，其能生乎？予謂治病，不論首尾，難拘日數，但見脈證虛弱，便與滋補，乃可萬全。如補不應，虛弱甚者，須用參朮膏、八仙糕、陽虛自汗、食少者，單人參膏，或六君子湯，加砂仁、木香，甚則加附子、泄瀉腸鳴、胃虛嘔逆者，參苓白朮散，加豆蔻、山藥、木香、柿蒂、脾虛下陷、溇泄及肛門墜重者，補中益氣湯，加山藥、山萸、五味子選用。又有表實者，身體發熱，無汗惡寒，裏實者，脈大身熱，便燥口乾，假如表證急者，先用荊防敗毒散以解其表，裏證急者，先用四順清涼飲以攻其裏，表裏相兼者，宜防風通聖散發表攻裏，此隨其表裏先後治以活法。古人謂受補者，自無痰火內毒之相雜，不受補者，乃有陰火濕熱之兼攻。又謂補而應藥者，多生虛而不受補者，不治。

病要論久新要法在於寬治猛治。

註病有新久，勢有緩急。如受病之初，元氣未弱，治當隨證迎刃而解，若行霸道猛劑，定不能決效於危急時也。但要中病即已，表證盛者，用萬靈丹大加表散，裏證急者，以內疎黃連湯急與通行，又如受病日久，邪正相拒，其元氣未有不衰弱者，縱有餘證、雜證、壞證，俱當先固其本而後調之，和之、散之，使病氣漸退，元氣漸醒，飲食漸進，根本漸實，則餘患再無不愈之理。常見治者，不論病之新久，本之盛衰，又不悟因虛致病，因病致虛，其中又有虛熱虛寒之別，一例妄行攻治，如盲人騎瞎馬，半夜臨深池，豈不危哉！

藥必求標本，功莫別於先醫後醫，若一槩以攻補，恐兩途之悞用。

註以天地運氣標本言之，五運爲本，六氣爲標，以身體標本言之，五臟爲本，六腑爲標；以疾病標本言之，初病爲本，傳病爲標，元氣爲本，病氣爲標。凡治病者，必先治其本，後治其標，誠爲妥當。若先治其標，後治其本，使邪氣滋甚，其病益增。又謂緩則治其本，急則治其標，假如先得瘡疾而後得泄瀉、嘔吐、食少等證，此又宜捨本從標之法。

治之藥寫上區定食進，方再治，餘故此。若一槩攻補，必兩途悞用，此屬疾病邪正之標本也。

⑤五善歌第六

心善精神爽，言清舌潤鮮，瘡疹兼不渴，睡醒得安然。肝善身輕便，因煩自不煩，指頭紅活色，坐起覺平康。脾善唇滋潤，衾幃蘭麝香，凡餐俱有味，膿厚更肥黃。肺善聲音嚮，無痰韻更長，肌膚多滑潤，大便自尋常。腎善誠為要，水升火自降，口和兼不渴，小水得稀長。

⑥七惡歌第七

一惡神昏憤，心煩舌上乾，瘡形多紫黑，言語自呢喃。二惡腰身強，雙睛邪視人，瘡頭流血水，驚悸是肝連。三惡形消瘦，膿清臭穢生，瘡形多軟陷，脾敗不知疼。四惡皮膚槁，聲嘶韻不長，痰多兼喘息，鼻動肺將亡。五惡成消渴，飲多口更乾，形容多慘黑，囊縮腎真傷。六惡身浮腫，腸鳴嘔餽頻，大腸多滑泄，臟腑並將傾。七惡瘡倒陷，形如剝鱗同，四肢多冷逆，污水自流通。

⑦治病則例歌第八

外科之瘡有治例，說與君家須切記！病端百出別根因，方法甚多豈同類？熱與寒，通與祕，其中消息知端的。通多不足祕多餘，熱實寒虛分證治。陽似陰，陰似陽，似中妙理要推詳。不分表裏一例治，輕變重而重變亡。醫者貴乎多應變，不可偏執用其方。且如表證惡寒宜用荆防敗毒散，裏證發熱可施內疎黃連湯。瘡勢已成，托裏消毒散誠為正法。內膿將潰，十全大補湯最是相當。人參養榮湯，治潰後虛熱發作，木香流氣散，結腫寒濕為殃。飲食不甘，定用香砂開胃，精神怯少，須將參朮回陽。陰虛陽虛，須八珍最為要領，盜汗自汗，得獨參一味可強。潰後多疼，乳香定痛散功奇莫緩，脾虛下陷，補中益氣湯奏效尤良。口燥讞言，瀉實火，須黃連解毒；湯心煩衄血，理虛陽必犀角地黃。湯古法治癰疽，稱述僊方活命飲，今時醫發背，還期神授衛生湯。蟾酥丸在外科稱為獨品，護心散解內毒號曰無雙。

絲纏透者，結核之證，漸大漸腐，漸痛者，已上四證，俱不可妄破，妄破定然出血不止者，立危。但用針之法，妙在膿隨針出，而寂然無所知覺也。至於瘦瘤瘰癧痔漏疔毒堅硬頑瘡諸證，若非線藥之功，亦不能刻期收效。

湯散丸丹，要在發而必中，神聖工巧，誠爲學者機關。千方百證，難盡短長，治在活法，貴在審詳。用之得當，醫可稱良。詞雖粗鄙，後學提綱。

註嘗言昔者承平，今時擾攘，所以動靜世務不同，勞逸機關已異。當原受病從外而來，今之受病從內而發。古者多實，設方宜散宜宣；今者多虛，治法宜滋宜補。若醫者不識古達今，一槩施與，必多夭枉也。

③陽證歌第三

癰疽不論上中下，惟在陰陽二證推。發背雖有正與偏，要取高低兩樣看。純陽初起必焮腫，更兼身熱有微寒。頂如尖字高突起，腫似灣弓根有盤。七日之間多焮痛，二七之期膿漸漫。動息自甯食知味，二便調勻無瀉乾。腫消膿潰精神爽，脫腐生新氣血完。五善自然稱並至，七惡全無半點干。痛便隨膿減，腫退自肌寬。新肉已生紅艷艷，腐皮自斂白漫漫。一身多爽快，五臟盡和歡。此屬純陽俱易治，百人百可保全安。

④陰證歌第四

純陰初起不知瘡，粟米之形疔瘡僵。不紅不腫不知痛，少熱少焮少隄防。七朝之後身體倦，瘡根平大喜澆湯。頂不高兮根不活，色不光兮腐不穰。陷軟無膿空結聚，脈浮散大細飛揚。飲食不餐身戰慄，嘗湯止見意倉忙。瘡上生衣如脫甲，孔中結子似含芳。膿多臭穢身難便，舉動愴惶韻不長。瘡形成黑紫，面色變青黃。精神昏憤多，睡眠言語無人自發揚。口乾多舌強，痰喘定身亡。此屬純陰俱不治，百人百可到泉鄉。

⑤半陰半陽證歌第五

陰陽之證兩相交，生死同兼事可招。微熱微寒微赤腫，半昏半爽半平高。脈來雖數多無力，飲食雖餐不易消。腫而

裏知痛深處方是好肉。蓋艾火拔引鬱毒，透通瘡竅，使內毒有路而外發，或爲瘡科首節第一法也。貴在乎早灸爲佳。又有禁灸數證，亦以參詳。頭乃諸陽之首，純陽無陰之處，凡生瘡腫，俱是亢陽熱極所致。如再加艾火，使毒氣熾甚，隨後反加大腫，最能引動內痰，發之必死。面生疔毒亦然。又有腎俞一穴，在於兩腰脊旁，係內腎命根所係之處，此穴發瘡，多因房勞素虧，腎水枯竭而成。若再加艾灸，火燦其源，必致內外乾涸，多成黑陷昏悶而死。又有患者元氣素虛，發瘡多不高腫，其人體必倦怠，精神必短而昏，脈必浮散空虛，數而不鼓，此內無真氣，抵當火氣，如灸之其人必致昏憤而死，常謂艾火不虧人，此言悞矣。

⑤ 論病生死法第十

初生如粟，裏可容谷，外面如麻，裏面如瓜，外面如錢，裏可容拳，起勢大，終無害。未老先白頭，無膿軟陷休。瘡從疔瘡起，有膿生方許。腫潰氣昂昂，不治自安康。根高頂又高，八十壽還饒。焮腫易腐爛，任大終無恙。瘡高熱焮疹，雖苦必然生。瘡軟無神氣，應補方爲益。肉腫瘡不腫，必竟生疑恐。膿穢不進食，泄瀉黃泉客。瘡色豬肝紫，無膿必定死。綿潰不腐爛，內怕葡萄嵌。仰臥不知疼，陰證命難生。腐盡有敗氣，笑裏終生戾。根散瘡平塌，神仙無治法。久病目露神，必竟命難存。面忽似塗脂，十日後分離。敗中有橫肉，雖重生門路。新肉如板片，不食終須變。手足皮枯槁，血敗生難保。唇白眼無神，腹脹瀉將傾。醃氣不滲氣，雖重多生意。眼匡黑氣濃，癰疽怕此逢。房中香馥馥，是病終爲福。瘡熱身微熱，輕病何須說。生死中求片言，一可決。

⑥ 察形色順逆第十一

凡看人病兼視其形色，後與脈病相參，誠識於始，以決其終，百無一失矣。何以知之？陰病見陽色，腮頰紅獻，陽病見陰色，指甲呈青，此二者俱死。又身熱脈細，唇吻反青，目珠直視者死。面如塗脂，色若土黃，油膩黑氣塗抹者死。唇舌

詎知蠟礬丸護膜護心，可羨淡中有味，還讚玉紅膏生肌生肉，堪誇壞裏呈祥。身涼自汗，腹痛腸鳴，嘔逆豈逃異功？散睡臥不甯，虛陽發躁，膿多定用聖愈湯。生脈散接虛羸，脈來微細，歸脾湯除驚悸，睡得安康。竹葉石膏湯治虛煩，身熱者何須疑慮？麥冬清肺，飲除膈熱，有痰者毋待商量。金鯉湯治肺癰吐膿氣急，元龜丹攻結毒臭腐頑瘡。風熱牛瘡通聖散，瘡瘍狂躁破棺丹，小柴胡湯除客邪往來潮熱，大防風湯攻腿膝寒濕為殃。咽腫咽疼，定用清咽利膈散。斑紅斑紫，豈逃化斑解毒湯。八味丸獨口乾妙藥，二神丸治脾泄奇方。香連丸為臟腑瀉痢通用。甘露飲治口齒腐爛相當。六和湯和脾止吐瀉，雙解散解表內傷。逍遙散善治女人諸病，保元湯常扶赤子多傷。皮膚毛髮乾焦，蘆薈丸效應甚捷。咽喉口齒腫痛，冰硼散功實非常。滋腎丸治下元腎虛不固，涼膈散解上焦膈熱多煩。九龍丹消魚口，吞之滅跡。二蛟散行濕腫，服下安康。呂祖一枝梅，止痢定驚，稱為僊藥，真君妙貼，飲消疹止痛，號曰神方。痔漏瘰癧疔毒，古誇三品錠癰疽流注諸風，今羨萬靈丹。柴胡清肝湯，治鬢疽肝膽有效，黃連消毒飲，醫對口督脈尤良。小兒口內生疳，必用人中白散。大人咽喉腫痛，須將金鎖匙湯，下疳新久珍珠散，小便淋澀木通湯。玉真散破傷風效，復元湯跌撲稱強。提肩散治脰膊強直作痛，拈痛湯除痛腿風濕相傷。小便生疳，龍膽瀉肝湯可羨。大頭腫痛，普濟消毒飲何妨！便毒懸癰內消散吞何足慮？腎癰腿病，芪柴湯下自無殃。又有女子陰瘡，能腫能疼，能至癢，在人活法，或消或補，或蟲妨。蓋男子之囊癰，瀉肝經之濕熱。小兒赤遊丹，解毒兼砭血。凡治楊梅瘡，戒熏為至切。舌下發痰包，利剪方能泄。出如雞蛋清，消痰是真訣。結毒與頑瘡，紫金膏可貼。風瘡徹骨癢，雄黃散效絕。疔瘡先刺血，內毒宜汗泄。禁灸不禁針，怕綿不怕鐵。又有失榮腫，堅硬如巖山，強陰失道證，形狀要分別。婦人之乳巖，此中一例決，半破肉峻嶒，已潰流臭血。如此幾般證，古今無治說。瘡有數百種，難以都陳白。惟在一點心，何須三寸舌。學者若精靈，萬事皆通徹。此為粗糙歌，可謾亦可閱。

灸法併禁灸瘡穴第九

當香燥甘甜，粥飯隨其喜惡，毋餐過飽，宜少宜熱宜濃，方無停滯，又得易化故也。如大瘡潰後，氣血兩虛，脾胃並弱，必製八仙糕早晚隨食數餅，以接補真元培助根本，再熬參朮膏，如患者脾胃俱虛，飲食減少，胃膈不寬，飲食無味者，用白木膏三匙，人參膏二匙，清米湯空心化服，喜飲酒者酒化亦可。若精神短少，昏沉多睡，自汗勞倦，懶於動作者，用人參膏三匙，白朮膏二匙，亦酒化服。如肌膚粗澀，面蒼不澤，或大便血少虛秘，以及皮乾髮槁者，同地黃膏各二匙，和服，或飲陽春酒更妙，其功強健精神，頓生氣血，開胃助脾，潤肌榮骨。此二藥功甚非小，大瘡不可缺之，實非草藥之比，病者當信用之，乃無更變。若泛視之，則病多反復不常，故有易愈難愈之分，實在乎得此失此也。

◎雜忌須知第十四

凡病雖在於用藥調理，而又要關於雜禁之法。先要灑掃患房潔淨，冬必溫幃，夏宜涼帳，庶防蒼蠅蜈蚣之屬侵之。一切尼僧孝服經事見行，婦女及遠客生人開瘡時，俱當忌見牛犬腥羶醃臘熏藏之物，俱能作渴。生乾瓜果梨柿菱棗生冷等類，又能損胃傷脾，雞鵝羊肉蚌蛤河豚蝦蟹海腥之屬，並能動風發癢。油膩煎炒烹炙鹹酸厚味等件，最能助火生痰，赤豆蕎麥動氣發病，惱怒急暴多生痞滿。飲食太過，必致脾殃。瘡愈之後，勞役太早，乃為羸證，入房太早，後必損壽，不避風寒，復生流毒，不減口味，後必瘡癢無度，大瘡須忌半年，小瘡當禁百日，此誠為知命君子也。

◎看法

初起頂高根活，色赤發熱，焮腫疼痛，日漸高腫者順。已成焮痛，皮薄光亮，飲食如常，二便調和，身溫者順。已潰膿稠，色鮮不臭，腐肉自脫，焮腫易消，身輕者順。潰後膿厚，稠黃，新肉易生，瘡口易斂，飲食漸進者順。初起頂平根散，色暗微腫，不熱不疼，身體倦怠者逆。已成腫堅，色紫不作膿，惟口乾多煩躁者逆。已潰皮爛，肉堅不腐，腫仍不消，痛仍不減，心煩者逆。潰後膿水清稀，腐肉雖脫，新肉不生，色敗臭穢者死。

乾焦，鼻生煙煤，眼神透露者死。形容憔悴，精神昏短，身形縮小者死。喘粗氣短，鼻掀睛露，語言譏妄者死。循衣摸牀，遺尿失禁，撮空者死。頭低項軟，眼視無神，吸吸短氣者死。皮破無血，肉綻爛斑，麻木不知痛癢者死。齒黃色如煮豆，唇自反理無紋，耳黑枯焦，不聽，人中縮而坦平，口張氣出無回閉，鼻煽相隨呼吸，汗出如珠不散，痰若膠而堅凝，白血紅如肺色，指甲灣而帶青，神昏神浮，神離神亂，緇衣生滿面，黑氣慘天庭，逢之都沒命，法在此中評。

③病有三因受病主治不同論第十二

三因者，內因、外因、不內外因，此說從於先古，其詞意尚有發而未盡者。內因者，皆起於七情，蘊結於內，又兼厚味膏粱，熏蒸臟腑，房慾勞傷，虧損元氣，乃五臟受之。其病由此內發者，但發之多在富貴人及肥胖者，十有八九，其見證瘡多堅硬，根蒂深固，二便不調，飲食少進，外軟內堅，平陷無膿，表實裏虛，毒多難出，得此者，卽病證之內傷也。故曰內因。外因者，皆起於六淫體虛之人，夏秋露臥，當風取涼，坐眠濕地，以致風寒濕氣，藥於經絡。又有房事後得之，其寒毒乘虛深入骨髓，與氣血相凝者，尤重，或外感風邪，發散未盡，遂成腫痛，此肌肉血脈筋骨受之。其病由此外來者，發之多在不善調攝，渠薄勞碌人，十有八九，見證多寒熱交作，筋骨疼痛，步履艱辛，濕痰流毒，以及諸風癱瘓，口眼歪斜，半身不遂，風濕風溫，天行時毒等證，得此者，卽疾病之外感也。故曰外因。又有不內外因，內無七情，十內外無六淫傷外，何由來也？其病得之於饑飽勞役，喜怒不常，飲食者冷熱不調，動作者勤勞不惜，以致臟腑不和，榮衛不順，脾胃受傷，經絡凝滯，故爲疾者，外無六經形證，內無便溺阻隔，其病多生於膜外肉裏肌膚之間，似癩癧痰注，氣痞瘦瘤之屬，治法不必發表攻裏，只當養氣血，調經脈，健脾和中，行痰開鬱，治之法爲最善。此三因之理盡矣。

④調理須知第十三

凡人無病時不善調理，而致生百病，况既病之後，若不加調攝而病，豈能得愈乎？其調治有法，初起病時先看病者

肩疽樂疽居右手，石榴離肘上三分。左元陰右樞疽發，咬骨陰包穴上生。淵疽腎上腿附骨，佛頂疽生腦頂門。人世毒瘡當切記，管教患者卽安生。

顛骨爲疔，脣上疽，鬢邊所發亦疽醫。眉中鳳眉旁侵腦，黑疔耳內不爲奇。鼻内生疔當速療，透腦原來髮際基。眉尾癩疽能大毒，頰疔魚眼近腮齊。

馬刀癩癰氣，癰瘡一氣生。來在頸間，虎毒龍泉脣上下，對口原來髮下藏。牙根脣上癰莫異，牙下生之疽一行。頂牙縫突爲疔治，休作人間容易瘡。

心肝脾腎癰疽，當看胃中穴道醫。更有黃頭并白泡，發無定處速如飛。左爲坐馬，右下馬，尾骨頭尖鶴口疑。此物殺人能致命，火急攻醫切莫遲。

婦人之乳有數種，高腫爲癰，堅硬疽。還有乳巖真惡證，腫如頑石破如墟。鈕叩之風生頸項，裙帶風瘡脚下需。又有濕癩瘡等疾，總生下腿，上安居。

嬰兒走馬爛牙疳，黑腐沿開臭不堪。赤遊丹毒渾身到，鵝口瘡苔滿口漫。風瘡奶癬多搔癢，血灌膿窠痛欠安。還有心脾胎熱證，口疳重舌一般看。

⑤疔瘡論

夫疔瘡者，乃外科迅速之病也。有朝發夕死，隨發隨死，有三日五日而不死，一月半月而終死。此在於毒中之淺深，臟腑之乖逆，節候之寒溫，肅殺之瞬息，畜類尸忤，性情激變，暴戾一時，發生立判。人之氣血虛者，各隨臟腑而中之。且如毒氣發於心經者，生爲火焰疔，其患多生脣口手掌指節間，其發初生一點紅黃小泡，抓動癢痛非常。左右肢體麻木，重則寒熱交作，頭運眼花，心煩發躁，言語昏憤，此等出於心經之病也。毒氣發於肝經者，生爲紫燕疔，其患

⑤ 腫瘍治法

初起知痛或不痛，起發或不發，毋論陰陽表裏，日數遠近，但未見膿者，俱宜灸之。既灸，不知痛癢，明灸之，焮腫發熱，疼痛有時，脈浮數，無便秘者，宜藥托之。身體拘急，脈緊惡寒，飲熱就暖者，邪在表也，宜汗之。腫硬痛深，口乾便秘，身熱脈實者，邪在裏也，宜下之。焮痛勢甚，煩躁飲冷，舌乾口燥者，火在上也，宜清之。腫痛堅硬，背如負石，惡心乾嘔，邪毒在內，解毒拔之。腫痛日深，內膿不出，瘀肉塗塞，瘡口者，急宜開割之。軟漫不作膿及不腐潰者，陽氣虛也，壯脾胃助陽氣，身涼自汗，手足並冷，六脈虛細，便泄陽脫也，急溫之。

⑥ 潰瘍治法

膿熟不潰，瘡不焮熱，食少便溏者，脾虛也，補托溫中。膿清或多，瘡口散大，不生肌者，裏虛欲變證，峻補之。腐肉雖脫，新肉生遲，如凍色者，肉冷肌寒，大溫氣血。潰後食少，心煩不睡，發熱作渴，脾弱陰虛，補中益氣。身涼脈細，倦怠懶言，食不知味者，脾弱也，醒脾助胃。風寒襲於瘡口，皮白綻而不收斂者，外照而內溫補。潰後面黃肌瘦，膿水清稀，瘡色淡白者，當香燥助脾。脈大無力，細濇微沉，自汗身涼者，氣血俱虛，峻補之。出血或膿多，五心煩熱，躁甚不眠者，亡陽也，急補之。瘡口已合，經犯房勞，或值急暴復崩潰者，仍助氣血。

⑦ 瘡名十則

背之左右謂疽癰，手膊肩臂亦相同。肺疽居右癰居左，蜂癰左右近喉嚨。耳後右爲銳毒看，天疽左耳後相逢。左右兩肩名搭手，井疽正發在心中。流注牽藤六七成發於心下正臍平。脅疽生在脅肋下，陰疽大體近期門。穿踝疽穿孤拐下，脚氣原來脚底生。左爲便毒右魚口，鶴膝風前膝眼成。

急者死。日久原瘡無跡，走散之處，仍復作膿，脈數唇焦，終死。病雖險惡，歲運順者可活，瘡雖微險，歲運逆者常危。

◎治法

初生項之以上者，必先針刺以去惡血，庶毒不攻內。初發項之以下者，必先艾灸以殺其勢，庶不侵良肉。發熱惡寒，身體拘急，六脈緊數，邪在表也，宜汗散之。身體發熱，口燥咽乾，脈實有力，二便秘澀者，宜下之。針刺之後，瘡不作，腐邊腫不消，仍加插藥內，用補托初起，悞灸致毒走黃，不住者急當隨走處，砭去惡血。惡寒發熱，乾嘔心煩，作渴悶亂，神昏，宜解毒清心，托裏護膜，潰後氣血受傷，神怯食少，睡臥不甯，宜助脾胃，斂神氣，將愈後氣血漸復，飲食當進，仍作渴者，急滋養腎水。

◎多骨疽論

多骨疽者，由瘡潰久不收口，乃氣血不能運行，至此骨無榮養所致。細骨由毒氣結聚，化成大骨，由受胎時精血交錯而結，日後必成此疽也。但腎主骨，宜服腎氣丸，十全大補湯，先補脾胃，次用艾附餅灸之，令溫暖，腐毒朽骨自然脫盡，生肌斂口而愈。

多生手足腰脅筋骨之間，初生便作紫泡，次日破流血水，三日後串筋爛骨，疼痛苦楚，重則眼紅目眵，指甲純青，舌強神昏，睡語驚惕，此等出於肝經之病也。毒氣發於脾經者，生爲黃鼓疔，其發初生黃泡，光亮明潤，四邊紅色纏繞，其患初生口角腮頰眼泡上下及太陽正面之處，發之便作癩癢，綳急硬強，重則惡心嘔吐，肢體木痛，寒熱交作，煩渴乾噦，此等出於脾經之病也。毒氣發於肺經者，生爲白刃疔，其發初生白泡，頂硬根突，破流脂水，癢痛驟然易腐，易陷，重則腮損咽焦毛聳肌熱，欬吐膿痰，鼻掀氣急，此等出於肺經之病也。毒氣發於腎經者，生爲黑靨疔，其患多生耳竅，胛腹腰腎偏僻軟肉之間，其發初生黑斑紫泡，毒患皮膚漸攻肌肉，頑硬如疔，痛徹骨髓，重則手足青紫，驚悸沉困，軟陷孔深，目睛透露，此等出於腎經之病也。已上五疔，相應五臟，又紅絲疔起於手掌節間，初起形似小瘡，漸發紅絲，上攻手膊，令人多作寒熱，甚則惡心嘔吐，遲者紅絲至心，常能壞人，用針於紅絲盡處，挑斷出血，尋至初起瘡上挑破，俱用蟾酥條插入膏蓋內，服汗藥散之自愈。凡治此證，貴在乎早，初起卽治者，十全十活，稍遲者，十全五六，失治者，十全一二。初起項以上者，三陽受毒，必用鉞針刺入瘡心四五分，挑斷疔根，令出惡血，隨用回疔丹，或蟾酥條插入孔內膏蓋之。如項之以下者，三陰受毒，卽當艾灸灸之不痛，亦須針刺插藥方效。隨後俱用蟾酥丸。冬月萬靈丹發其大汗，毒方得解，庶不稽留毒氣，致生變證。今人治法，不論陰陽表裏部位上下，凡見是瘡，便加艾灸，殊不知頭乃諸陽之首，亢陽熱極所致，其形雖小，其惡甚大，再如艾灸火益其勢，逼毒內攻，反致倒陷走黃之證作矣。既作之後，頭面耳項，俱能發腫，形如尸胖，七惡頓起，治雖有法，百中難保一二。外又有疔名數種，形狀紛紛，故有舊說未及重錄也。

◎看法

初起如疥，形如粉刺，或小泡，或疙瘡，結腫不散者，順瘡腫不作寒熱，亦不惡心，飲食有味，手足溫暖者，順形勢已成，

醫部彙考三百六十四

外科癰疽疔毒門六

方一

○內疎黃連湯 治嘔嘔心逆，發熱而煩，脈沉而實，腫輭木悶而皮色不變，根脚深大，病因在內臟腑
祕澀，當急疎利之。

黃連，芍藥，當歸，檳榔，木香，黃芩，梔子，薄荷，桔梗，甘草，各一兩。連翹二兩。右除檳榔，木香
爲末外，並剉每服一兩，水一盞半，煎一盞先喫一二服，次每服加大黃一錢，再加二錢以利爲度。如有熱證，止服黃
連湯，大便秘澀，加大黃，如無熱證，止用復煎散時時呷之，如此內外皆通榮衛和調，則經絡自不遏絕矣。

○內托復煎散 治腫焮於外，根盤不深，形證在表，其脈浮痛在皮內，恐邪氣盛則必侵於內，急須內
托以救其裏。

地骨皮，黃芪，防風，各二兩。桂五錢，芍藥，黃芩，白朮，茯苓，人參，甘草，當歸，防己，各一兩。
右咬咀，先將蒼朮一斤，用水五升煎至三升，去蒼朮滓，入前藥十二味，再煎至三四盞，絞取清汁，作三四服，終日服
之。又煎蒼朮滓爲湯，去滓，再依前煎十二味藥滓服之。此除濕散鬱熱，使胃氣和平，如或未已，再作半料服之。若大

圖書集成醫部全錄 卷三百六十三 彙考三百六十三 癰疽疔毒門五

三四

④奪命丹 治諸般腫毒疔疽惡瘡。

蟾酥，輕粉各五分。朱砂三錢，白礬枯，寒水石，銅綠，乳香，沒藥，麝香各一錢。蝸牛二十一粒另研。右件爲細末，將蝸牛另碾一處，如丸不就，用好酒糊爲丸，如菉豆大，每服一丸，生葱三五莖嚼極爛，吐於手心，包藥在內，熱酒和葱送下，如重車行五七里，汗出爲效。重者再服一二丸。

⑤蟾酥丸 治疔黃一切惡瘡。

川烏，蓮花蕊，大朱砂各一錢半。乳香，沒藥各二錢。輕粉，蟾酥各一錢。麝香五分。右爲細末，糊爲丸，豌豆大，每服一丸，病重者二丸，依前法服取汗。右三方郭氏稱爲首藥，皆主乎發散，首出太陽例，後二方出少陰例，然皆切劑也。智者當較輕重陰陽之分，取擇用之。

⑥寸金丹 二名返魂丹，三名再生圓，四名追命丹，五名延壽圓，六名來甦圓，七名知命圓，八名得道圓，非人勿示。此方若有人患瘡身未爛者，與三圓服之，嚥下便活。如口噤，但幹開牙關，研化三圓灌下，喉中立生。此方治發背腦疽癰腫，偏身附骨腫痛，先覺時飲水，口中煩渴發熱，四肢沉重，體壯熱。

麝香一分，南乳香，烏金石，輕粉，雄黃，狗寶，沒藥各一錢。粉霜，黃蠟各三錢。硃砂五錢，鯉魚膽，狗膽各一箇陰乾用。金頭蜈蚣七條全者酥炙，頭首男孩兒乳一合，蟾酥二錢。右件爲細末，除黃蠟乳汁二味熬成膏子，同和丸，如菉豆大，小兒丸如芥子大，每服一丸，病重者加至三丸，白丁香七箇研爛，新汲水調送下，用衣服蓋之，睡勿令透風，汗出爲度。大段疼痛如無頭瘡腫，不過三服立效。服藥後，喫白粥瓜薑就睡，大妙。

⑦烏金散 治疔毒腫痛。

牙皂四分，人言製，蟾酥，麝香各五分。血餘煨過，蛇蛻煨過，露蜂房煨，各一錢。蟬蛻酒洗，血竭，

便秘及煩熱，少服黃連湯，如微利煩熱已退，却服復煎散半料，如此使榮衛俱行，邪氣不能內侵也。

③當歸黃芪湯

治瘡瘍臟腑已行，而痛不可忍者。當歸，黃芪，生乾地黃，川芎，地骨皮，芍藥各半錢。右咬咀水煎服。如發熱加黃芩，如煩躁不能睡

臥加梔子，如嘔則是濕氣侵胃，倍加白朮。右三方乃易水師弟治瘡之三法，今特列於篇首，而以古今諸方臚

列於後，臨病之工，詳審脈證而施用之，庶乎可以無失矣。

④托裏榮衛湯

治癰疽疔腫及無名腫毒。桂枝七分，人參，黃芪，紅花，真茅朮，柴胡，連翹，當歸身，羌活，黃芩，防風，甘草炙各一錢。

右作一服，水一鍾，酒一鍾，煎至一鍾，食前服。

⑤加味當歸飲子

治諸瘡瘍諸痛癢瘡，皆屬心火，火鬱則發之。當歸，生地黃，升麻各五錢，防風二錢五分，荆芥穗，何首烏各二錢，柴胡，白芍藥，川芎，羌活，黃芪各二錢，紅花，蘇木，甘草各一錢。右咬咀，每服五錢，水二盞，生薑二片，煎至八分，食遠服。沐浴取微汗

效，速使血氣通和服之應效。

⑥人參敗毒散

人參，獨活，柴胡，桔梗炒，枳殼麩炒，羌活，茯苓，川芎，前胡，甘草各一錢。作一劑，水二鍾，薑三

片，煎一鍾，服後服內托復煎散。

⑦郭氏神效烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等證，若瘡黑陷如石堅，四肢冷脈細，或時昏

味讖語，循衣煩渴，危篤者，服此汗之瘡起。草烏頭，火麻頭，火日收，木賊去節，蝦蟆頭，樺皮節酥炙，麻黃去根節，右曬乾

羌活，人參，苦參酒製，葛根，眞茅朮，升麻，各二錢。黃芩酒製，茵陳葉酒拌炒，甘草炙，各半兩。防風，當歸身，知母酒製，澤瀉，猪苓，各三錢。白朮一錢半。右咬咀，每服一兩，水煎空心服，臨睡再服之。

㊟復煎散 治癰疽發背。

黃藥，黃芩，黃連，知母，生地酒洗，各一錢。防己，山梔，羌活，黃芪，麥門冬，甘草炙，獨活，人參，各半錢。當歸尾二錢，陳皮，防風梢，甘草梢生，蘇木，當歸身，五味子，猪苓，藥本，連翹，桔梗，各一錢半。右咬咀，每服四錢，水一盞煎至七分，去滓，隨證上下，食前後服。

㊟金針散 治發背諸瘡腫。

皂角針春取一半，新採一半，黑者。右一味，不拘多少，曬乾爲末，食後酒調二三錢服。

㊟精要十宣散

人參，當歸，黃芪，各二兩。川芎，防風，厚朴，桔梗，官桂，甘草，白芷，各一兩。右爲細末，每服二錢，加至六錢止，熱酒調下，日數服，以多爲妙。不飲酒者，用木香濃煎湯下，然不若酒力之勝也。許學士云：此方得於都下異人，濟苦者，不可勝數。

㊟十六味流氣飲 治無名惡腫癰疽等證。

川芎，當歸，芍藥，防風，人參，木香，黃芪，官桂，桔梗，白芷，檳榔，厚朴，烏藥，甘草，紫蘇，枳殼。右咬咀，水煎服。

㊟千金托裏散 治一切瘡腫，發背，疔瘡。

黃芪一兩半，厚朴，防風，桔梗，各二兩。連翹二兩二錢，木香不見火，沒藥，各三錢。乳香一錢，當歸

乳香， 殭蠶炒去絲，各二錢。 全蠍三錢湯泡七次， 辰砂研水飛， 雄黃， 穿山甲炙黃，各二錢半。 天龍四錢
酒炙去頭足， 川烏尖， 沒藥。 右各為細末，秤準分兩和勻，每服三分，赤砂糖調葱頭酒送下，取汗為度。

③勝金丹

治證同前

麝香， 白砒製各五分。 蟾酥一錢。 雄黃， 辰砂， 乳香， 沒藥， 血竭各錢半。 全蠍泡炙， 天龍去頭足炙，

穿山甲炙，各三錢。 殭蠶炙五錢。 右為細末和勻服法同前。

④奪命丹

治證同前

輕粉， 麝香， 白砒製各五分。 白礬煨研， 血竭各一錢。 蟾酥酒化， 銅綠， 寒水石煨， 乳香， 沒藥， 雄黃各二錢。 蝸牛二十一箇連殼。 右為末，先將蝸牛研爛如泥勻，和前藥為丸，如菉豆大，辰砂一錢為衣，如丸不就，加好酒打三五百下，每服二三丸，先用葱白三寸與病者嚼爛，吐於男左女右手心，將藥丸裹入葱白，用無灰酒三四熱送下，被蓋取汗為度，重者不過三服。

⑤內托羌活湯

羌活， 黃蘗酒洗，各二錢。 防風， 藁本， 連翹， 當歸各一錢。 肉桂三分， 甘草炙， 蒼朮， 陳皮各五分。 黃芪一錢五分。 右作一服，酒二大盞水一大盞煎至一盞，去滓熱服空心，以夾被蓋覆其癰，使藥行罷去之，一服愈。

⑥托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏，經絡不得伸越，熱伏榮中，聚而赤腫，痛不可忍，惡寒發熱，或相引

肢體疼痛。

麻黃去根節， 白芷， 當歸各二錢。 防風去蘆， 葛根各三錢。 升麻四錢， 炙草， 白芍各錢半。 人參， 蒼

朮各一錢。 右剉如麻豆大，每服秤一兩水二盞先煮麻黃令沸熱去沫，再下餘藥同煎至一盞，去滓大溫服，訖臥

升麻，大黃，各二兩。黃芩一兩半。枳實，麩炒，當歸，芍藥，甘草炙，各一兩。右咬咀，水煎食前服。

③孫真人單煮大黃湯 脈實沉而數，膏粱食肉之輩，大腑秘者，詳審用之。

錦文大黃酒洗去皮。右一味，剉如麻豆大，水煮服。

④宣毒散 治一切瘡毒，其功不可盡述。

大黃煨，白芷，各五錢。作一劑，水二鍾煎一鍾，食前服。

⑤內托散 治諸腫毒惡瘡，一服立愈。

大黃，牡蠣，各半兩。苦蕒二枚，甘草三錢。右剉，每服三錢，水一大碗，煎七分，去滓溫服。

⑥車螯散 治癰疽初發腫痛，或少年熱盛發背等，急宜宣毒利下，熱退為度。大人小兒，四季皆可服之。

紫背車螯一雙，鹽泥固濟，火煨通紅，置地上，出去火毒用。輕粉，甘草，各二錢。大黃五錢，黃芩，漏蘆去鬚，瓜根，各半兩。右為末，每服二錢，薄荷湯下，速利酒亦可。

⑦內消丸 實鑑 治瘡腫初生，及癰癢結核熱毒鬱滯，服之內消。

薄荷葉，皂角不蛀者，水煮至軟，二味煎濃膏。牽牛取頭末，各半斤。青皮，陳皮，各一兩。沉香半兩，廣朮

炮，京三稜炮，各三錢。右為末，入牽牛頭末，用煎膏和丸，如菜豆大，每服三十九丸，煎連翹湯送下，食後。

⑧神仙解毒萬病丸 一名追毒丸，一名玉樞丹，一名紫金錠，治一切毒及菰子鼠莽菌草金石，或喫

疫死牛馬河豚等毒，或時行瘟疫，山嵐瘴癘，急喉閉纏喉風，脾病黃腫赤眼，及衝冒寒暑熱毒上攻，或自縊或溺水，或打撲傷損，癰疽發背瘡腫湯火，或蛇蟲犬鼠所傷，或中邪狂走鬼胎鬼氣，並宜服。

半兩，川芎，白芷，芍藥，官桂，人參，甘草，各一兩。右為細末，每服三錢酒一大盞，煎三二沸，和滓溫服。

⑤托毒散 鬼遺

治癰疽初起高腫，發痛不定，喘息氣粗。

麻黃，甘草，官桂，川芎，羌活，石葦，龍膽草。

右九味等分為末，每服二

錢，水一大盞，薑三片，鹽少許同煎。

⑥聖濟射干湯

治癰疽發背諸瘡腫痛，脈洪實數者。

射干，犀角，升麻，元參，黃芩，麥門冬，大黃，各一兩。山梔半兩。右咬咀，每服五錢，加竹葉芒硝一錢，

以利為度。

⑦托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發，脈洪實數，腫甚欲作膿者，三服消盡。

川大黃，牡蠣，苦蕒根，皂角針，朴硝，連翹，各三錢。當歸，金銀花，各一兩。赤芍藥，黃芩，各一錢。

右為粗末，每半兩，水酒各半煎服。

⑧破棺丹

治諸熱腫，一切風熱瘡證，發熱多汗，大渴便秘，讞語結陽之證。

大黃二兩半，半生半熟，芒硝，甘草，各二兩。右為末，煉蜜丸，如彈子大，每服半丸，病重一九至二九，食後重便

入酒半盞化服，或白湯合酒化服。

⑨瀉心湯

治瘡毒癰腫，發躁，煩渴，脈實洪數者。

大黃四兩，黃連，山梔，漏蘆，澤蘭，連翹，黃芩，蘇木，各二兩。犀角一兩。右咬咀，每服三五錢，水煎服。

⑩清涼飲

治瘡瘍煩躁，飲冷熾痛，脈實大便秘結，小便赤澀。

大黃炒，赤芍藥，當歸，甘草，各二錢。右水煎服。

①一粒金丹。治一切惡瘡癰腫，無名腫毒。沉香，木香，乳香各五分。巴豆霜一錢半。各為細末，照秤分數和勻，用黑肥棗一箇半，去皮搗爛為丸，如芡實大，每服一丸，量人虛實，先呷水一口，行一次，胃氣壯實者，只可呷水三四口，不可太過，後用水一口送藥，下行盡數次，以米飲補之。

②威靈仙飲

生威靈仙不拘多少為末。每服一錢，空心溫酒調服，逐日微利為度。

③五香連翹湯

治諸瘡腫，初覺一二日便厥逆，咽喉塞，發寒熱。沉香，木香，麝香，丁香，連翹，射干，升麻，獨活，桑寄生，甘草炙，各一兩。乳香，木通，各二兩。

大黃一兩半。右咬咀，每服五錢，水一盞半，煎七分，溫服，取利。

④千金漏蘆湯

治癰疽丹疔惡肉，時行熱毒赤腫。漏蘆，連翹，黃芩，白薺，枳殼，升麻，粉草，麻黃，朴硝，各一兩。大黃一兩半。右除硝外，每服二錢，

水一盞，薑三片，薄荷三葉，同煎溫服，取利為度。

⑤防風通聖散

治時毒熱毒，便秘熱燥，若時毒饑饉之後，胃氣虧損者，須當審察，非大滿大實不用。防風，當歸，川芎，芍藥，大黃，芒硝，連翹，薄荷，麻黃，桔梗，石膏，黃芩，滑石，各一兩。白朮，

山梔，荊芥，各二錢五分。甘草二兩。右水煎服，或為末，白湯調下，仍量人虛實。

⑥中和湯

治瘡屬半陰半陽，似潰非潰，似腫非腫，此因元氣虛弱，失於補托所致。人參，陳皮，各二錢。黃芪，白朮，當歸，白芷，各一錢半。茯苓，川芎，皂角刺炒，乳香，沒藥，金銀

之。居家出入，不可無此藥，真濟世衛身之寶！

文蛤三兩，用淡紅黃色者搥碎洗淨，一名五倍子。山慈姑二兩，續隨子去殼研，以紙包壓去油，再研一兩，紅芽大

戟洗淨一兩五錢，麝香三錢研。右各另為細末，和勻，以糯米粥和合於木臼中杵千餘下，每料分作四十錠，於

端午、重陽、七夕合，如欲急用，辰日亦得，勿令婦人孝服不具足人及鷄犬之類見之。合宜珍重，否則無效。如癰疽

發背未破，用冷水磨塗痛處并服，良久覺痒立消。陰陽二毒傷寒，心悶狂語，胃膈壅滯，邪毒未發，及瘟疫山嵐瘴

氣，纏喉風，冷水入薄荷一葉同研下。急中顛邪，喝叫亂走，鬼胎鬼氣，並用暖無灰酒下。自縊或落水死，心頭暖者，及

驚死鬼迷死，未隔宿者，並冷水磨灌下。蛇犬蜈蚣傷，並用冷水磨塗傷處，如腹脹或迷悶者，更宜服之。諸般瘡疾，

不問新久，臨發時，煎桃柳枝湯下。小兒急慢驚風，五疳八痢，蜜水薄荷一葉同磨下。牙關緊急，磨一錠，外塗內服，

量大小用之。牙痛酒磨塗及含少許吞下。湯火傷，東流水磨塗傷處。打撲傷損，炒松節酒下。年深日久，頭痛太

陽疼，用酒入薄荷磨紙花貼太陽穴上并服之。諸般癩疾，口眼歪斜，眼目掣眩，夜多唾涎，言語謇澀，卒中風口噤，

牙關緊急，筋脈攣縮，骨節風腫，手脚疼痛，行步艱難，一應風氣疼痛，並用酒磨下有孕婦人不可服。

⑤郭氏瑞效丸 治腸癰、胃癰、內積，兼治男子婦人積聚證。

當歸，京三稜，檳榔，木鼈，山甲炒，各一兩。牡蠣為末炒，山甲都用，連翹，枳殼，各一兩半。礪砂焙，

琥珀，各一兩。巴豆二十一粒去油，麝香少許。右為末，酒糊為丸，桐子大，每服十九丸至三十九丸，溫酒下，臨臥

再服。如利動臟腑，減丸數。大小便有膿血出者，却用別藥調治之。

⑥萬靈奪命丹 郭氏 又名延壽濟世膏，治一切瘡腫疔疽，初起脈沉實，及服汗藥後，毒氣在裏不盡

者，宜此下之。

朱砂，各二錢半。雄黃，明礬生用，楓香，各二錢。赤石脂，黃丹飛過，琥珀，真輕粉，各一錢五分。

疾必多怒但服香附進食寬氣自有效。

⑤遠志酒 治一切癰疽發背癰毒惡候，浸有死血陰毒在中，則不痛，傳之即痛；有憂怒等氣積而內攻，則痛不可忍，傳之即不痛，或蘊熱在內，熱逼人手不可近，傳之必清涼，或氣虛血弱潰而不斂，若七情內鬱，治之必愈。

遠志不以多少泔浸，搥去心乾爲末，酒一盞，調末三錢，澄清飲之，以滓傳於患處。

⑥五香散 升降諸氣，宣利三焦，疎導壅滯，發散邪熱，治陰陽之氣鬱結不消，諸熱蘊毒，腫痛結核，或似癰癤而非，使人頭痛惡心，寒熱氣急。

木香，丁香，沉香，乳香，藿香各等分。右剉散，每服三錢，水一盞半煎，食後溫服。

⑦忍冬酒 初發便當服此，或貧乏中，或居鄉僻田，夫野老百發百中。

忍冬藤生取一把，以葉入砂盆研爛，入酒少許，調和得所，塗傅四圍，中心留一口，又取五兩用木槌搗碎，不犯鐵器。甘草生剉一兩，右二味入砂瓶內，用水二碗，文武火煎至一碗，入好酒一大碗，煎十數沸，去渣分爲三服，一日連夜進盡，病勢重，一日夜可二劑。

⑧生地黃散 治發癰腫熱毒疼痛，心神煩悶。

生地黃二兩，川大黃剉碎炒，川升麻，黃芩，地骨皮，當歸剉微炒，木通，赤芍藥，黃芪，元參，甘草生，各一兩，赤茯苓一兩半。右爲散，每服四錢，水一中盞，入竹葉二七片，煎至六分，去滓不拘時溫服。

⑨阿膠飲子 精要

明阿膠炒如珠，粉草各一兩，橘紅半兩。右咬咀，分作三服，以水一盞，煎七分，去滓溫服。

花 甘草節各一錢。 右水酒各半煎服。

⑤內托散 一名護心散，一日至三日內宜連進十數服。

右研令勻，每服二錢至三

錢。濃煎甘草湯調下，時時細呷，要藥常在胃脘間。若毒衝心，有嘔逆之證，大宜服此。如有寒而嘔逆，不宜服此，當用辛熱。

⑥國老膏 治一切癰疽，能消腫逐毒，使毒不內攻，其效不可具述。

甘草大者二斤。右搥碎，河水浸一宿，揉令漿汁濃，去盡筋滓，再用絹濾過，銀石器內慢火熬成膏，用器收之。每服一二匙，無灰酒，或白湯亦可，曾服燥藥丹劑者，亦解之。本事方：每甘草一斤分作三服，溫酒調下。今云一二匙，恐力少也。

⑦解毒散 治癰疽始覺便宜服。

犀角屑，升麻，砒石，赤芍，木通，各一兩到。 石膏二兩，元參，麥冬去心，甘草生剉，各半兩。 右每服

四錢，水一中盞，煎至六分，去滓溫服，無時。

⑧清心內固金粉散 又名金花散。

辰砂另研，白茯苓，人參，甘草，各七錢半。 菡豆粉四兩研，白豆蔻仁，砒石另研，各半兩。 雄黃研，腦

子研，麝香研，各二錢半。 右以參苓白豆蔻諸藥為末，入研藥令勻，每服一錢半，蜜湯調下，無時候。此藥專治惡

瘡熱盛，厥痛，作渴煩躁，此藥解毒。

⑨內追毒丹 清心解毒散。

大朱砂，雄黃，生犀角，琥珀已上並別細研，黑角沉香，各五錢。 麝香一錢。 右為末，煉蜜丸，梧桐子大，每

綿黃芪，皂角刺，揀紅紫者剉，炒黃色，各一兩。甘草半兩。細末，每服五錢，酒一盞，乳香一塊，煎七分，去滓服。

⑤黃芪四物湯

人參，黃芪，白朮，茯苓，芍藥，甘草，生薑，當歸，地黃，川芎。右多加金銀花，水煎服。

⑥內固黃芪丸 本事

人參，各半兩。右為末，入真生龍腦一錢，研細，生藕汁和丸，菉豆大，每服三十九，溫熱水下，加至四十九，日三服。

⑦回陽湯

治脾腎虛寒，瘡屬純陰，或藥損元氣，不腫痛，不腐潰，或腹痛泄瀉，嘔吐厥逆，或陽氣脫陷等證。

乾薑炮，大附子炮，各二錢。人參，白朮，黃芪，各三錢。當歸，陳皮，甘草炙，各二錢。柴胡，升麻，各五分。右酒水煎服，不應，薑附倍之，敷藥用回陽玉龍膏。

⑧清熱消毒散

治一切癰疽陽證，腫痛發熱作渴。山梔炒，連翹，當歸，各一錢。川芎，芍藥炒，生地黃，各一錢半。金銀花二錢。甘草八分。右

水煎服。

⑨黃連消毒散

治腦疽背疽，腫焮疼痛，或麻木。黃連製，羌活，各一分。黃芩，黃蘗，各半錢。生地黃，知母製，獨活，防風，當歸尾，連翹，各四分。葶

⑩黃連解毒湯

治瘡瘍焮痛，煩躁飲冷，脈洪數或發狂言。桔梗，各半錢。黃芪，蘇木，陳皮，澤瀉，各二分。人參，甘草，各三分。右水煎服。

⑤牛膠飲 截癰疽惡瘡發險處，服之，使毒氣不攻於內。截癰疽惡瘡發險處，服之，使毒氣不攻於內。隨意飲，能飲者以醉為度。此方活人甚多。

牛膠通明者四兩，用酒一椀入膠內，重湯煮，鎔透攪勻，傾出更浸酒，隨意飲，能飲者以醉為度。此方活人甚多。

⑥黃礬丸 服過一兩已上，無不取效，最止疼痛，不傷臟腑，活人不可勝數。

白礬一兩，黃蠟半兩。右和丸，如桐子大，每服十九丸，漸加至五十九丸，溫酒送下，如未破即消，已破即合，一日服百粒，則有效，能防毒氣內攻，尤能護膜，始終須服半斤，瘡愈後服之尤佳。

⑦托裏消毒散 治胃氣虛弱，或因剋伐不能潰散，服之未成即消，已成即潰，腐肉自去，新肉自生。若腐肉既潰，而新肉不能收斂，屬氣虛者，四君子湯為主，屬血虛者，四物湯為主，氣血俱虛者，十全大補湯為主，並忌寒涼消毒之劑。

補湯為主，並忌寒涼消毒之劑。川芎，白朮炒，白茯苓各一錢。金銀花，白芷各七分。甘

人參，黃芪鹽水拌炒，當歸酒拌，芍藥炒，黃芪各五分。右水煎服。草炙，連薊各五分。右水煎服。

⑧托裏散 治瘡瘍因氣血虛不能起發，腐潰收斂及惡寒發熱者，宜用此補托。其屬六淫七情及諸經錯雜之邪而為患者，當各審其因而參以主治之劑。其屬胃氣虛弱者，當以六君子湯為主。

人參氣虛者多用之，黃芪炒各二錢。白朮炒，陳皮，當歸，熟地黃自製，白芍藥酒炒，茯苓各一錢半。

右水煎服。散毒飲子 治癰疽初覺腫結未成者，可以消散。

黃芪二兩，甘草炙，天羅生，山藥炒各一兩。鬼腰帶葉半兩，生竹籬陰濕石岸絡石而生者好，絡木者無用。

其藤柔細兩葉相對形生三角。右為粗末，每服三錢，水一盞，煎至七分，入酒三盞，同煎一二沸，去渣溫服。

化毒藥才內打青 凡患癰疽發背聖口是打打等本下利與各藥之類此藥前今

乳香，穿山甲，白芨，知母，貝母，半夏，金銀花，皂角刺，天花粉，各一錢。右咬咀，用無灰酒一椀煎半椀，去粗作一服溫進，不宜加減。將粗擣爛，加秋過芙蓉葉，細末一兩，以蜜水潤過一宿自消，不必用第二服。忌發物大效。

⑤仙方活命飲 又名真人活命飲，治一切瘡瘍，未成膿者內消，已成膿者即潰，又止痛消毒之聖藥也。

滴乳香研，防風，白芷，貝母，赤芍藥，當歸尾，明沒藥研，皂角刺炒，天花粉，甘草節，山甲炮，各一錢。陳皮，金銀花，各三錢。在背俞皂角刺為君，在腹募白芷為君，在胃次加苦蕒仁二錢，在四肢金銀花為君。如疔瘡，加紫河車草根三錢，如無亦可。右為粗末，大者四兩，小者二兩，作一劑，無灰酒十茶鍾，瘡小，五茶鍾入有嘴瓶內，以厚紙封口，勿令泄氣，煎至三大鍾，去粗作三次服，接連不斷，隨瘡上下服，能飲酒者，服藥後再飲三五盃。此藥並無酒氣，不動臟腑，不傷氣血，忌酸薄酒鐵器。服後，側睡覺痛定回生，神功浩大，不可臆度。

⑥保安方 潔古 治瘡托裏，或已成者速潰。

苦蕒新者一枚，去皮火焙，沒藥通明者一錢研，金銀花，甘草，生薑，各半兩。右為細末，用好無灰酒三升，於銀石器內煎至一升，分作三盞，三次飲盡，病微者只一服。如服托裏藥，不能發散，又作瘡者，用此。

⑦祕方托裏散 治一應瘡毒，始終常服，不致內陷。

苦蕒大者一枚，杵，當歸酒拌，黃芪鹽水拌炒，甘草，白芍藥，各一兩半。皂角刺炒，金銀花，天花粉，熟地用生者酒拌入瓷器，蒸半日，各一兩。用無灰酒五茶鍾，和藥五兩，入瓷器內，厚紙封口，再用油紙重封，置湯

黃芩，黃蘗炒，黃連炒，山梔各一錢半。右水煎熱服。

㊟排膿湯 仲景

甘草二兩，桔梗三兩，生薑一兩，大棗十枚。右四味，以水三升，煮取一升，溫服五合，日再服。

㊟排膿散

枳實十六枚，芍藥一兩半，桔梗五錢。右三味，杵為散，取雞子黃一枚，以藥散與雞子黃相等，揉和煎如薄粥，溫服一升，即瘥。

㊟連翹飲 治癰腫瘡癤排膿。

連翹，防風去叉各三兩，薺苳，白芍藥，黃芩去黑心，元參各二兩。白茯苓去黑皮，人參，桔梗剉炒，前胡去蘆，甘草炙各一兩，黃芪生四兩，桑根白皮剉一兩半。搗篩，每服五錢，水一盞半，煎八分，去滓溫服，日二。

㊟柞木飲子 續要

乾柞木葉四兩半，乾荷葉中心蒂，乾萱草根，甘草節，地榆各一兩。右細剉，每服半兩，水二碗，煎一碗，分作二服，早晚各一服，未成者自消，潰者自乾。其荷蒂去惡血，萱根下水解毒利胃膈，柞木有芒刺，能驅逐地榆主下焦血病，輕小證候，或可倚仗。

㊟車螯散

車螯一兩，煨通赤，生甘草二錢半，輕粉五分。為細末，每服四錢，濃煎苦蕒酒調，五更服，轉下惡物為度。未知再用，效在五香之上。

謂其餉候只用酒下或麥門冬去心煎湯亦可任輕粉耳

木通，瞿麥，荆芥，薄荷，白芷，天花粉，甘草，赤芍藥，麥門冬去心，生乾地黃，山梔子，車前子，連翹，各等分。右剉每服二錢，燈心生地黃煎，熱潮加淡竹葉煎，溫服，上膈食前，下膈空心。老人氣虛者，宜加當歸、羌活。

⑤加味十奇散 主內護，治癰發已成未成，服內消藥三五日，不效，或年四十已上，氣血衰弱，成者速潰，未成者速散，服至瘡口合而止，內能固濟，去舊生新，又名固壘元帥。

當歸酒浸，桂心不見火，人參，土芎，桔梗，香白芷，防風去蘆，厚朴去粗皮薑汁炒，甘草五文，乳香，沒藥并別研。右件藥各等分，研為末，每服二錢，酒調日三服，病愈而止。不飲者，麥門冬去心煎湯，或木香湯。

④豨薟散 治癰疽發背及一切癰毒等證如神。豨薟草，其葉長如牛舌，其氣如豬臭者，小薊根，五爪龍即五藤，生大蒜，右四物各等分，細研，用酒和勻濾去粗，服一碗，得大汗通身而愈。

③圍藥 五倍子炒一兩，天南星，草烏頭，黃蘗，白芨，各二兩。右為細末，調如糊，隨血圍匝如牆壁，可移險處於不險處如神。

②敷藥 白敵，白芷，天南星，白芨，貝母，各等分。右為末，水調傅，外用圍藥，束定，內用傅藥提起，制之有理。

①將軍鐵箍膏 治諸惡毒瘡紅腫突起，用藥箍瘡四圍，不令滋蔓，走疰毒氣。

鍋內煮，用蓋覆之，煮至藥香，取出分服，直至瘡愈。

⊕秘方拔毒散 治一切癰疽腫毒，其功不可盡述。

乳香，沒藥，穿山甲炮，當歸，木鼈子，連翹，各一錢。苦蕒實八錢，甘草炙五分。牙皂角炒，貝母，各七分。

大黃生熟，各一錢半。忍冬藤二錢。作一劑，用酒水各一鍾，煎至一鍾，食前服。

⊕歸芪湯 治癰疽無頭，但腫痛。

黃芪，當歸，苦蕒仁，皂角刺，金銀花，甘草，各一錢。右咬咀，水一鍾半，煎八分，去滓入乳香酒，再煎服。

⊕榮衛返魂湯 又名通順散，又名何首烏散。

何首烏不犯鐵，當歸，木通去皮尖，赤芍炒，白芷不見火，茴香炒，土烏藥炒，甘草，陳枳殼麵炒，若惡心加薑汁炒。右方止此九味，各等分，水酒湯使隨證用之，水酒相半，亦可。惟流注加獨活，每服四錢，病在上，食後服，病在下，食前服。

⊕龍虎交加散 治發背、癰疽、發腦、發鬚、發髻，又治腦虛、頭運、風濕之證。

南木香剉碎，用紙墊鍋焙乾，研為細末，鸞粟殼去頂穰筋剉，焙乾為細末，甘草用濕紙裹煨，焙乾為細末，吳白芷麩裏煨去麩，焙乾為細末，川芎濕紙裏煨，焙乾為細末。右件藥末，各另包收，看瘡加減用之。

⊕如神托裏散 治發背等瘡初起，又治疔瘡，并一切腫毒及發散傷寒。

蒼耳草根，兔耳草根，金銀藤用花亦可，五味子根，各等分。右咬咀，每服五錢，用生白酒二盞煎至七分，去粗服，臥蓋取微汗，查再煎。

⊕前鋒正將 治一切癰疽，不問發背發肩，作舉疼痛，其效如神。

荊芥，薄荷，山蜈蚣，老公鬚，天花粉，菇片，菇蕒，敗荷心，川白芷，赤芍藥，豬牙皂角切炒已上

荊芥，薄荷，山蜈蚣，老公鬚，天花粉，菇片，菇蕒，敗荷心，川白芷，赤芍藥，豬牙皂角切炒已上

荊芥，薄荷，山蜈蚣，老公鬚，天花粉，菇片，菇蕒，敗荷心，川白芷，赤芍藥，豬牙皂角切炒已上

荊芥，薄荷，山蜈蚣，老公鬚，天花粉，菇片，菇蕒，敗荷心，川白芷，赤芍藥，豬牙皂角切炒已上

荊芥，薄荷，山蜈蚣，老公鬚，天花粉，菇片，菇蕒，敗荷心，川白芷，赤芍藥，豬牙皂角切炒已上

南星 大黃 草烏 白蘘各半兩 蚌粉 大桂皮 赤小豆各一兩 右為末取芭蕉頭研耳 治諸毒四脚力乳沒尤妙。

⑤雄黃散 郭氏 治癰疽發背，紫暈疼痛不止。

粟米小粉三兩炒，草烏頭，南星，絡石，百合各一兩。白芨二兩，乳香，沒藥，雄黃，黃丹各半兩。右為極細末，溫水調敷之。

⑥鐵井欄 治無名腫毒，或背疽腫圍。

芙蓉葉重陽前收研末，蒼耳端午前收燒灰存性。右同研細，以蜜水調敷之。

⑦烏龍膏 一名烏金散，治一切腫毒癰疽收赤暈。

木鼈子去殼切，半夏各二兩。小粉四兩，草烏頭半兩。右於鐵銚內慢火炒，令轉焦為細末，出火毒再研，以

水調稀稠得所敷瘡四圍中留頂出毒氣，或用酢調亦得。

⑧宜毒散 初發或灸後敷貼，消腫收暈圍聚。

露蜂房三兩炒焦，南星，赤小豆各半兩。小米一合，生草烏二錢半，生白礬半錢。右為細末，用淡酢調

塗四畔，乾即再上。

⑨拔毒散 癰疽腫結通用，能散能潰。

南星上等大白者一兩，草烏頭，白芷各半兩。木鼈子仁一箇研。右為細末，分兩次，法酢入蜜調敷紗貼之。

⑩獨毒散 治癰疽腫毒未結則散，已結則潰，去風排膿。

天南星一兩，貝母七錢半，白芷，赤小豆，直殭蠶炒各半兩。雄黃二錢。右為細末，初用酢調敷，後用蜜

水調敷。

鹽霜白梅，南星，大黃，蒼耳根，各一兩。白芨，白蘞，防風，川烏頭，各半兩。草烏頭，雄黃，各三錢。

右為末，先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏，如乾入酢調得所，於瘡四圍用藥作鐵箍塗上，止留瘡高突處，如藥乾以雞羽蘸水掃之，日換二三次大妙。

草烏，貝母，[㊟]又方，治一切癰疽腫毒。右為細末，酢調搽四圍，留頭出毒，如乾以酢潤之。

貝母去心，白芷，蒼耳草灰，酢拌曬乾，各二兩。或加龍骨二錢尤妙。右為細末，水調或香油調貼瘡上

芙蓉，豬卷皮，木鼈子，各四兩。白芷，黃蘗，寒水石，赤豆，白蘞，貝母，各二兩。大黃，紫荊皮，白芨，真地青，羌活去蘆，各一兩。防風半兩。右為末，涼水調圍癰四畔，如肉脆去白芨白蘞，加生地黃，地榆，用芭蕉油調傅，熱甚者用三消散。

[㊟]大鐵箍散。水黃散，圍腫毒。犀角屑，大黃，白芨，草烏皮尖，白蘞，麝香，朴硝，各等分。右為細末，蜜酢調薄，攤油紙上，稍乾揭下，再添潤濕，貼之即消。

[㊟]外用潰毒藥，治諸腫毒堅硬不消。升麻，葛根，鼠黏子，地骨皮，金銀花，黃花地丁，甘草生，各等分。右為粗末，每用五七錢，水一升煎十沸，於腫處四畔熱用，冷則再煖。

[㊟]圍腫方

沸，於腫處四畔熱用，冷則再煖。

⑤萬應針頭丸 治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒即愈。

麝香二錢，血竭如蠟者用，散者不用，輕粉，蟾酥，舌試辣者，硃砂各三錢。片腦一錢，蜈蚣一對全用。右為極細末，煉蜜和丸為劑，如瘡有頭者，用針頭挑破，微有血出，將藥一黍米大放挑開瘡內，上用紙花周圍唾津濕貼瘡上，不過時刻即愈。如兩腋見無頭瘡，即是暗疔，即將兩手虎口內白土紋用針挑破，如前法用藥封蓋。忌雞鵝酒濕麪一切發熱之物。

⑥萬槌青雲膏 治諸般癰腫，未成膿者貼散，已成膿者拔毒追膿，腹中痞塊貼塊上，瘡疾貼大椎及身柱，其效如神。

白松香淨者一斤，輕粉二錢，蓖麻子去殼，杏仁去皮，各三百枚。乳香，沒藥，各一兩五錢。銅青三兩。右共作一處用鐵槌木臼於日中搗成膏，如燥少加香油杵之，或用石臼木杵搗亦可用磁器盛，緋帛攤貼湯中燉不見火。

⑦四虎散 治發背初生，筋脈緊急不舒。

附子生去皮一兩，天南星，半夏，狼毒各半兩。一方無附子，有草烏各等分，右為末，熱酒調成膏攤上腫處，以熟絹縛定，覺患處如火燒不妨。

⑧回陽玉龍膏

草烏頭三兩炒，軍薑二兩煨，白芷不見火，南星煨，赤芍藥各一兩炒，肉桂半兩不見火。此方治陰發背，冷流注，鼓椎風，久損痛冷痺風濕，諸腳氣冷腫無紅赤者，冷腫不痛者，足頑麻痺，婦人冷血風，諸陰證之第一藥也，用熱酒調塗。

⑨洪寶丹 一名金丹，又名寸金，又名四黃散。

㊟退毒散 癰腫通用。

木籠子去油，天南星，半夏生，赤小豆，白芷，草烏連皮尖，各等分。右為細末，硬則法酢調敷，熱熨，則蜜

水調敷。

㊟神功妙貼散 塗敷癰疽暈內，使膿血化為水出，收暈斂毒。

大南星圓白者，蓖麻子仁，各四錢。半夏生，白芷梢，五倍子，薑黃，貝母，白芨，各三錢。沒藥，乳香，各二錢。花藥石散二貼。右為細末，夾和井水，入蜜調敷，瘡色黯晦，薑汁調敷，從暈邊抹收入裏，留中間如錢大，貼膏藥。若瘡開大，全用紗攤藥，以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片，如瘡勢，先貼藥上，然後貼瘡，久年蓬仰上竹葉亦得，竹葉出水藉藥以行之。凡敷藥須是細末則不痛。

㊟特異萬靈散 治癰疽發背腫毒等患神妙。

軟石膏燒通紅，罌覆在泥地上一宿，大白南星，赤小豆，草烏連皮尖，各半兩。乳香二錢，別研。右為細末，蜜水調成膏，從外抹收入，留最高處如錢，勿敷，如瘡已破，切忌藥入瘡口，恐痛斂毒排膿，不致潰爛屢效。

㊟又方 治冷癰青硬，無頭陰毒，并瘡疥毒瘡，皆效。

生鐵銹，輕粉，各二錢。白松香一兩五錢，麝香少許。先將鐵銹松香為細末，入銚內，加麻油一兩，慢火煎數沸，離火待熱少退，入輕粉麝香末攪勻，即為膏矣，收貯，量瘡大小，攤貼患處。

㊟隔皮取膿法 治諸般腫毒。

驢蹄甲細切炒，蕎麥麪，各一兩。白鹽半兩，草烏去皮四錢。右為末，水調作餅子，慢火炙黃，出火毒，研米酢調成膏，用白紙攤貼患處，毒自毛竅而出，其腫自退。

㊟雄黃散 治癰疽赤腫疼痛，未得膿潰，貼之成膿。

白芷，木香，青礬，桂心，各半

川大黃生用研末，杏仁去皮尖研，鹽花各三分。右爲細末，研令勻，以新汲水調和稀稠得所，旋即塗腫上，乾即易之。

③水澄膏郭氏 治風熱腫毒，赤紅色，攻焮疼痛不止。

白芨，白蘞，各四錢。鬱金一對，大黃，黃蘗，黃藥子，榆皮，各七錢五分。乳香，沒藥，雄黃，各半兩。

右爲細末，用新汲水一碗，藥末不以多少澄於水內，藥定去水，敷於腫處，上用白紙封之，用雞翎掠此水濕潤。

④二黃散 治一切腫毒。

黃蘗，大黃，各等分。右爲末，用酢調搽，如乾，以水潤之。

⑤揭毒散

大黃一兩半，白芨一兩，硃砂二兩。右爲末，用井水調搽，如乾再搽。

⑥三消散 退極熱證，赤腫焮開者。

硃砂，焰硝，大黃，梔子炒黑色，寒水石，南星，各等分。右爲細末，生地黃汁調塗貼；芙蓉葉搗汁調亦可。

⑦四面楚歌 敷諸般疽發腫，赤痛不可忍，未成則散，已成則破，至瘡口合而止。

荊芥和根剉碎，赤芍藥，大蘗根，土當歸，山大黃，土白芷，天南星圓白者，赤小豆，商陸根剉片子

焙，白芨，赤蘞，白蘞，草烏，寒水石煨或炒各等分。右爲末，生地黃汁調角四畔，或苦蘗根汁，腫用商陸

根研汁，末潰則滿塗上，或有尖起處，則留出瘡口。

⑧水師晶明 治諸發已破未破，皆洗，如成膿潰爛，最要洗淨，去故肉生新肉，洗後淨乾，再用角貼搽

藥，一日一次。

天花粉三兩， 薑黃， 白芷各一兩。 赤芍藥二兩。 右為末，茶酒湯使隨證熱塗。

①金黃散 貼癰毒令內消。

白芷， 白芨， 白蘞。 右等分為細末，新汲水調敷。

②天花青露散 罨圍一切腫毒。

白芨， 白蘞， 白薇， 白芷， 白蘗皮， 砂硝， 青黛， 黃蘗， 老龍骨各一兩。 大黃四兩， 天花粉， 青露各三兩。 右為細末，酢蜜調勻，如疽毒未成，則當頭罨退，若已成四面圍之，中留頭，用替針膏貼之。

③消腫散 圍罨腫毒一切瘡癤並治。

大黃， 水仙子， 山藥， 苧根， 青露， 小赤豆， 寒水石， 水薑， 香蛤粉， 花藥石。 右將前藥搗和，如乾加酢蜜調勻，如疽毒未成，則當頭罨退，若已成四面圍之，留一頭用替針膏貼之。

④神護膏 圍罨一切腫毒。

小赤豆， 黃皮， 白蘞， 天花粉， 天南星， 白芷各等分。 右為末，陰用米酢與蜜水調，陽用商陸根，亦用芭蕉油。此是邵色婆黃金散加黃皮為主。

⑤水澄膏 祕方圍敷腫毒。

鬱金， 白蘞， 白芨， 五倍子各一兩。 乳香， 雄黃各五錢。 右為細末，水調敷，如熱極者，用臘水尤妙。

⑥五金膏 一名葵花散。

黃葵花七朵， 川連二錢去鬚， 山梔三箇肥者， 黃蘗五錢， 川鬱金三錢。 右為末，井華水調成膏傅。此藥性急，宜速打之。

⑦消水膏

治癰疽及一切毒腫，堅硬腫痛攻衝，四畔掀腫，抽熱毒散腫氣。 右為細末，用薑薑菜取自然汁，入蜜少許，相和，調藥。

替針丁香丸

草烏尖， 硃砂， 白丁香堅者。 右為末， 酸酢調點， 將破者令速潰， 若急則無如刀， 快蟻針一法亦妙， 見後。

托裏溫中湯， 治瘡為寒變而內陷者， 膿出清稀， 皮膚涼， 心下痞滿， 腸鳴切痛， 大便微澹， 食則嘔氣短促， 呃逆不絕， 不得安臥， 時有昏憤。

丁香， 陳皮， 沉香， 茴香， 益智仁， 各一錢。 木香一錢半， 黑附子炮去皮臍四錢， 羌活， 乾薑炮， 各三錢。 甘草炙二錢。

加味十全湯， 治癰疽潰後， 補氣血， 進飲食。

黃芪蒸， 地黃蒸， 當歸， 川芎， 人參， 茯苓， 芍藥炒， 白朮， 陳皮， 各一兩。 粉草炙， 桂心， 五味子， 各半兩。 烏藥七錢。 右咬咀， 每服一兩， 用水一碗， 生薑五片， 棗二枚， 同煎， 分作二服， 留滓曬乾為末服之。 丹溪云： 加味十全湯， 須看年之老壯， 資之強弱， 證之緩急， 時之寒熱， 加減用之。

補中益氣湯， 治瘡瘍之人， 元氣不足， 四肢倦怠， 口乾發熱， 飲食無味， 或飲食失節， 或勞倦身熱， 脈洪大而無力， 或頭痛惡寒， 自汗， 或氣高而喘， 身熱而煩。

黃芪炙一錢五分， 甘草炙， 人參， 當歸酒拌， 白朮炒， 各一錢。 升麻， 柴胡， 陳皮， 各三分。 作一劑， 水二鍾， 薑三片， 棗二枚， 煎一鍾， 空心服。

人參養榮湯， 治潰瘍發熱， 或惡寒， 或四肢倦怠， 肌肉消瘦， 面色痿黃， 吸吸短氣， 飲食無味， 不能收斂， 或氣血原不足， 不能收斂， 若大瘡愈後， 多服之， 不變他病。

白芍藥一錢半， 人參， 陳皮， 黃芪蜜炙， 桂心， 當歸酒拌， 白朮， 甘草炙， 各一錢。 熟地黃酒拌， 五味

大麩皮，澤蘭，莽草，荊芥，赤芍，山大黃，土白芷，土當歸，獨活，各等分。右剉粗散，用水一斗，入葱
白大椒橘葉同煎，熏洗，如已爛，入猪蹄下膝爪骨肉煎，可免乾痛，洗淨為度。

⑤ 硃砂膏 治癰疽腫毒，并治癩癧點落疣痣等。 黃丹半斤生用， 礬一斤淋水五碗， 右四味，研

礬砂生用一錢， 石礦灰一兩炒黃色， 白丁香三錢炒黃色， 黃丹半斤生用， 礬一斤淋水五碗。 右四味，研
為極細末，次將礬水煎作一碗，成膏待冷，以前末入膏和勻，藏磁器中，一應毒物，以此膏點之。白丁香即麻雀兒屎
用堅夫者，不用輒頹者。

⑥ 六灰膏 治發背、疔瘡、癰子、腫毒、癩瘡、痔瘡、瘰子、疣子，其功用與硃砂膏同也。

灰莧，桑木，棗木，蕎麥科，茄科，各燒為灰。 石礦灰研細。 右件多少不妨，和勻湯泡水淋，淋下之水，煎成
膏如糊，裝磁器中，一應毒物，以膏點之。若點癩瘡痔瘡，待爛去少許，再點之，再爛去如是漸漸點去。

⑦ 援生膏 治諸般惡瘡，及癩癧鼠瘡，纔起者，點破即愈。 右件俱為極細末，再用蕎麥

血竭一錢，蟾酥，輕粉，各三錢。 麝香五分， 雄黃五錢， 乳香， 沒藥，各一錢。 右件俱為極細末，再用蕎麥
糶灰，或真炭灰一斗三升，淋灰湯八九盃，用栗柴或桑柴文武火煎作三碗，取一碗收留，將二碗盛於好磁器內，候
溫將藥末入灰湯內，用鐵瓢或桑柳枝右攪，又用好細石灰一升入藥灰湯攪勻，取出候冷，過宿盛於小白磁罐內。

凡遇諸惡瘡，點在當頭，一日二次，次日又一次，瘡頭食破約五分，血水出為妙，恐日久藥乾，將前收留灰湯和用。

⑧ 替針丸 治癰疽已潰未破，或破後膿出不快者。 右灰藥汁內種糯米十四粒，其法用石灰五升，爐灰三升，以水五升，淋取

白丁香， 硃砂， 沒藥， 乳香，各一字。 石灰藥汁內種糯米十四粒，其法用石灰五升，爐灰三升，以水五升，淋取
清汁，入大鍋內熬濃汁，至三二升，用瓦器盛貯。 臨時時，以小青盞盛取半盞濃汁，却用皮紙貼蓋中濃汁面上安定，
然後取糯米十四粒，種在皮紙面上一宿，即是。 右同為細末，糯米飯丸，如麥粒大，每用一粒，未破用津貼瘡頭薄處，

或心脾作痛，自汗盜汗，或肢體腫痛，大便不調，或婦人經候不准，晡熱內熱，或脣瘡流注等證，不能消散潰斂。

白朮，白茯苓，黃芪炒，當歸，龍眼肉，遠志肉，人參，酸棗仁，炒各一錢。木香五分，甘草炙三分。右薑棗水煎服。

⑤黃芪人參湯 治諸瘡破後，食少無睡，及有虛熱，穢氣所觸者。

黃芪二錢，人參，白朮，麥門冬，蒼朮，陳皮，升麻，五味子，當歸身，甘草，各一錢。黃藥炒四分，炒麴五分。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食遠服。

⑥托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛，瘡口不斂，晡熱內熱，寒熱往來，婦人諸瘡，經候不調，小便頻數，大便不實等證。

當歸，黃芪炙，人參，熟地黃，川芎，芍藥，各一錢。柴胡，甘草，各五分。右水煎服。

⑦人參散 治癰疽內虛不足。

人參，白朮，上白茯苓，枸杞子，各一兩。熟地黃，黃芪剉，各二兩。桂心，白芍藥，當歸微炒，甘草炙，各半兩。右剉碎，每服四錢，水一中盞，入生薑半分，棗三枚，煎至六分，去滓不拘時溫服。

⑧麥門冬湯 治癰疽潰後，膿水不絕。

麥門冬去心，黃芪剉，五味子炒，人參去蘆，白茯苓去黑皮，官桂去粗皮，當歸切焙，遠志去心，芎藭，各一兩。甘草炙七錢半。右咬咀，每服五錢，水一盞半，入生薑半分，擘碎，大棗二枚，擘破，同煎至一盞，去滓空心溫服。

子炒杵， 茯苓，各七分半。 遠志去心炒五分。 作一劑，水二鍾，薑三片，棗一枚，煎八分，食前服。

④四君子湯 治脾胃虛弱，或因剋伐腫痛不散，潰斂不能，宜用此以補脾胃，諸證自愈。若誤用攻毒，七惡隨至，脾胃虛弱，飲食少思，或食而難化，或欲作嘔，或大便不實，若脾胃氣虛，瘡口出血，吐血，便血，尤宜用之，蓋氣能攝血故也。凡氣血俱虛之證，宜於前湯但加當歸脾胃既旺，飲食自進，陰血自生。若用四物沉陰之劑，脾胃復傷，諸證蜂起，若命門火衰而脾土虛寒，必用八味丸以補土母。

人參， 茯苓， 白朮，各二錢。 甘草炙一錢。 右薑棗水煎服。

⑤六君子湯 治脾胃虛弱，或寒涼剋伐，腫痛不消，或不潰斂，宜服此湯，以壯營氣，諸證自愈。

即四君子湯，加陳皮半夏。

⑥異功散 治脾胃虛弱，飲食少思。

即四君子湯加陳皮。

⑦四物湯 治血虛發熱，或因失血，或因剋伐，或因潰後致晡熱內熱，煩躁不安，皆宜服之。經云：血生於脾，若脾虛不能生血者，宜用四君子湯，加當歸酒炒，白朮以補脾。

熟地黃， 當歸，各三錢。 芍藥二錢。 川芎一錢半。 右水煎服。

⑧八珍湯 調和榮衛，順理陰陽，滋養血氣，進美飲食，退虛熱，此氣血虛之大藥也。

當歸酒拌， 川芎， 芍藥炒， 熟地黃酒拌， 人參， 白朮炒， 茯苓，各一錢。 甘草炒五分。 作一劑，水二鍾，薑

三片，棗二枚，煎八分，食前服。

⑨十全大補湯 治潰瘍發熱，或惡寒，或作痛，或膿多或清，或自汗盜汗，及流注、癰癧、便毒，久不作膿，

或成膿而不收，或血氣不足之人，皆腫未成膿者，宜加枳殼、香附、連翹服之，自消。

全無此脈虛血虛也老誤服白虎湯必死宜此主之

黃芪炙一兩，當歸酒拌三錢。作一劑，水一鍾半，煎六分服。

⑤沉香散 治癰膿潰已絕，肌肉內虛，尚有餘熱。

沉香剉，柴胡去苗，黃芪，麥冬去心，各一兩。白朮七錢半，熟地黃二兩，黃芩，苦蕒根，甘草生剉，各

半兩。右剉，每服四錢，水一中盞，入竹葉二七片，小麥五十粒煎至六分，去滓，不拘時溫服。

⑥加味逍遙散 治肝脾血虛，內熱發熱，或遍身瘙癢寒熱，或肢體作痛，頭目昏重，或怔忡頰赤，口燥

咽乾，或發熱盜汗，食少不寐，或口舌生瘡，耳內作痛，或胃乳腹脹，小便欠利。

甘草炙，當歸，芍藥酒炒，茯苓，白朮炒，柴胡，各一錢。牡丹皮，山梔炒，各七分。右水煎服。

⑦梔子黃芩湯 治發背癰疽潰後，因飲食有傷，調攝不到，發熱不住，用以退熱。

漏蘆，連翹，山梔仁，黃芩去心，防風，石葦，如無以桑白皮代。生甘草，生犀角屑，人參，苦參各去蘆，

茯苓上白者，去皮，各二錢半，生黃芪去叉蘆一兩。右為粗末，每四大錢，水一鍾，煎至六分，去滓溫服。

⑧六合回生丹 一名六合奪命散，治發背癰疽潰爛，有回生之妙。

鉛粉一兩，輕粉，銀硃，雄黃，乳香箬上炙，沒藥炙，各二分半。右六味，各擇真正好者，研為極細末，收貯。

凡治其病，先煎好濃茶，將瘡先淨，輒帛拭乾，後剖開豬腰子一枚，用藥一分，摻於豬腰子上，傳患處，待豬腰子上發

熱如蒸，良久取去，自此拔毒氣，減痛苦，定瘡口，出膿穢，不可手擠。次日依前法，仍傳之，第三日亦傳之，瘡勢惡甚，可

傳七八九次，瘡小只傳一次可愈。豬腰子不發熱，勿治，又治對口瘡同前。

⑨驪龍散 治發背癰疽，破與不破二者之間，功能捷奏。

珍珠五分，牛糞十二月生用，餘月燒存性，鐵鏞，各重一兩。右研極細末，以豬腦髓和好，酢調，傳瘡口三五次

防風去蘆，厚朴去粗皮薑汁炒，苦梗，白芷，黃芪炙各半兩。人參二錢，川芎，甘草，柳桂，當歸各三錢。右為末，每服二錢，空心溫鹽酒調服，至瘡口合後，更服為佳。不飲酒，木香湯兼服，降氣湯尤妙。

⑤六味丸 一名六味地黃丸，此壯水之劑。夫人之生，以腎為主，凡病皆由腎虛而致，此方乃天一生水之劑，無有不可用者，世所罕知。若腎虛發熱，作渴，小便淋秘，痰氣壅盛，效嗽吐血，頭目眩暈，小便短少，眼花耳聾，咽喉燥痛，口舌瘡裂，齒不堅固，腰腿痿軟，五臟齊損，肝經不足之證，尤當用之。水能生木，故也。若腎虛發熱，自汗盜汗，諸血失血，失音水泛為痰之聖藥，血虛發熱之神劑也。

熟地黃生者自製八兩，山萸肉，山藥各四兩。白茯苓，牡丹皮，澤瀉各三兩。右地黃杵膏餘為末，蜜和丸，桐子大，每服七八十丸，滾湯下。

⑥八味丸 治命門火衰，不能生土，以致脾土虛寒而患流注鶴膝等證，不能消潰收斂，或飲食少思，或食而不化，臍腹疼痛，夜多漩溺。

前方加肉桂，附子各一兩。

⑦加減八味丸 治證同前。

⑧即六味丸，加肉桂，五味子各一兩。

⑨人參內托散 治瘡瘍潰膿而作痛者。

人參，黃芪，當歸，川芎，厚朴，防風，桔梗，白芷，官桂，紫草，木香，甘草。右入糯米一撮，水煎服。

⑩黃芪散 治癰潰後補虛去客熱。

黃芪，當歸，川芎，厚朴，防風，桔梗，白芷，官桂，紫草，木香，甘草。右入糯米一撮，水煎服。

醫部彙考三百六十五

外科癰疽疔毒門七

方一

雄黃解毒散 治一切癰腫潰爛毒勢盛者，先用此藥二三次，以後用豬蹄湯。
白礬四兩，雄黃，寒水石煨各一兩。用滾水二三碗，乘熱入前藥一兩，洗患處，以太乙膏或神異膏貼之。

豬蹄湯 治一切癰疽腫毒，消毒氣，去惡肉，凡瘡有口，便用此湯洗。

香白芷不見火，黃芩去心，赤芍藥，羌活，露蜂房取有蜂兒者，當歸去蘆，生甘草，各等分。右為粗末，看疽大小用藥如疽大，加料用。先將獐豬蹄兩隻一斤，只用白水三升，煮軟，將汁分作二次，澄去面上油花，盡下面滓肉，每次用藥一兩，投於汁中，再用文武火煎十數沸，去滓，以故帛蘸藥湯，溫溫徐薄揩瘡上，死肉惡血，隨洗而下，淨洗訖，以帛挹乾，仍避風，忌人口氣吹之。有狐臭人，并月經見行，婦人猫犬，並不許入病人房，洗瘡切勿以手觸著。洗疽之方，所傳甚多，惟此方極效。其用露蜂房有理，蓋以毒驅毒也。

集香散 洗癰疽潰爛。

白芷，藿香，茅香，香附子，防風，各三錢。木香，甘草，各一錢。作一劑，用水三碗，煎數沸，去粗淋洗患處。

愈，初起者自消，凡發毒品味忌食之。

⑤ 麥飯石膏 在膿潰後圍瘡口。

麥飯石不拘多少，炭火煨至紅，以好酢淬之，如此煨焙十數次，研爲末，重羅去粗者，取細末入乳鉢，數人更遞研，五七日，如麵極細爲妙。白蘘研爲細末。鹿角不用自脫者，須用帶腦頂骨全者，却是生取之角，截作二三寸長，炭火燒令烟盡，研羅爲末，再入乳鉢，更遞研令極細。右用麥飯石細末二兩，白蘘末二兩，鹿角灰四兩，最要研得極細，方有效，粗則反致甚痛，細則大能痛收口排膿，精粗之異如此。和合量藥末多寡，用經年好米酢入銀石器內，熬令魚眼沸，却旋旋入藥末，用竹篾子不住手攪，熬一二時久，令稀稠得所，提出，以磁器盛之，候冷，以紙蓋覆，勿令著塵。用時先以豬蹄湯洗去膿血，以故帛挹乾，鵝翎蘸膏塗傳四圍，凡有赤處盡塗之，但留中心一口如錢大，未潰能令內消，已潰則排膿如湍水，逐日瘡口收斂，瘡久肌肉腐爛，筋骨出露，用舊布片塗藥貼瘡，但內膜不穿，亦能取安。洗瘡勿可手觸嫩肉，亦不可口氣吹著。合藥亦忌腋氣之人，及月經有孕婦人見之。仍可熬好米酢一大碗，收磁器內，候逐日用藥於瘡上，久則藥乾，以鵝翎點酢拂拭藥上，勿令綳也。初則一日一洗，一換藥，十日後兩日一換。

⑥ 解毒百用膏

豬牙皂角煨，南星，各一兩。大米一合炒黑，臭小粉乾者四兩炒焦去火毒。右爲末，和勻，蜜水調圍，治顛撲

酒酢調圍。

⑦ 逼毒散

劉氏貼發背癰疽，膿盡四面皮粘，恐有膿毒攻起，宜用此。

黃藥子，白藥子，各一兩。透明雄黃一錢，赤小豆二兩。右爲末，水調博。

⑧ 青散子

治發背癰疽，膿盡生肉平滿，宜用此，緊瘡口生肌。右爲末，臨時用槿花末三錢，白芨小豆末各一

槿花葉盛時收陰乾，取四兩爲末，青赤小豆，白芨，各二兩。右爲末，臨時用槿花末三錢，白芨小豆末各一

煎黑柳條焦枯，濾去渣，入黃丹五兩，滴入水中，成珠爲度，却入諸藥，攪令勻，入瓷器中，收了後用。

⑤青金錠子郭氏

銅綠三錢，青礬，膽礬，輕粉，白丁香，砒霜，苦葶藶各一錢。腦子少許，麝香。右將葶藶研細，次下諸藥，同研極細，打稠糊爲錠子，或煉蜜加白芨末一錢爲錠，如麻黃粗細，約二寸長，看瘡口深淺，紐入疹者可治，不疼難治。第一般緊峻碧雲錠子，砒霜生開瘡口用。第二般緊緩碧霞錠子，砒霜煨去死肉用。第三般緩慢碧玉錠子，去砒霜，加枯礬生好肉用。

⑥翠霞錠子

治年深冷漏，日久惡瘡，有歹肉用之。銅綠，寒水石煨，滑石各三錢。明礬，膩粉，砒霜，雲母石研如粉，各一錢二分半。右研極細末，糊爲錠子，如麻黃粗細，長短不拘，量瘡口深淺，紐之。如修合候天色清明則可。

⑦信效錠子

治一切惡瘡。紅娘子，黃丹，砒霜，鷹屎，土硝，白芨，銅綠，各一錢半。腦子，麝香，各少許。右研細末，些兒乳汁和爲錠子，用中病即止。

⑧紅玉錠子

去歹肉生肌。乾胭脂，白礬枯各三錢。輕粉，砒霜，黃丹，腦子，麝香，各少許。右研極細末，稠糊和爲錠子用之。

⑨時效針頭散

追蝕惡瘡，歹肉，兼治燥癢。赤石脂半兩，乳香，白丁香各二錢。砒霜生，黃丹各一錢。輕粉，麝香，各半錢。蜈蚣一條焙。右爲極細末，摻於瘡口，歹肉自去矣，若動刀針，其瘡雖可有癢。

⑤熏洗方 凡諸發及癰疽、瘰癧、腫瘡、湯盪、火燒等疾，或有別作一種穢臭，氣息不堪聞者，最是惡證，或已破未破，或小或大，皆當作急治之，可用忍冬藤一握搗細，用無灰酒濾汁服之，以滓傳瘡四圍，用雲母膏別研，亦可剪開大口，以護其瘡之上，俟其瘡出膿，便以豬蹄湯等十分淨洗，久洗為妙，至一二時辰不妨，次用後藥熏之。

好降真香末， 楓香末。 右二味於銚中攪勻，丸如彈子大，却取香爐一枚，依爐口造紙煙筒一箇，如燒龍涎香樣，慢火爇之，緊以烟筒口熏瘡上，不拘丸數，稍倦暫止，然後更熏，未出膿者即出，已出膿者即乾，直候生肌合口，然後止，向後有赤腫去處，又再熏，大概欲屏去穢氣也。

⑥追毒丹 治瘡疽黑陷者，用刀針開瘡，內此丹，使之潰，然後去敗肉排膿，隨證治之，癰疽疔瘡附骨疽，並皆治之。

巴豆七粒，去皮心，不去油，研如泥， 白丁香， 輕粉，各一錢。 雄黃， 黃丹，各二錢。 右件研和，加白麪三錢，滴水為丸，如麥大，針破瘡內之，覆以乳香膏，追出膿血毒物，漏瘡四壁，死肌不去，不可治，亦以此追毒去死肌，乃養肉令愈，疾小者，用一粒，大者加粒數用之。

⑦追毒烏金散 治瘡口惡肉，毒潰膿血。 巴豆五錢， 寒食麪一兩， 好細墨一錠。 右為細末，用水和麪作餅子，將巴豆包定，休教透氣，文武火燒成深黑色，為細末，量瘡貼之，用膽汁就和成錠子，新水磨用，掃五七次妙。

⑧又方 保命 治惡瘡有死肉者及追膿。 白丁香， 輕粉， 粉霜， 雄黃， 麝香，各一錢。 巴豆霜三箇。 右為細末，新飯和作錠子用之。

⑨神異膏 治癰疽壞爛及諸瘡發毒。

風爐上慢慢文武火熬，候髮焦鎔盡，以杏仁投入，候杏仁色變黑，好絲濾去粗，再將所熬清油入銀銚內，然後入黃芪、元參二味，慢火熬一二時，取出銚子，安一冷風爐上，候半時久，火力稍息，旋入露蜂房、蛇蛻二味，將柳枝急攪，移銚於火上，不住手攪，慢火熬至黃紫色，用絲濾過後，復入清油在銚內，乘冷投黃丹急攪片時，又移銚於火上，文武火慢慢熬，不住手用柳枝攪千餘轉，候藥油變黑色，滴於水中，凝結成珠子，則是膏成就矣。若珠子稀，再熬少時，必候得所，然後用瓷器內封收待用。或恐偶然熬火太過，稍硬難用，却少入蠟熬，添麻油在內，瓷器盛封，蓋於甌上，蒸乘熱攪勻，收而用之。膏藥熬成了，須用所盛瓷器置淨水盆中，出火毒，一晝夜，歇三日方可用。熬此膏藥極難於火候，須耐煩看火緊慢，火猛即藥中火發，千萬謹戒。膏藥方甚多效，無出於此右者！

⑤熱瘡寒膏藥 東垣

當歸酒洗，焙乾一兩，杏仁湯浸去皮尖一百箇，黃丹研細六兩，肥嫩柳枝三兩半，切寸許洗乾，肥嫩桃枝一兩，切寸許洗乾，麻油一斤。右件先熬麻油熱，下桃柳枝熬令半焦，以絲裏當歸、杏仁同煎，至柳枝焦黑爲度，去藥粗濾油澄清，抹去銚中渣滓，令淨，再上火令沸，旋旋入黃丹熬成，滴水中不散爲度。

⑥神仙太乙膏 治八發癰疽及一切惡瘡軟癰，不問年月深淺，已成膿，並宜治之。蛇虎傷，蜈蚣螫

犬咬傷，湯火刀斧所傷，皆可內服外貼。如發背，先以溫水洗瘡淨，軟帛拭乾，却用緋帛攤膏藥貼瘡，即用冷水下，血氣不通，溫送下，赤白帶下，當歸酒下，欬嗽及喉閉纏喉風，並用新絲裏膏藥置口中含化。

元參，白芷，當歸，赤芍藥，肉桂去粗皮，大黃，生地黃，各一兩。右剉碎，用麻油貳斤浸，春五夏三，秋七，冬十日，火熬黑色，濾去粗，入黃丹一斤，青柳枝不住手攪，候滴水成珠，不粘手爲度。傾入磁器中，以磚蓋口，握窰

⑤追毒餅 治諸般惡瘡，因針開了口後，又閉合生膿，脹痛不可忍，用此捻成小麥子大，放入瘡中，永不閉，膿水自出，瘡自乾好。

極好信石半錢，雄黃，雌黃，大硃砂，各一錢。輕粉少許。右研為細末，糯米糊丸，如麥子大，若瘡口閉合，生膿，將藥入內，仍以膏藥貼之。

⑥翠青錠子 又名善效錠子，治腦疽發背惡瘡，并潰爛追膿水長肌。銅青四錢，明礬枯，韶粉，乳香炙另研，青黛各一錢半。白麩，輕粉真者各一錢。麝香半錢，杏仁二

七粒去皮尖另研。如有死肉，加白丁香一錢，右為細末，稠糊為餅子，或糯米飯和，亦得，看淺深紐之，直至瘡平復，猶可用之，大有神效。如前數方不宜多用，謂犯生砒也。此藥無毒，恐病家猜疑是毒藥，請口內嘗之為憑也。

⑦搜膿錠子 先用追蝕等錠子，蝕去歹肉惡物，止有膿水，皆宜用之。自然銅酢淬，川芎，白芷各半兩，黃連，白蘞各二錢半。木香一錢半，麝香少許。右為極細末，糯米飯

和為錠子用之，或作散末乾上亦佳。此二方乃潰瘍必用之要藥，余用之救人無算。凡瘡口深而窄者，先以綿杖子展淨膿水，却以軟飯和成錠子，長短大小，一以瘡為準，須令藥至底乃效。外以膏藥護之。若瘡口淺而闊大者，藥湯

洗過拭乾，只以乾末摻之。如瘡口乾燥，以自死竹蘸豆油點著，以盪承取滴下油，瀝調前藥末，鷄羽蘸塗，膿汁自止。瘡口又潤，新肉自生，神效。

⑧神效當歸膏 治癰疽瘡毒，及湯火杖瘡潰爛，最能止痛，推陳致新。當歸二兩，麻油四兩，白蠟五錢，如用黃蠟一兩尤效。先用當歸入油煎至焦黑色，去粗，入蠟鎔化，即成膏矣。此方

用蠟為君，前人每云蠟為外科之要藥，生肌定痛，續筋補血，其功不可盡述。常見善訟者杖後隨食蠟兩許，飲酒一兩碗，一睡之後，血散痛止，輕者即消，重者雖腐潰亦易愈，可見蠟之功甚大，用者不可忽之。

毒餅如小麥大，插入孔中，却用此膏貼之。如瘡壞爛至甚，難以藥貼，則將角皂二三片煎油調勻。此膏如稠糊，薄傅之，膿水或轉多，不數次傅之，乾愈妙。

大巴豆去殼膜，木鼈子去殼切片，各二兩淨。黃丹四兩研細，槐柳嫩枝，各七寸長七條剉碎。真麻油十兩。右依前法煎熬成膏貼用。

⑤金絲膏 治傷筋動骨，損痛閃肭，風毒惡瘡，風濕筋寒諸病。

當歸尾，川白芷，杏仁去皮尖雙仁，元參，豬牙皂角去皮弦，黃蘗，草烏生剉，各三錢。白膠香明者八兩，連鬚葉葱肥大者十根，滴青明者半斤，乳香，沒藥別研爲末，各半兩。黃蠟明者一兩，男子亂髮，洗淨按，如鷄子大。右用清油半斤，將八味依前法熬濾，却入膠香滴青攪勻，下黃蠟，又攪無烟，方下乳香沒藥。

⑥長肌膏 治年久諸般爛瘡，貼之即愈。

白燭油四錢，黃蠟，香油，各八錢。黃連三錢，大楓子去殼切細五錢，番木鼈肉切細二錢。以上七味，同煎濾，去粗入後藥。枯礬，輕粉，各三錢。密陀僧五分，各研細。右將前七味煎濾入後三味拌勻，俟凝看瘡口大小，做薄餅簪穿小孔十數，貼瘡上，或日易之，鹽茶湯洗瘡，并洗餅再貼，以好爲度。

⑦精要生肌散

寒水石碎，滑石，烏鰂骨，龍骨，各一兩。定粉，密陀僧，白礬灰，乾胭脂，各半兩。右爲細末，乾摻用之。

⑧平肌散 治諸瘡久不斂。

密陀僧煨研，花蕊石煨研，白龍骨，各一兩。乳香另研，輕粉，各一錢。右爲細末，和勻乾摻。

⑨生肌散

子埋陰樹下，以土覆三日，出火毒，欲服丸如雞頭子大。

⑤金絲萬應膏

治顛撲傷損，手足肩背并寒濕腳氣，疼痛不可忍，小兒脾疳瀉痢，欬嗽不肯服藥者。

瀝青二斤半，

威靈仙，

黃蠟各二兩。

沒藥，

乳香各一兩別研。

木鼈子四七箇切片研，

蓖麻子一百箇研，

麻油夏二兩，春秋三兩，冬四兩。

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化，以槐柳枝攪候焦黑色，重篩濾過，以瀝青入

水盆候冷成塊，取出秤二斤淨，再下鍋鎔開，下麻油、黃蠟、蓖麻、木鼈子泥，不住手槐柳枝攪勻，須慢火滴入水中不

粘手，扯拔如金絲狀方可。如硬，再旋加油少許，如軟，加瀝青試得如法，却下乳沒。未起鍋在炭火上再用槐柳條攪

數百次，又以粗布濾膏在水盆內，扯拔如金絲，頻換水浸一日，却用小銚盛，頓如落馬墜車於被傷疼痛處，火上炙

熱貼透骨肉為驗，連換熱水數次，浴之則熱血聚處自消，小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上，欬嗽貼背心上。

⑥善應膏

得效 治諸般惡瘡腫毒、發背、腦疽、癰子、牙腫、打撲接骨、閃肭刀斧傷、杖瘡、蛇蟲毒、狗馬咬、湯

火、漆瘡、疥癬，貼之即愈。又治婦人吹乳，以藥丸如桐子大，新汲水下二十九丸。肺癰腸癰亦可為丸吞

服，溫酒米飲，或北梗甘草煎湯皆可，不可犯葷手及火焙。

上等黃丹八兩研極細，

白膠香，

明沒藥，

滴乳香並別研，

大當歸，

川白芷，

大黃，

杏仁去皮尖，

頭，川烏頭，

赤芍藥，

檳榔，

生乾地黃，

亂髮洗淨，

滴青別研，

土芎各一兩。

右除乳香沒藥外，將盜石

銚子盛香油一斤，浸藥一宿，慢火煎熬，諸藥黑色，再入葱白亂髮煎少時，用生絹帛濾去滓，留下一兩藥油，復將所

濾油於慢火上熬，却將黃丹入油內，用長柳條槐條不住手攪，候有微烟起，提起藥銚，將柳條點藥滴在水面上，凝

結成珠不散，方成膏。如不成珠，上火再熬，直待成膏，提起藥銚，攪無煙出，却入乳香、沒藥、白膠香末攪勻，傾出瓷器

中，將元留下浸藥銚油一併收拾器內，用新汲水將藥器坐於水內，一日一換，過三日出火毒，方可用之。如膏藥硬

約量加黃蠟清油入膏內，攪勻得所，熬膏極難於火候，須耐煩看火緊慢，火猛藥中火發，不但失藥性，又燎傷製

黃丹，煅，木槲，音骨，寒水石，浮石，黃連，木香不見火，黃芩，檉柳，膠粉各三錢，腦子少許，木
爲末，隨瘡乾濕用之，乾則用溫鹽湯洗濕淨，乾却，摻其上，用不可太早，須膿血去盡，臨好方用，不然則又擧作。

橘半胃苓湯 治癰疽嘔吐不下，食不知味。

橘紅，半夏薑製各一錢。蒼朮米泔浸一宿炒，白朮炒，厚朴薑製，甘草炙，茯苓，人參，澤瀉，茅根，各二錢。薑汁數匙。水二鍾，煎一鍾，入薑汁煎一二沸，作十餘次飲之。

托裏健中湯 治瘡瘍元氣素虛，或因涼藥傷胃，飲食少思，或作嘔瀉等證。

肉桂三分，人參，白朮，茯苓，各二錢。半夏，炮薑，各一錢。炙甘草五分，黃芪一錢五分。右薑棗水煎服。

托裏益中湯 治中氣虛弱，飲食少思，或瘡不消散，或潰而不斂。

人參，白朮土炒，陳皮，半夏，白茯苓，炮薑，各一錢。木香，炙甘草，各五分。右薑棗水煎服。

托裏抑青湯 治脾土虛弱，肝木所侮，以致飲食少思，或胃膈不利等證。

人參，白朮，茯苓，陳皮，半夏，各一錢。芍藥，柴胡，甘草，各五分。右薑棗水煎服。

托裏清中湯 治脾胃虛弱，痰氣不清，飲食少思等證。

人參，白朮，陳皮，茯苓，各一錢。半夏，八分，桔梗七分，甘草五分。右薑棗水煎服。

托裏益黃湯 治脾土虛寒，水反侮土，以致飲食少思，或嘔吐泄瀉等證。

人參，白朮，陳皮，茯苓，半夏，各一錢。炮薑，丁香，炙甘草，各五分。右薑棗水煎服。

托裏越鞠湯 治六鬱所傷，脾胃虛弱，飲食少思等證。

人參，白朮，各二錢。陳皮，半夏，各一錢。山梔，川芎，香附，蒼朮，各七分。炙甘草五分。右薑棗水煎服。

白礬枯， 檳榔各一兩。 黃丹， 血竭各一錢。 輕粉半錢， 密陀僧一錢半。

④紅玉散

軟石膏煨半兩， 黃丹炒一錢半。

⑤完肌散

定粉， 枯礬， 黃連， 乳香， 龍骨各二錢。 黃丹， 輕粉各一錢。 右為極細末， 貼瘡口， 生肌長肉， 看輕重選用之。

⑥生肌散 治瘡口不合。

木香， 輕粉各二錢。 黃丹， 枯礬各五錢。 右件各另為細末， 用豬膽汁拌勻， 曬乾再研細， 搽患處。

⑦又方 治寒瘡斂口藥。

歸身一錢洗曬乾， 青皮去白二分， 木香一分， 黃連五分。 右四味為極細末， 蠟油調塗， 取效甚速。

⑧保命乳香散 治瘡口大者。

寒水石煨， 滑石各一兩。 乳香， 沒藥各半兩。 腦子少許。 右各研細和勻少許， 搽瘡口上。

⑨聖效散 收斂瘡口。

黃蘗一兩， 去粗皮炒赤黑色， 穿山甲一兩炒， 檳榔， 木香各半兩炒黃色。 雞臙脰七枚生用。 右為細末， 每

用少許， 候大膿出盡洗淨， 方可乾搽瘡上。

⑩桃紅散 斂瘡口， 定痛辟風邪。

滑石四兩， 乳香， 輕粉各二錢。 小豆粉一兩， 寒水石三兩煨。 右為細末， 乾搽口上。 一方改小豆粉為定粉。

⑪又方 治瘡口久不收。

白礬二錢半。 右為細末， 搽之。

粟殼六兩 白芷三兩 炙草 陳皮各一兩半 乳香 沒藥各一兩 丁香半兩 右咬咀每服三錢水一盞半煎。

㊟乳香黃芪散 治一切惡瘡、癰疽、發背、疔瘡、疼痛不可忍者，或未成者，速散，已成者速潰敗膿，不假

刀砭其惡肉自下，及治打撲傷損，筋骨疼痛。

黃芪去蘆，當歸酒洗，川芎，麻黃去根節，甘草生，芍藥，人參去蘆，粟殼蜜炒各一兩。乳香另研，

沒藥另研各五錢。陳皮一兩。右為細末，每服三錢水一盞煎至七分，去粗溫服。如瘡在上，食後在下，食前服之。

㊟人參內托散 治瘡瘍潰膿而作痛者。

人參，黃芪，當歸，川芎，厚朴，防風，桔梗，白芷，官桂，紫草，木香，甘草。右入糯米一撮，水煎服。

㊟乳香丸 治發背及一切疽瘡潰爛，痛不可忍。

乳香，沒藥並另研極細，羌活，五靈脂，獨活各三錢。川芎，當歸，真菘豆粉，交趾桂，川白芷，

白膠香各半兩。右為細末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼薄荷湯送下。手足損痛不能起者，加草烏，用木瓜鹽

湯送下。

㊟乳香定痛散 治一切瘡瘍潰爛疼痛。

乳香，沒藥各五錢。滑石，寒水石各一兩。冰片一錢。右為細末，擦患處，痛即止，敷藥中加南星半夏，能止

痛，更加蓖麻仁尤佳。

㊟乳香膏 治諸瘡痛久不瘥。

服。

③人參理中湯 治瘡瘍脾胃虛寒，嘔吐泄瀉，飲食少思，肚腹作脹，或胃膈虛痞，飲食不入。

白朮，人參，乾薑，甘草炙，各等分。右薑棗水煎服。

④黃芪人參湯 癰疽膿血大泄敗臭，痛甚，宜用。黃芪炙，人參，神麴炒，甘草炙，五味子杵，各一錢。

人參，蒼朮米泔浸炒，白朮炒，麥門冬去心，陳皮，當歸酒拌，神麴炒，甘草炙，升麻，各四分。右作一劑，水二鍾，薑三片，棗二枚，煎八分，食遠服。

黃芪炙二錢，黃蘗炒，升麻，各四分。右作一劑，水二鍾，薑三片，棗二枚，煎八分，食遠服。

⑤加味解毒湯 癰疽大痛不止，宜用。黃芪鹽水拌炒，黃連炒，黃芩炒，黃蘗炒，連翹，當歸酒拌，各七分。甘草炙，白芍藥，梔子仁炒，各一錢。右作一劑，水二鍾，煎八分，服之藥下痛即止。

黃芪鹽水拌炒，黃連炒，黃芩炒，黃蘗炒，連翹，當歸酒拌，各七分。甘草炙，白芍藥，梔子仁炒，各一錢。右作一劑，水二鍾，煎八分，服之藥下痛即止。

⑥內補黃芪湯 人參，茯苓，甘草炙，各五分。芍藥炒，川芎，官桂，遠志去心，當歸酒拌，各八分。麥門冬去心五分。作一劑，水一鍾半，薑三片，棗二枚，煎六分，食遠服。

黃芪鹽水拌炒二錢，熟地黃酒拌，人參，茯苓，甘草炙，各五分。芍藥炒，川芎，官桂，遠志去心，當歸酒拌，各八分。麥門冬去心五分。作一劑，水一鍾半，薑三片，棗二枚，煎六分，食遠服。

⑦當歸和血散 治瘡瘍未發出，內痛不可忍，及治婦人產前產後腹痛。當歸二錢，乳香半錢，沒藥一錢半，芍藥三錢。右為細末，每服一錢，水一中盞，煎七分，和滓溫服。日二。婦人酒煎。瘡既發，不須用，瘡痒者，加入人參、木香、婦人服之，加赤芍藥。

⑧迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚，色變紫黑者。金銀花連枝葉俱用，剉研二兩。黃芪四兩，甘草一兩。右咬咀，用酒一升，同入壺瓶內，閉口重湯煮三兩時辰，取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

⑨迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚，色變紫黑者。金銀花連枝葉俱用，剉研二兩。黃芪四兩，甘草一兩。右咬咀，用酒一升，同入壺瓶內，閉口重湯煮三兩時辰，取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

⑩迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚，色變紫黑者。金銀花連枝葉俱用，剉研二兩。黃芪四兩，甘草一兩。右咬咀，用酒一升，同入壺瓶內，閉口重湯煮三兩時辰，取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

⑪迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚，色變紫黑者。金銀花連枝葉俱用，剉研二兩。黃芪四兩，甘草一兩。右咬咀，用酒一升，同入壺瓶內，閉口重湯煮三兩時辰，取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

⑫迴瘡金銀花散 治瘡瘍痛甚，色變紫黑者。金銀花連枝葉俱用，剉研二兩。黃芪四兩，甘草一兩。右咬咀，用酒一升，同入壺瓶內，閉口重湯煮三兩時辰，取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

取出，去滓，頓服之。一方無黃芪。

白朮炒，茯苓各二錢。陳皮，白芍藥炒，檳榔，澤瀉各一錢。木香五分。作一劑，水二鍾，薑三片，煎八分，食後服。如腫不退，加白朮炒，枳實炒各一錢。

附子，人參，茯苓，白芍藥各三錢。白朮四錢。右水煎服。

⑤薑附湯 治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多，失於補托，以致上氣喘急，自汗盜汗，氣短頭運。

人參，附子炮製去皮臍各一兩。乾薑炮，白朮各五錢。右作二劑，水煎服。

⑥參附湯 治失血過多，或膿瘀大泄，或寒涼汗下，真陽脫陷，上氣喘急，自汗盜汗，氣短頭運等證，急服以救元氣，緩則不治。

人參一兩，附子炮去皮臍五錢。右薑五片，水煎服，不應倍之。

⑦懷忠丹 治內癰有敗膿敗血，腥穢殊甚，以致臍腹冷痛，用此推膿下血。白芷，單葉紅蜀葵花根各一兩。白礬枯，白芍藥各五錢。右研爲末，鎔黃蠟丸如梧子大，空心米湯下三十丸，推膿下血。出盡後服十宣散補之，忌發物。

⑧葶塵大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得臥。

葶塵炒黃研細如彈丸大，大棗十二枚，水三升，入棗先煮取二升，去棗入葶塵，又煮一升頓服之。又曰治肺癰，智滿脹，一身并面自浮腫，鼻塞清涕出，不知香臭酸辛，欬逆上氣，喘鳴迫塞，用前方三日一劑，可至三四劑，須先與

乳香另研一兩，食鹽，杏仁去皮尖雙仁研，松脂各一兩半。生地黄取汁三合，黃蠟三兩，白羊腎脂半斤。右先熬脂令沸下杏仁，地黄汁蠟煎候蠟鎔盡入乳香鹽松脂煎以柳篔攪令勻，稀稠得所，磁盒盛傅瘡上日二三度。

●乳香膏

木鼈子去殼細剉，當歸各一兩。柳枝一尺六寸剉，同以清油四兩煎令黑色，次用後。乳香，沒藥各半兩。白膠香明淨者四兩，同研極細，入油煎化，用緜子濾之。右煉藥鐵銚令極淨，再傾前藥油蠟在內，候溫入黃丹一兩半，以兩柳枝攪極得所，再上火煎，不住手攪，候油沸起住攪，注在水中成珠不散為度，秋冬欲軟，春夏欲堅，傾在水中，出火毒，搜成劑收之。

●東垣聖愈湯

治諸惡瘡血出不止，以寒水石細末摻之，立止，或瘡時間作黑色，不可潰也，藥力去盡，却紅和，如血出多而心煩不安，不得眠睡，此亡血也，此湯主之。

熟地黄，生地黄各三錢。當歸身一錢半，川芎二錢，黃芪五分，人參三分。右咬咀，都作一服，水一盞半，煎至一盞，去滓稍熱服，無時。

●和氣散

治癰疽潰後，氣虛滑泄，四肢逆冷。蒼朮四兩，米泔浸三日，洗淨曬乾，再以米酢炒令香黃色，甘草炙，青皮去穰各一兩。良薑炒，肉桂，乾薑炮各半兩。陳粟半升。右七味為末，每服一錢，用炒茴香末半錢相和，溫酒調下，不拘時。

●瞿麥散

治癰疽發背，排膿止痛，利小便。瞿麥，白薇，麥門冬去心各等分。赤小豆一合酒浸炒。右咬咀，每

桂心，赤芍藥，當歸，黃芪，芎藭，瞿麥，白薇，麥門冬去心各等分。赤小豆一合酒浸炒。右咬咀，每

枳椇 貝母 當歸酒浸 葶藶仁 枳殼麩炒 薏苡仁微炒 桑白皮 防己 甘草節各一兩 百合蒸
黃芪各一兩半 北五味子 甜葶藶 地骨皮 知母 杏仁各半兩 右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片
煎七分不拘時溫服欬者加百藥煎熱加黃芩大便不利加煨大黃少許小便澀甚加木通車前子煎煩躁加白茅
根煎欬而疹甚加人參白芷煎。

④四順湯 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽。

貝母去心 紫菀去苗土 桔梗炒各一兩 甘草炙剉半兩 右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去滓不拘時
稍冷服如欬甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減。

⑤瀉白散 治肺癰。

桑白皮炒二錢 地骨皮 甘草炙 貝母去心 紫菀 桔梗炒 當歸酒拌各一錢 苦蕪仁錢半 作一劑
水一鍾薑三片煎八分食遠服。

⑥濟生排膿湯 治肺癰得吐膿後以此排膿補肺。

生縣黃芪二兩細末每二錢水一碗煎五分服 肺癰收斂瘡口止有合權樹皮白蘞煎湯飲之。

⑦排膿散 治肺癰吐膿後宜服此補肺。

黃芪鹽水拌炒 白芷 五味炒杵 人參各等分 爲細末每服三錢食後蜜湯調下。

⑧甯肺湯 治欬嗽唾膿自汗上氣喘急用此補肺及治榮衛俱虛發熱自汗。

人參 當歸酒拌 白朮 熟地黃 川芎 白芍藥 甘草炙 五味子搗 麥門冬去心 桑白皮炙 阿膠
蛤粉炒 白茯苓各一錢 作一劑水二鍾薑二片煎八分食後服。

小青龍湯一劑乃與之。

⑤ 桔梗湯

治效而胃滿，振寒，脈數，咽乾不渴，時出濁唾，腥臭，久久吐膿如粥者，肺癰也。

桔梗，甘草炙各一兩。

用水三升，煮取一升，去滓分溫再服，則吐膿血也。亦治喉痹，三因甘草倍之，每四錢，名四

聖散。千金亦名桔梗湯，用桔梗三兩，甘草二兩，服後必吐膿血。

⑥ 葦莖湯

治肺癰，又云一本治效有微熱煩滿，心胃甲錯。

葦莖三升切，桃仁五十枚去皮，薏苡仁，冬瓜仁各半升。用水一斗，先煮葦莖得五升，去淨入諸仁煮取二

升，分溫五服，當吐如粥。

⑦ 如聖丸

梅師

治風熱毒氣上攻，咽喉痛痹，腫塞妨悶，及肺癰喘嗽唾膿血，胃滿振寒，咽乾不渴，時

出濁沫，氣臭腥穢，久久咯膿，狀如米粥。

樟腦，牛黃各另研。桔梗，甘草生用各一錢。為細末，煉蜜丸，每兩作二十九丸，每用一丸嚙化。

⑧ 仲景桔梗白散

治效而胃滿，振寒，脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，為肺癰。

桔梗，貝母各三分。巴豆去皮炒研如脂一分。右三味為散，強人飲服半錢匕，羸者減之。病在膈上者吐膿血，

膈下者瀉出，若下多不止，飲冷水一椀則定。

⑨ 牡丹散

本事

治肺癰吐膿血作臭，膈乳間皆痛。

牡丹皮，赤芍藥，地榆，苦梗，薏苡仁，川升麻，黃芩，生甘草各一錢半。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，

食遠服。一方無黃芩，加生薑煎，名升麻湯。

⑩ 如金解毒散

治肺癰

山梔炒，各七分。作一劑，水二鍾，煎八分，作十餘次呷之，勿

沉香，木香，明乳香，丁香，藿香葉，各半兩。白朮，人參，白茯苓，薏苡仁，山藥，蔞豆，桔梗，縮砂，白豆蔻，粉草，蓮肉，各一兩。右爲末，蘇鹽湯調空心服，棗湯亦可。有汗加浮麥煎湯下。

⑤薏苡附子散 治身甲錯，腹皮急，如腹脹本無積聚，身熱脈數者。

附子炮二分，敗醬五分，薏苡仁一錢。右爲末，每服方寸匕，以水二合煎頓服，小便當下。三因薏苡附子同煎，敗醬用一兩一分，每四錢，水淺半煎七分，去粗空心服。

⑥牡丹湯 治腸癰小腹腫痞，按之即痛，小便如淋，時時發熱，自汗惡寒，其脈遲緊者，膿未成，可下之，當有血，洪數者膿已成，不可下。

牡丹皮，苦萹仁，各一錢。桃仁去皮尖雙仁，芒硝，各二錢。大黃五錢。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，去滓入硝再煎數沸，不拘時服。

⑦薏苡仁湯 治腸癰腹中疔痛，煩毒不安，或脹滿不食，小便澀，婦人產後虛熱，多有此病，縱非癰，但疑似間便可服。

薏苡仁，苦萹仁，各三錢。牡丹皮，桃仁，各二錢。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，不拘時服。

⑧牡丹散 治腸癰冷證，腹濡而痛，時時利膿。

牡丹皮，人參，天麻，白茯苓，黃芪，木香，當歸，川芎，官桂，桃仁去皮炒，各七錢半。白芷，薏苡仁，甘草炙，各五錢。爲細末，每服三錢，用水一鍾，煎至七分，食前溫服。

⑨梅仁湯 治腸癰裏急隱痛，大便秘澀。

梅核仁四十九粒去皮尖，大黃三兩，牡丹皮一兩七錢半，芒硝二兩半，冬瓜仁四兩，犀角鎊一兩半。右剉如麻豆大，每服五錢，水二錢，煎至一錢，去滓溫服，以利下膿血三兩行爲度。

①人參補肺湯 治肺證欬喘短氣，或腎水不足，虛火上炎，痰涎壅盛，或吐膿血，發熱作渴，小便短澀。

人參，黃芪蜜炙，白朮土炒，白茯苓，陳皮，當歸各一錢。山萸，山藥各二錢。麥冬七分，甘草炙。

五味子，各五分。熟地黃自製一錢半，牡丹皮八分。右薑棗水煎服。

②人參平肺散 治心火剋肺，傳為疽瘰，欬喘嘔，痰涎壅盛，胃膈痞滿，咽隘不利。若因肝木太過而致，當補肺；若因腎水不足而患，當補脾肺；若因心火旺而自病，當利小便。

人參，陳皮，甘草炙，地骨皮，茯苓各一錢。知母炒七分，五味子杵炒四分，天門冬去心，青皮，各五分。

桑白皮炒一錢。右水煎服。

③參芪補脾湯 治肺疽脾氣虧損，久欬吐膿涎，或中滿不食，必服此藥補脾士，以生肺金，否則不治。

人參，白朮，各二錢。黃芪二錢五分，茯苓，陳皮，當歸各一錢。升麻三分，麥門冬七分，五味子四分。

桔梗六分，甘草炙五分。右薑棗水煎服。

④葶藶散 治肺癰欬氣急，睡臥不安，心胃脹滿。

甜葶藶子二兩半，隔紙炒至赤色，百合炒，白附子，北五味炒，甘草節，人參，款冬花，百藥煎，紫苑，去木，各一兩。大朱砂半兩另研。右為末，每服二錢，燈心湯調下。

⑤補肺散 治肺癰已吐出膿血，以此潤護。

真鍾乳粉一兩，白滑石二兩。右研細，每服三錢，米飲調下。

⑥理肺膏 治肺癰正作，欬唾不利，胃膈迫塞。

訶子去核，百藥煎，五味子微炒，條參去蘆，款冬花蕊，杏仁，知母，貝母，甜葶藶子，紫苑，百合，甘草節，各五錢。右為末，用白茅根淨洗，秤三斤，研取自然汁，入磁石器中，熬成膏，更添入好蜜二兩，再熬勻候

⑤ 荆防敗毒散 治疔瘡

黃連，羌活，青皮，白殭蠶，獨活，防風，蟬蛻，細辛，赤芍藥，甘草節，獨腳茅，各等分。右咬咀，每服五錢，先將一服入澤蘭葉少許，薑十錢，重同搗爛，熱酒和服，然後用酒水各半，薑三片煎服，病勢退減後，再加大黃少許，煎服，略下一二行，蕩去餘毒，更用白梅，蒼耳子，研爛，貼瘡上，拔去根脚，加鮮菊花搗汁，入藥尤妙。

⑥ 二活散

羌活，獨活，當歸，烏藥，赤芍藥，金銀花，連翹，天花粉，甘草節，白芷，各四錢半。紅花，蘇木，荆芥，蟬蛻，乾葛，各三錢。檀香二錢。右為細末，每服三錢，煎蒼耳湯調下。

⑦ 奪命丹 治疔瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥乾者半錢，酒化，硃砂水飛三錢，枯礬，寒水石水飛，各一錢。輕粉五分，銅綠一字，麝香一字，海羊二十箇，研，即蝸牛也，不用亦效。右件為細末，將海羊另研為泥，和藥一處，丸如菉豆大，如丸不就，加好酒成之。病輕者一九二九，重者三九，未效再服，服時嚼葱白一大口，極爛，置手心，放藥丸於葱內，裹合，熱酒送下，暖處臥取汗，出為效，忌冰水。薛氏有銅綠，麝香，沒藥，乳香各一錢。

⑧ 返魂丹 瑞竹 治十三種疔

硃砂，膽礬，各一兩半。血竭，銅綠，雄黃，蝸牛生用，枯白礬，各一兩。輕粉，沒藥，蟾酥，各半兩。麝香少許。右將蝸牛，蟾酥，研爛，餘藥為細末，同研和丸，如雞頭大，每服一九，令病人先嚼葱白三寸，吐在掌心，將藥丸裹在葱白內，用熱酒一盞吞下，如重車行五里許，有汗出，即瘡如不能嚼葱，研爛裹下，極效。

⑨ 返魂丹 經云：汗之則瘡愈，必用此藥汗之。

乳香，沒藥，辰砂，雄黃，各一錢半。輕粉，片腦，麝香，各五分。蝸牛不拘多少。蟾酥，青黛，粉草，

⑤大黃湯 治腸癰小腹堅硬，腫大如掌，而熱，按之則痛，其上色或赤或白，小便稠數，汗出憎寒，其脈遲緊者，未成膿，如脈數，則膿已成。

大黃剉炒，牡丹皮，硝石研，芥子，桃仁湯浸去皮尖雙仁炒，各半兩。右剉碎，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗空心溫服，以利下膿血為度，未利再服。

⑥四聖散 治腸癰癰疽，生於腦髀背腋乳便毒，服之神效。

生黃苦蕒一枚去皮，粉草四錢研末，沒藥研末三錢，乳香研末一錢。右用好紅酒二大碗，慢火煎至一碗，分作兩服，兩日服盡，大便順導惡物妙，若乾苦蕒則用兩枚。一方若病在上，食後服，病在下，食前服。毒已結成，即膿化為水，毒未成，即於小便中出，疾甚再合服，以退為度。

⑦排膿散 治腸癰小腹脹痛，脈滑數，或裏急後重，或時時下血。

黃芪鹽水拌炒，當歸酒拌，金銀花，白芷，穿山甲用蛤粉炒，防風，連翹，苦蕒仁杵，甘草，各一錢。作一劑，水二鍾，煎八分，食前服。若膿將盡，去穿山甲，連翹，加當歸，川芎，或為末，每服三錢，食後蜜湯調下亦可。

⑧射干湯 治胃脘癰，人迎脈逆而盛，嗽膿血，榮衛不流，熱聚胃口成癰。

射干去毛，梔仁，赤茯苓去皮，升麻，各一兩。赤芍藥一兩半，白朮半兩。右為末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去渣入地黃汁一合，蜜半合，再煎溫服，不計時候。

⑨復元通氣散 治諸氣滯耳聾，腹癰便癰，瘡疽無頭，止痛消腫。

青皮，陳皮，各四兩。甘草三寸生熟各半，穿山甲炮，苦蕒根，各二兩。金銀花淨者，連翹，各一兩。右為細末，熱酒調下。

芍藥湯 治胃脘積熱，結聚為癰。

山梔、牽牛末、大黃各一兩。甘草、京三稜炮、各七錢。右煉蜜丸如彈子大，酒化服之。一方有當歸、赤芍、連翹、牡蠣、金銀花、紫花、地丁、宜選用之。

⑤內托連翹散 疔瘡出時，皮色不變，及不疼痛，按搖不動，身發寒熱，便是此瘡。有水疔、魚臍疔、紫燕疔、火疔諸般疔瘡，如瘡黃，於黃上用針刺，仍服內托散，自然消散。

連翹、白芷、乾生地黃、赤芍藥各一兩。大黃去皮、黃梔去頂蒂、薄荷葉各七錢。砂硝二兩、黃芩去心半兩、甘草一兩半。右爲粗末，每服一兩，水一碗，燈心竹葉煎七分。其人喘，加入參少許，大病只三四服愈。如服了心煩嘔，用不二散止之。

⑥不二散

甘草半兩、菘豆粉一兩。右爲末，分作二服，酸鹽水下。

⑦奪命丹 治疔瘡大便祕實不通者，或心腹痛者。

巴豆去殼、太黃各一錢。輕粉二分、鬱金、雄黃、乳香各五分。硃砂、黃丹各三分。麝香少許、蟾酥不拘多少。右末麵糊爲丸，如菘豆大，隨虛實服之，茶清送下，五七丸至九九丸止，以利爲度。如無此丸，以雄黃丸代之。

⑧雄黃丸 治證如前。

巴豆十四粒、麝香少許、全蠍、牙皂、雄黃、大黃、鬱金各一錢。右末米糊丸，如菘豆大，硃砂爲衣。每服五七丸，清茶送下，以利爲度。

⑨追毒丸

海浮石燒赤，酢淬七次半兩。川烏一兩，乳香、沒藥各一錢。巴豆四十九粒。右爲末，酢糊丸，如桐子大。若

礪砂，各一錢。右為細末，用海羊搗膏為丸，如難丸，加酒麪糊些少，丸如彈子大，每服一丸，兼生葱頭二三箇，細嚼嚥下，疔腫及癰腫毒氣入膈者，得微汗即解。一方加銅綠、寒水石、輕粉、枯礬各一錢。

⑤飛龍奪命丹 治疔瘡、發背、腦疽、乳癰疽、附骨疽，一切無頭腫毒惡瘡，服之便有頭，不痛者服之便痛，已成者服之立愈。此乃惡證藥中至寶，病危者服之立可矣。萬無一失。此乃家傳之祕方，不敢輕洩，神速之驗，即愈立效。

輕粉，腦子無亦可。麝香各半錢。寒水石，血竭，膽礬各一錢。蟾酥乾者酒化，乳香，沒藥，硃砂為衣，銅綠各二錢。雄黃三錢，蝸牛二十一箇無亦效。蜈蚣一條酒炙黃去頭足。右為細末，先將海羊連殼研為泥，和前藥為丸，如菉豆大，如丸不就，入酒打麪糊為丸。每服二九，先用葱白三寸，令病人嚼爛吐於手心，男女右，將藥丸裹在葱白內，用無灰熱酒三四盞送下，於避風處，以衣蓋覆之，約人行五里之久，再用熱酒數杯以助藥力，發熱大汗出為度。初覺二九即消，如汗不出，重者再服二九，汗出即效。三五日病重者，再進二九，即愈。如疔瘡走黃過心者，難治之，汗出冷者亦死矣。如病人不能嚼葱，搗碎裹藥丸在內，熱酒送下，瘡在上，食後服，瘡在下，食前服。服此藥後，忌冷水、黃瓜、茄子、油豬、鷄魚肉、濕麪，一切發風發瘡毒類之物，不可食之，又忌婦人洗換狐臭百發百中。此藥活人多矣。

⑥走馬赴筵丹 治疔瘡。

片腦一分，沒藥，乳香，礪砂，硃砂，雄黃，輕粉各三錢。麝香少許。右為細末，蟾酥汁和為丸，如黃米大，每服一丸，溫酒送下。

⑦羅氏破棺丹 治瘡氣入腹危者。

大黃二兩半生半熟，甘草，芒硝各一兩。右為細末，煉蜜丸，如彈子大，每服半丸，食後溫酒化下，或帶溺半盞。

芒硝，紫金皮，雞屎子，詐死子，谷藤根，芙蓉根，嫩柏根，青王叉，右薄荷生地黃煎服。

㊟追疔奪命湯 祕方速效，能內消腫。

羌活，獨活，青皮多用，防風多用，黃連，赤芍藥，細辛，甘草節，蟬蛻，白殭蠶，雞爪川黃連，各等分。再加紫河車，澤蘭，金銀花。右咬咀，每服五錢。先將一服加澤蘭少用，葉金銀花各一兩，生薑十片同藥搗爛，好酒釀之，熱服，不喫酒者水煎為妙，然後用酒水各一盞半，生薑十片，煎盡半，熱服，汗出為度，病退減後，再加大黃二錢，煎如前，熱服，再以利一二次去餘毒為妙。此方以藥味觀之，甚若不切，然效速於神驗，萬無一失，累用累效。如有別證，再出，宜隨證加減治之速效。若心煩嘔吐，加甘草節一錢，豆粉酸漿水下。嘔逆惡心，加乳香豆粉甘草湯下。有膿加何首烏白芷。要利加青木香、大黃、牽牛、梔子。在脚加木瓜，以上各等分。

㊟加減追疔奪命湯 治疔瘡及癰疽、發背、惡瘡、癩赤腫痛、創人或紫游風、赤游風，並大效。

防風，赤芍藥，連翹，羌活，獨活，細辛，青皮，白殭蠶，蟬蛻，青木香，甘草節，金銀花，紫河車，獨腳蓮。右生薑、澤蘭、生地黃煎服。病勢退減，加大黃取利，下三五行，去大黃。

㊟防風當歸湯 治疔瘡發熱，大便實者。

金銀花，山慈姑，青木香，當歸，赤芍藥，白芷，防風，荊芥，連翹，升麻，羌活，獨活，甘草，大黃。右薄荷生地黃煎服。

㊟雄麝湯 解疔毒如神，凡解毒，不可無雄黃、硃砂。

雄黃，硃砂，麝香，乳香並另研，各一錢。白芷，茜根，真菘豆粉，地丁，各二錢。牡蠣，白殭蠶，牛蒡子炒，朴硝，大黃，山梔子，金銀花，青木香，荊芥穗，甘草，各一錢。核桃二箇去膜殼。右以白芷以後十四味細切，用無灰酒一碗浸少時，搗細，又加水一碗，同煎至一碗，去粗及濁脚，入前雄黃等五味調勻，作一服。

患二三日，服十九，五六日服十四丸，隨病上下服之。先喫冷酒半盞，或一盞，又用冷酒吞下。如嘔，不妨出藥，依上服之。病人大便不動，再用三九。如疔看得端的，爪破，用頭垢塗患處，後服藥。

⑤五聖散 治疔瘡。

皂角鉞二兩，苦蕒一箇，大黃，金銀花，生薑，甘草，各一兩。右咬咀，用好酒二升，同煎至八分，去粗，不拘時溫服。

⑥奪命返魂散 治一切疔瘡憎寒發熱，昏悶不語，腫徧皮膚，不思飲食。

大黃，連翹，山梔子，已上各二錢半，研為細末。巴豆，杏仁，各二錢，麩皮同炒黑色，研為細末。人言五錢，用大蒜五箇，去心填入人言，同燒過性，研為末。牽牛頭末，苦丁香，各一錢。右為細末，研勻，每服半錢，病重者服一錢，用新汲井華水調下，一服見效。如病重無脈者，喫下藥約一頓飯時吐了藥，便醫不得，吐不了藥即活。

⑦立馬回疔奪命散 治疔瘡及喉痹、乳蛾、腫痛大效。

牡蠣，當歸，牛蒡子，殭蠶，各半兩。大黃一兩。右咬咀，每服半兩，用青石磨刀水酒各一盞煎，去滓連進二服。疔瘡服後出汗者生，無汗者死。

⑧御史散 治疔瘡。

生鐵銹三錢，為末，木香磨酒調下，分病上下，食前食後服之，得微汗而愈。此方乃祕法也，未嘗試用，常治疔瘡有赤絲攻心腹者，用鐵銹三錢，牡蠣二錢，青鹽一錢為末，挑破瘡頭，以燈盞內油調搽，其絲自回，名喚回丹，但未用服。考之本草云：鐵銹生鐵上衣也，治惡瘡，疥癬蜘蛛等咬，蒜磨敷之，亦未云服。家藏方用貓兒眼草一擔，細切，以水擔餘浸二日，煮百餘沸，去粗取汁，煎至三四碗，用生鐵銹細研末三兩，徐徐入汁內，以鐵杖不住手攪，再煎至二碗許，成膏子，治一切癰疽瘡毒，甚效。瘰癧潰後，塗瘡孔內尤妙。

或合七神散更妙

⑤七聖紫金錠 治疔瘡、瘴氣、時毒等證。

土木香，苦花子連梗葉，仙人薯，晚蠶砂，柏花各一兩。硃砂，雄黃各三錢。右末，秫米糊為丸，以毛屎

梯根磨水化下。

⑥硃墨丸 治疔瘡瘴毒。

硃砂，京墨各等分。右末，以蟾酥汁為丸，如梧桐子大，每服二丸，以葱白煎湯吞下，日服一二次。

⑦萬病解毒丸 治疔瘡、癰疽、發背、腫瘍、時毒、狐狸毒、鼠莽毒、丹毒、驚毒、瘴毒、風毒、熱毒、蠱毒、河豚疫、

死牛馬豬羊毒、蛇、犬、蜈蚣、蜂、蠍、百蟲螫咬毒、湯火所傷、中惡邪氣、無名腫毒、菰毒、砒毒、藥毒、瘡毒、光

粉、輕粉毒，一切邪熱毒，悉皆治之。

麝香二錢，硃砂五錢，山豆根，續隨子取仁，雄黃，紫河車，獨腳蓮各一兩。五倍子三兩，紅牙大戟

一兩五錢，山慈姑二兩。右末，秫米糊和勻，杵搗一千餘下，印作錠子，隨意大小，每服一錠，井水磨化，冬月用薄

荷湯磨服，日可進二三服。

⑧刷瘡散 治疔瘡、瘴毒，服藥後，可用此藥刷塗。

生薑葉，地薄荷，紫金藤。右搗米泔水暖刷患處，次加蠶砂，凌霄花，雞脰花二花；如無以葉代之。

⑨揆瘡散 治疔瘡、瘴毒、潰爛成瘡。

柏樹皮去外面粗皮，側柏葉各等分。右細末，以柏油先刷，次揆末。

⑩洗瘡方

柏葉，朴葉，柳枝，連叉葉。右煎水淋洗之。

更審患處經絡分野，依東垣引經瀉火藥加之尤妙。欲利倍加大黃，砒硝，二味，臨後下。茜草即過山龍，地丁即大薊也。一云剪刀草，開黃花者，名黃花地丁，開紫花者，名紫花地丁。

㊟解毒消瘴散 治疔瘡瘴氣發熱者。

柴胡，黃芩，黃蘗，梔子，木通，赤芍藥，當歸，防風，連翹，大黃，甘草，青木香，紫金皮，雞屎子，詐死子，青王叉，嫩柏根，苦花子，右薄荷生地黃煎服。

㊟切瘴消毒散 治瘴氣腫痛發熱者及因剝割瘴死牛馬豬羊而中其毒者，或因食瘴死之肉而中

其毒者。先服加減通聖散，通利大便，次服此藥。

百丈光即天瓠，又名土人參，苦花子，大小青，金腦香即社茶根，梗葉俱可用，臭木待根，紫金藤，生薑葉，水圪根，烏苞根，嫩柏根，青王叉，山烏豆，雞屎子，晚祥西，狸咬柴，土木香，右薄荷煎服。腫勢甚，加水金鳳水苦齋。手足拘攣，加釣鉤藤根，梭婆子根。發熱，加吉面消毛蕨根。小便不通，加木通，梔子。

㊟青黃消毒散 治疔瘡瘴氣，服涼藥過劑，沉而不發，不退者。

雄黃研，大小青，各一兩，八角茴香五錢。右末，陳酒調服，又以酢和米泔塗患處，一日服三次。

㊟四神丹 治因剝割瘴死牛馬豬羊，不避其氣，以中其毒，或因食瘴死牛馬豬羊之肉者，或手足各

處發疔毒，或起紫泡，或起堆核，初則剝人，次漸腫大，疼痛不可忍，替悶發熱，口渴，煩心，煩四肢強，頭痛，昏花，一切瘴毒，並皆治之。先服此藥，次服切瘴消毒散。

苦花子又名毛連子，又名小葉金雞舌，梗葉俱用，土木香根名青木香，梗名大仙藤，花名馬兜鈴，仙人薯用根，新鮮生者為妙，乾者次之，各二兩。晚蠶砂一兩。右剝碎搗水和糞，粽汁冷服。熱極加芭蕉心，小便不利加琉璃草，又名耳環，尻搗和前藥服之。

奪命散保命集

治疔瘡。

烏頭尖，附子底，蠟梢，雌黃，雄黃，各一錢。蜈蚣一兩，硃砂，粉霜，輕粉，各五分。腦子，麝香，各少許。砒二錢半。右為細末，先破瘡出惡血，以草杖頭用紙帶藥末插入於內，以深為度。

郭氏寸金錠子

治疔毒惡瘡。

硃砂三錢，黃丹，明礬枯，砒霜，輕粉，花蘇，白芨，各錢半。蟾酥，腦子，麝香，各少許。右研極細末，稠糊和為錠子用之。

郭氏提疔錠子

治疔瘡危篤發昏兼治癩癧。

雄黃，硃砂，各二錢。青鹽，砒霜生，白丁香，蟾蜍去翅足，真輕粉，各一錢五分。蟾酥，麝香，各一錢。黃蠟，蓖麻子三七粒。右為細末，於銀器內或磁器，先將蠟鎔化和前藥丸，如桐子大捻作餅子，用針刺破疔瘡，放一餅子於瘡頭上，又刺四邊五七下，惡血出為妙，却用軟膏藥貼之，立驗。內服首功元黑散或蟾酥丸。

郭氏守效散

點疔瘡惡肉。

砒霜生，白丁香，松香，真輕粉，川烏，生礬，各二錢。蜈蚣一條焙乾。右為極細末，鉞針刺破瘡口，令血出，唾津調藥貼之瘡上，其根自潰。

麝香蟾酥丸

治一切癰疽發背疔瘡內毒如未破用針刺破，搥藥在內，膏藥貼之，其瘡即潰。

蟾酥，輕粉，乳香各五分。信，雄黃各一錢。巴豆十箇去皮油，麝香少許，寒水石三錢。右為細末，滴水為丸，作錠子，如小麥粒大，量瘡大小用之，寒食麪糊為丸。

追毒丹

取黃去疔頭，追膿毒立效。

⑤羅氏托裏散 治一切發背疔瘡。厚朴，川芎，防風，桔梗，各二兩。連翹二兩二錢，芍藥，官桂，白芷，甘草節，人參，各一兩。

黃芪兩半，木香，沒藥，乳香，當歸，各半兩。右為細末，每服三錢，酒一大盞，煎二三沸，和查溫服。

⑥連翹黃芪湯 治疔瘡，因食瘴死牛羊，足生大疔，如釘入肉，痛不可忍者。連翹，甘草，右生薑煎服。

金銀花，黃芪，當歸，蜈蚣一條去頭足酒炙，連翹，甘草，右生薑煎服。

⑦羅氏保生錠子 治疔瘡，背疽，癰癧，一切惡瘡。金腳信，輕粉，各二錢。雄黃，硃砂，各三錢。麝香一錢半，蟾酥一錢，巴豆生四十九粒另研。右為細末，

用黃蠟五錢鎔開，將藥和成錠子，冷水浸少時取出，旋丸捏作餅子，如錢眼大，將瘡頭撥開，每用一餅，次用神聖膏，後用托裏散。若瘡氣入腹，危者服破棺丹。世傳疔瘡必有一條紅線，可針紅線所至之處，出血，然後傳藥。

⑧滴滴金 治疔瘡。入言，雄黃，硃砂，各一錢。麝香少許。右為細末，每用些少，先以針刺開瘡頭，貼藥黃水出，效。

硃砂，輕粉，白芷，雄黃，蒼耳子，甘草，各半錢。右為細末，用蟾酥汁和作錠子，如前法用；須五月五日合。

⑨疔瘡錠子 回瘡錠子 治疔瘡大效。草烏頭一兩，蟾酥七粒，巴豆七箇去皮，麝香一字。右為細末，麵糊和就捻如錠子，如有惡瘡腫毒，不痛無

血者，用針深刺至痛處，有血出，以此錠子紐之，上用膏藥貼之，疔瘡四畔紐之，其疔二三日自然拔出。此藥最宜緊用，此證大抵與傷寒頗類，其中亦有可針鑱砭射出血者，亦有久而潰爛出膿者，其間變異百端，不可不慎也。

⑩神聖膏藥 羅氏 治一切惡瘡。

⑤濟生金砂散 取疔瘡。

道人頭微妙存性一兩，即蒼耳子，硃砂三錢半，雄黃三錢，瘡內緋帛封之，數日疔自出。如瘡入腹嘔逆者，蒼耳搗汁飲之。蟾酥以多為妙。右將瘡四圍刺破，油調藥末於

⑥鐵罐膏 治一切惡瘡內毒，此藥止痛，追死肉。

桑柴灰，蕎麥稽灰，石灰各一椀，炭灰少許。右用瓦罐一箇，底旁鑽一穴，塞住，將前項灰填在內，用水注滿，厚紙封固，一伏時，用蘆筒插在罐孔內，淋之，盡其水，不用灰，將淋灰水於鍋內慢火熬，用鐵片續攪，以滴水不散為度，鐵罐盛之，封口，或有諸般瘡及腸風痔漏量瘡用之妙。

⑦又方 用鐵刀點破疔頭，以蟾酥傅之後用。

野菊花，莎草根，甜菜葉。搗細，以無灰酒盡量調服之，酒醒，疔化為水，即痛定，如熱除，不必去疔，亦日愈也。

⑧鐵粉散 專治冷疔瘡經久不效。

多年生鐵三錢炒過，松脂一錢，黃丹飛過，輕粉各五分。麝香少許。右為細末，用清油調搽瘡口，立效。

⑨又方 治疔瘡。

山慈姑，鐵銹，生薑，江茶，鹽少許。用銀針撥開疔瘡，即以前藥搭作餅子，如大棋子，放疔頭上，甚者半月，皮皴可醫，不皴難治矣。

⑩雄黃散 治疔瘡。

雄黃，硃砂，蒼耳草燒灰。右為末，酢調數次，將菊花搗爛薑汁調，清者服之，濃者傅之。

⑪追毒丸 治疔瘡發背。

蟾酥乾者用酒化，硃砂。白丁香，無此味加巴豆。真輕粉，各一錢。雄黃，硃砂為衣，各二錢。蜈蚣酒浸炙乾

黃，巴豆七粒去殼不去油。右總為細末，麪調水為丸，如丸不就，用酒打麵糊為丸，如麥大兩頭尖入於針破口

內，用水沉膏貼之，後用膏藥及生肌藥追出膿血毒物。又如有黑陷漏瘡者，四圍死敗肉不去不生肌者不可治也，

亦用此藥追毒，去死肌敗肉生新肉而愈。小者用一粒，大者加用之，病輕者不必用針，只以手指甲爬動於瘡頂上，

安此藥水沉膏貼之，其瘡即時紅腫為度，去其敗肉為妙。

海馬拔毒散 治疔瘡大效，兼治惡瘡發背。海馬二箇炙，穿山甲黃土炒去土，硃砂，水銀各一錢。麝香，片腦各少許。雄黃三分。右為末，針破瘡

口，點藥入內。一日一點，大有效。

芫花根膏 治魚臍疔瘡久治不瘥者。芫花根一兩，黑豆三合，豬牙皂角五錠，白礬三兩煨研細。右用酢一斗，將前三味先浸三日於釜中，以火

煎至二升，去渣却入鑊中，煎至一升，入白礬末攪令勻，去火成膏，但是魚臍丹惡瘡攤於帛上貼，日二易之。

四聖旋疔散 治疔瘡生於四肢其勢微者，先以好酢調藥塗上，以紙封之，次內服托裏之藥，其疔

自旋出根。巴豆仁五分，白殭蠶，輕粉，硃砂，各二錢半。右為細末，酢調用之。

拔毒散 治疔瘡。鹽白霜，粉霜，膽礬，硃砂，各一錢另研。蜈蚣一條炙。右為末，和勻，先用羊骨針挑破頭，點藥在上，酢糊紙

貼上，其根一時自出。

⑤蟾酥走黃丸 治疔瘡走黃。

硃砂研，黃丹飛，白麪，各等分。右末，取蟾酥搜作劑丸，如麥粒大。先刺瘡口，次安一粒在瘡口內，仍以水沉膏貼之。又以五七丸葱湯吞下，發汗即愈。

⑥迴瘡蟾酥錠子

治疔瘡毒氣攻心欲死，以針刺其瘡，向心行處，但覺痛有血處，下錠子，若累刺至心側近，皆不痛無血者，急針百會穴，痛有血者下錠子，若無血以親人熱血代之，猶十活三四，初發無有不效。大抵疔瘡生於胛背頭項最急，初生痛痒不常，中陷如釘，撼之有根，壯熱惡心是也。

南星，款冬花，

巴豆仁，黃丹，

白信，各一錢。

獨活五分，

蟻螯去頭足十箇。

右爲極細末，用新蟾酥和藥，

如黍米大，搥作錠子。每遇疔瘡，先以針刺其瘡，必不知痛，有血出者，下錠子，如覺痛，不須再用。若更不知痛，再隨瘡所行處，迎奪刺之，至有血知痛即止。其原瘡亦覺疼痛，以膏藥貼之，膿出自瘡。用錠子法，度以銀作細筒子一箇，約長三寸許，隨針下至瘡痛處，復以細銀絲子內藥於筒內，推至痛處。

⑦化毒丸 治內疔。

硃砂，雄黃，各一錢。蟬蛻十枚，硼砂生，輕粉，各五分。麝香一分，片腦半分。右末，蟾酥爲丸，棗豆大。每用一丸，舌上含化取涎，化後以井水漱淨。無此丸，用單蟾酥代之亦可。

蝦蟆糞二分，麻蟲，雄黃，黃丹，各一分。右為末，水丸如米大，將瘡撥開頭，入藥在內，以膏藥貼之。

⑤ 蝮蛇膏 治疔毒。

蝮蛇三箇，肚白者佳，黃麻蟲十箇。右二味，搗勻，撥破患處貼之，如患在手足間，有紅絲，上臂絲盡處將針挑斷出血，仍用前藥。

⑥ 又方 治疔瘡毒氣入腹，昏悶不食。

紫花地丁，蟬蛻，貫仲各一兩，乳香炙，丁香各二錢。右為細末，每服二錢，空心溫酒下。

⑦ 又方 治疔瘡危篤者，二服即愈，輕者一服立效。

土蜂房一小窠全，蛇蛻一條全。右作一處，器皿中盛，用黃泥封固，火煨存性，研為細末。每服一錢，空心好酒調服，少頃腹中大痛，痛止，其瘡已化黃水矣，仍服五聖散。

⑧ 五聖散

大黃，甘草，各一兩。生薑，皂角針，金銀花，各二兩。苦蕒一箇。右咬咀，用好酒二升同煎至八分，去渣不拘時服。

⑨ 破棺丹 治疔黃走廕不止。

當歸，赤芍藥，山梔子，牽牛，各二兩半。連翹，牡蠣，金銀花，紫花地丁，各一兩半。京三稜，甘草，各二兩。便秘加大黃三兩。右為細末，煉蜜和丸，如彈子大。每服一丸，食前用童便化開服。忌飲酒及生冷硬物。

⑩ 立馬回疔丹 治疔瘡走廕不止。

金脚信，蟾酥，血竭，硃砂，沒藥，各半錢。輕粉，龍腦，麝香，各一字。右為細末，用生草烏汁和，如麥子

醫部彙考三百六十六

外科癰疽疔毒門八

單方

遠志酒，治一切癰疽、發背、癰毒惡候，潰有死血，陰毒在中則不痛，傳之即痛；有憂怒等氣積而內攻，則痛不可忍，傳之即不痛，或蘊血在內熱逼人，手不可近，傳之必清涼，或氣虛血冷，潰而不斂，若七情內鬱，治之必愈。遠志不以多，少，泔浸，搗去心，曬乾為末，酒一盞，調末三錢，澄清飲之，以滓傳於患處。

忍冬藤酒，治食膏粱炙博過多，及服金石補藥日久，發疽預服免患。忍冬藤鮮者五兩，乾者一兩，大甘草節一兩，作一劑，用水三鍾，煎至二鍾，入無灰好酒一鍾，再煎十餘沸，去粗分三次服。能飲酒者一次服。另取藤搗爛，酒調塗患處，中留頭出毒乾再搽。一方無甘草節。

槐花酒，治發背一切瘡毒，不問已成未成，但焮痛者並治之。槐花四五兩，微炒黃，乘熱入酒二鍾，煎十餘沸，去粗熱服，未成者二三服，已成者一二服。

癰疽瘡腫，名金鍼散，皂角針春取一半新採，一半黑者一味，不拘多少，曬乾為末，食後酒調二三錢服。

癰疽腫痛無頭，用貝母穿山甲，天花粉共為末，每服三錢，水二鍾，煎半鍾，一日四服，其毒自在大小便下矣，可與前

圖書集成醫部全錄 卷三百六十五 彙考三百六十五 癰疽疔毒門七

三二

一切癰腫伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可外臺說委下同

癰疽出汁著手足肩背累累如米用竈突墨竈屋塵釜下土研勻水一斗煮三沸取汁洗日三四度。

石癰不膿梁上塵葵根莖灰等分用酢和傅之千金方

惡癰腫毒痛鉛白霜一分甘草半生半熟為末綿裹含嚙聖惠方

骨疽出骨一名多骨瘡又時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交合感其精氣故有多骨之名以密陀僧末

桐油調勻攤貼之即愈壽域方

雌雄疔瘡用鐵粉一兩蔓青根三兩搗如泥封之日二換集元方

疔腫拔根用鐵查一兩輕粉一錢麝香少許為末針畫十字以點藥入內酢調麪糊傅之神效普濟方

疔腫初起多年土內鏤釘火煨酢焯刮下鏤末不論遍次鍛取收之每用少許人乳和挑破傅之仍炒研二錢以蜜

水煎滾待冷調服普濟方下同

癰疽楊梅諸惡瘡水銀一兩硃砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈瓊蓋定鹽泥固濟文武火煉升

罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分洒太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜。

魚臍疔瘡四面赤中央黑銀硃水和丸每服一丸溫酒下名走馬丹。

疔瘡惡毒刺四邊及中心以雄黃末傅之神驗。

一方用雄黃蟾酥各五分為末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂插入甚妙。

手足甲疽熏黃蛇皮等分為末以水洗淨割去甲入肉處傅之一頃痛定神效近效方

癰疽瘰癧石灰半斤蕎麥稽灰半斤淋汁煎成霜密封每以針畫破搽之自愈。

疔瘡惡腫石灰半夏等分研末塗之普濟方下同

方合爲一貼。

一切癰疽能消腫逐毒，使毒不內攻，其效不可具述，名國老膏。用甘草大者二斤搥碎，河水浸一宿，揉令漿汁濃，去盡筋滓，再用絹濾過。銀石器內慢火熬成膏，用器收之，每服一二匙，無灰酒或白湯亦可。曾服燥藥丹劑者亦解之。本事方每甘草一斤分作三服，溫酒調下，今云一二匙，忍力少也。

截癰疽惡瘡發險處服之，使毒氣不攻於內，名牛膠飲。用牛膠通明者四兩，用酒一椀，入膠內，重湯煮鎔透，攪勻傾出，更浸酒隨意飲，能飲者以醉爲度。此方活人甚多。

黃礬丸服過一兩已上，無不取效，最止疼痛，不傷臟腑，活人不可勝數。用白礬一兩，黃蠟半兩，右和丸，如桐子大，每服十九丸，漸加至五十九丸，溫酒送下，如未破即消，已破即合。一日服百粒則有效，能防毒氣內攻，尤能護膜，始終須服半斤，瘡愈後服之尤佳。一方用明礬飛過研細，以雞子二箇取清，調礬末稀稠如糊，用無灰陳好酒化開服之，膿未成者即消，已成膿者從大小便出神效，其功大勝黃礬丸。

一切瘡腫，牛蒡根三莖洗淨，煮令爛，於盆中研令細，去筋膜，汁中卽下米煮粥，鹹淡任性，服一椀甚良，無忌，名牛蒡粥。

豬牙皂角，去皮，如法酢炙焦黃爲末，每服半錢，加穿山甲全者，看患人證在何處，就取此處甲，用以蛤粉炒爲末一錢，與皂角末相和，溫酒調下，證在上食後服，證在下食前服，神效，名破毒無比散。

一切無名腫毒瘡癰，貝母一味去心，切細，一半生曬，一半微炒，和勻爲末，病在上食後服，病在下食前服，酒調一二錢，名消毒散。

神效葱熨法，治流注結核骨癰鶴膝等證，腫硬或先已隔蒜灸而餘腫未消，最宜用熨以助氣血而行壅滯，其功甚大，又爲跌撲傷損止痛散血消腫之良法，用葱白頭搗爛炒熱熨患處，冷再換。

疔瘡腫毒，白芨末半錢，以水澄之，去水，攤於厚紙上貼之。袖珍方。

癰疽腫毒，黃連、檳榔等分爲末，雞子清調搽之。簡易方。

癰疽瘡腫，已潰未潰，胡黃連、穿山甲、燒存性等分爲末，以茶或雞子清調搽之。簡易方。

瘡口不合，秦芫爲末，摻之。直指方。

癰疽、疔瘡、惡瘡及黃疽、慈姑連根、同蒼耳草等分搗爛，以好酒一鍾，濾汁溫服，或乾之爲末，每酒服三錢。乾坤生意。

癰疽疔腫，一切惡瘡，金絲草、忍冬藤、五葉藤、天蕎麥等分，煎湯溫洗，黑者加酢。

又鐵箍散，用金絲草灰二兩，酢拌曬乾，貝母五兩去心，白芷二兩爲末，以涼水調貼瘡上，香油亦可，或加龍骨少許。

諸瘡腫痛，撫芎煨，研入輕粉，麻油調塗。普濟方。

疔瘡初起，白芷一錢，生薑一兩，搗酒一瓊，溫服，取汗卽散。袖珍方。

癰疽赤腫，白芷、大黃等分爲末，米飲服二錢。經驗方。

一切癰疽、瘡癤、惡瘡下痒，腫瘡潰後，外傷風寒，惡汁臭敗不斂，並主之，木香、黃連、檳榔等分爲末，油調頻塗之，取效。

和劑局方。

疔腫諸毒，荆芥一握切，以水五升，煮取二升，分二服，冷飲。藥性論。

一切瘡疥，荆芥末以地黃自然汁熬膏，和九梧子大每服三五丸，茶酒任下。普濟方。

熱毒瘡腫，秋後收連錢草，陰乾爲末，水調傅之，生搗亦可。寇氏衍義。

疔腫垂死，菊花一握，搗汁一升，入口卽活。此神驗方也，冬月采根。肘後方。

癰疽疔腫，一切無名腫毒，用野菊花連莖搗爛，酒煎熱服，取汗，以查傅之卽效。集效方。

又方，用野菊花莖葉，蒼耳草各一握，共搗入酒一碗，絞汁服，以查敷之，取汗卽愈。或六月六日，采蒼耳葉，九月九日

疔瘡發背，白浮石半兩，沒藥二錢半為末，酢糊丸，梧子大，每服六七丸，臨臥冷酒下。

疔腫熱毒，慈石末酢和封之，拔根立出。外臺祕要

甲疽腫痛，石膽一兩，燒煙盡，研末傅之，不過四五度瘥。梅師方。

疔毒腫痛，白薑石末和雞子清傅之，乾即易疔，自出神驗。崔氏方。

潰癰作癢，以鹽摩其四圍即止。外科精義。

疔瘡腫毒，好硃砂，雄黃等分研，以銀篋挑破瘡口，擠去惡血，安藥一豆入內，紙花貼住，即效。毒氣入腹，嘔吐者，服護

心散。瑞竹堂方。

癰疽不合，石硫黃以筋蘸插入孔中，以瘥為度。外臺祕要。

疔瘡腫毒，雪白礬末五錢，葱白煨熟搗和丸，梧子大，每服二錢五分，以酒送下，未效再服。久病孕婦不可服。衛生寶鑑。

魚睛疔瘡，枯礬末，寒食麵糊調貼，消腫無膿。崔氏方。

疔腫惡瘡，二仙散用生礬，黃丹臨時等分，以三稜針刺血，待盡傅之，不過三次決愈。衛生寶鑑。

諸般癰疽，用甘草三兩微炙，切以酒一斗同浸瓶中，用黑鉛一片鎔成汁，投酒中，取出，如此九度，令病者飲酒至醉，寢後即愈也。

又方。甘草一大兩，火炙擣碎，水一大升浸之，器上橫一小刀子，露一宿，平明以物攪令沫出，去沫服之，但是瘡腫發

背皆效。

又方。用甘草三大兩，生搗篩末，大麥麩一兩，和勻，取好酥少許入內，下沸水，搜如餅狀，方圓大於瘡一分，熱傅腫上，

以細片及故紙束之，仍令通風，冷則換之，已成者膿水自出，未成者腫使內消，仍喫黃芪粥為妙，神效。

些小癰癤，發熱時即用粉草節曬乾為末，熱酒服一二錢，連進數服，痛熱皆止。外科精要。

發背疔瘡，豨薟草，五葉草，卽五爪龍，野紅花，卽小薊，大蒜等分，搗爛入熱酒一椀，絞汁服得汗立效。乾坤生意

丁瘡腫毒，端午采豨薟草，暴乾爲末，每服半兩，熱酒調下，汗出卽愈，極有效驗。集簡方

癰疽惡肉，白炭皮，白荻灰等分，煎膏塗之，蝕盡惡肉，以生肉膏貼之，亦去黑子。此藥只可留十日，久則不效。肘後方

癰疽疔腫，惡肉，地黃三斤，水一斗，煮取三升，搗敷之，或去查煎稠塗紙上貼之，日三易。

癰癩已潰，用牛膝根略刮去皮，插入瘡口中，留半寸在外，以嫩橘葉及地錦草各一握，搗其上，牛膝能去惡血，二草

溫涼止痛，隨乾隨換，有十全之功也。經驗方

癩疽惡毒，肉中忽生一蠶子，大如豆粟，或如梅李，或赤，或黑，或白，或青，其蠶有核，核有深根，應心能爛筋骨，毒入臟

腑卽殺人，但飲葵根汁，可解其熱毒。集驗方

癰腫無頭，三日後取葵子一百粒，水吞之，當日卽開也。一云只吞一粒卽破，如吞兩粒，卽有兩頭也。一方葵子爲末，

水調敷之。

腸胃生癰，懷忠丹治內癰，有敗血，腥穢殊甚，臍腹冷痛，用此排膿下血，單葉紅蜀葵根，白芷各一兩，白枯礬，白芍藥

各五錢爲末，黃蠟鎔化和丸，梧子大，每空心米飲下二十九，待膿血出盡，服十宣散補之。皆效方

諸瘡腫痛不可忍者，葵花根去黑皮搗爛，入井華水調稠貼之。普濟方

癰疽腫毒，黃蜀葵花用鹽摻收瓷器中，密封經年不壞，每用傅之，自平自潰，無花用根葉亦可。直指方

便癰初起，黃葵子七七粒，皂角半挺爲末，以石灰同酢調塗之。永類鈴方

癰腫無頭，龍葵莖葉搗傅。經驗方

發背癰腫成瘡者，龍葵一兩爲末，麝香一分，研勻塗之，善。

一切癰疽發背惡瘡，用蝦蟆一箇，同老鴉眼睛草莖葉搗爛敷之，卽散，神效。一方無蝦蟆。

采野菊花爲末，每酒服三錢亦可。易簡方。

疔瘡腫毒，艾蒿一擔燒灰，於竹筒中淋取汁，以一二合和石灰如糊，先以針刺瘡至痛，乃點藥三遍，其根自拔，神驗。
千金方。

癰疽不合，瘡口冷滯，以北艾煎湯洗後，白膠香熏之。直指方。

一切癰瘡，婦人妬乳，乳癰，小兒頑瘡，及浸淫黃爛，熱瘡，疥癬，陰蝕，並用天麻草切五升，以水一斗半煮一斗，分數次洗之以殺痒。千金方。

急慢疔瘡，用益母草搗爛傅之，仍絞汁五合服卽消。又方，用益母草四月連花采之，燒存性，先以小尖刀十字劃開疔根，令血出；次透根開破捻出血拭乾，以稻草心蘸藥熬入瘡口，令到底，良久當有紫血出，捻令血淨，再熬藥入，見紅血乃止。一日夜熬藥三五度，重者二日根爛出，輕者一日出，看瘡根腫脹起卽是根出，以針挑之，出後仍敷藥，生肌易愈，忌風寒，房室，酒肉，一切毒物。

丁瘡惡腫，千針草四兩，乳香一兩，明礬五錢爲末，酒服二錢，出汗爲度。

癰疽發背，初起未成者，芋根熟搗傅上，日夜數易，腫消卽瘥。圖經本草。

諸瘡腫毒，牛蒡根五莖洗煮爛搗汁，入米搗服，食一椀甚良。普濟方。

積年惡瘡，反花瘡，漏瘡不瘥者，牛蒡根搗和臘月豬脂，日日封之。千金方。

一切丁腫危困者，蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升，日三服，拔根甚驗。

又方，用蒼耳根苗燒灰和酢塗之，乾再上，不十次卽拔根出。

又方，蒼耳根三兩半，烏梅肉五箇，連鬚葱三根，酒二鍾煎一鍾，熱服取汗。邵真人方。

疔瘡腫毒，地菘並浮酒糟同搗，傅之立效。集效方。

疔瘡腫毒，紫花地丁搗汁，服危極者亦效。

又方。用葱頭生蜜共搗貼之，若瘤瘡，加新黑牛屎。

腫毒初起，大黃五倍子黃蘗等分爲末，新汲水調塗，日四五次。簡便方。

癰腫焮熱作痛，大黃末酢調塗之，燥即易，不過數易即退，甚驗，神方也！

一切毒腫，商陸根和鹽少許搗傅，日三易之。千金方。

石癰如石，堅硬不作膿者，生商陸根搗擦之，燥即易，取軟爲度，亦治濕漏諸癰瘡傷。

瘡傷水毒，商陸根搗炙，熱布裏熨之，冷即易之。千金方。

緩疽腫痛，藺茹一兩爲散，溫水服二錢。聖惠方。

石癰堅硬，不作膿者，葇荑子爲末，酢和傅瘡頭，根即拔出。千金方下同。

癰疽腫毒，以烏頭炒，黃蘗炒各一兩爲末，唾調塗之，留頭，乾則以米泔潤之。

癰疽肉突，烏頭五枚，濃酢三升，淹五日，洗之，日夜三四度。古今錄驗。

疔瘡腫痛，酢和附子末塗之，乾，再上。千金方。

疔毒初起，草烏頭，川烏頭各三箇，杏仁九箇，飛羅麪一兩，爲末，水調搽留口，以紙蓋之，乾以水潤之。經驗方。

疔毒惡腫，生烏頭切片，酢熬成膏，攤貼，次日根出。

又方。兩頭尖一兩，巴豆四箇，搗貼，疔自拔出。普濟方。

疔瘡發背，草烏頭去皮爲末，用葱白連鬚和搗，丸豌豆大，以雄黃爲衣，每服一丸。先將葱一根細嚼，以熱酒送下，或

有惡心嘔三四口，用冷水一口止之，即以被厚蓋，汗出爲度，亦治頭風。乾坤謬鑑。

惡毒諸瘡及發背、疔瘡、便毒等證，二烏膏用草烏頭，川烏頭於瓦上，以井華水磨汁塗之，如有口即塗諸四邊，乾再上，亦可單用草烏磨酢塗之。

疔腫毒瘡黑色焮腫者，乃服丹石毒也，赤色者肉麪毒也，用龍葵根一握洗切，乳香末黃連三兩，杏仁六十枚，和搗作餅厚如三錢，依瘡大小傅之，覺痒即換去，痒不可忍，切勿搔動，候焮久瘡中似石榴子戢戢然，乃去葉時時以甘草湯溫洗，洗後以蠟貼之，終身不得食羊血，如無龍葵，以蔓菁根代之。聖濟總錄。

魚臍疔瘡，瞿麥燒灰，以油和傅之甚佳。崔氏方。

疔腫初起，王不留行子為末，蟾酥丸黍米大，每服一九，酒下，汗出即愈。

發背癰毒，痛不可忍，龍牙草即馬鞭草搗汁飲之，以查傅患處。

疔瘡惡腫，五月五日收旱蓮草陰乾，仍露一夜收，遇疾時嚼一葉貼上，外以消毒膏護之，三二日疔脫。聖濟總錄。

癰疽腫毒，連翹草及根各一升，水一斗六升，煮汁三升服，取汗。外臺祕要。

癰腫惡肉不消者，蒲葶灰石灰各淋取汁，合煎如膏，傅之能蝕惡肉，亦去痣疵，此藥過十日，即不中用。千金方。

惡瘡痂痒作痛，蕭竹搗封，痂落即瘥。肘后方。

一切疔腫，蒺藜子一升，熬搗，以酢和，封頭上拔根。外臺祕要。

諸瘡腫毒，蒺藜蔓洗三寸截之，以水五升煮取二升，去查納銅器中，又煮取一升納小器中，煮如飴狀，以塗患處。千金方。

一切癰疽，及腸癰、奶癰，赤腫未破，或已破，而膿血不散，發熱疼痛能食者，並宜排膿托裏散，用地蜈蚣赤芍藥、當歸、

甘草等分為末，每服二錢，溫酒下。和劑局方。

癰疽惡瘡，紫花地丁連根，同蒼耳葉等分搗爛，酒一鍾攪汁服。經驗方。

癰疽發背，無名諸腫，紫花地丁草三伏時收，以白麪和成鹽酢浸一夜貼之。昔有一尼，患發背，夢得此方，數日而瘥。

集效方。

一切惡瘡，紫花地丁限日乾，以確盛燒烟，封瘡熏之，出黃水取盡愈。易簡方。

一切癰疽馬蹄草即萐菜春夏用莖冬月用子就於根側尋取搗爛傅之未成即消已成即毒散用菜亦可保生餘種疔瘡馬蹄草又名缺盆草大青葉臭紫草各等分搗爛以酒一碗浸之去查溫服三服立愈經驗良方

熱毒腫并丹毒但取渠中藻菜切搗傅之厚三分乾即易甚效無比。

熱毒丹瘡千金方用慎火草搗汁拭之日夜拭一二十遍一方入苦酒搗泥塗之乾則易。

一切腫毒野園萎一把穿山甲燒存性七分當歸尾三錢搗爛入酒一碗絞汁服以查傅之集簡方

瘡瘍刺骨草血竭搗卷之自出本草權度

一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日即消。

治疔瘡如櫻桃者用佛掌花根同生薑蜜研汁服之外以天茄葉貼之。

疔腫惡瘡胡麻燒灰針砂等分爲末酢和傅之日三普濟方

癰瘡不合烏麻炒黑搗傅之千金方

癰疽發背初作即以麻油一斤銀器煎二十沸和醇酢三碗分五次一日服盡直指方

腫毒初起麻油煎葱惹黑色趁熱通手旋塗自消可一選方

疽瘡有蟲生麻油查貼之綿裏當有蟲出千金方

一切疔腫麪和臍豬脂封之良梅師方

癰疽發背一切腫毒蕎麥麪硫黃各二兩爲末并華水和作餅曬收每用一餅磨水傅之痛則令不痛不痛令痛即愈直指方下同

瘡頭黑凹蕎麥麪煮食之即發起。

赤根疔腫白粉熬黑和蜜傅之千金方

癰疽發背稷米粉熬黑以雞子白和塗練上剪孔貼之乾則易神效葛氏方

癰腫初起，芫花末和膠塗之。千金方。

癰癤已潰，芫花根皮搓作捻插入，則口不合，令膿易竭也。

癰瘡未潰，茵草一兩為末，雞子白調塗帛上貼之，日二易，取痛為良。

癰腫初起，苦蕒根苦酒熬燥搗篩，以苦酒和塗紙上貼之。

諸般癰腫，新掘天門冬三五兩洗淨，沙盆搗細，以好酒濾汁頓服，未效再服必愈。醫學正傳。

癰疽毒瘡，赤何首烏不限多少，瓶中文武火熬煎，臨熟入好無灰酒相等，再煎數沸，時時飲之。其查焙研為末，酒煮

麪糊丸，梧子大，空心溫酒下三十九丸。疾退，宜常服之。外科精要。

疔瘡發背初起，水調白蘗末塗之。肘后方。

一切癰腫，白蘗二分，藜蘆一分為末，酒和貼之，日三上。

諸瘡不斂，白蘗、赤蘗、黃蘗各三錢，炒研，輕粉一錢，用葱白漿水洗淨傅之。

癰腫不散，生白藥根搗貼，乾則易之，無生者研末，水和貼。圖經本草。

一切癰疽初起，不問發於何處，用木蓮四十九箇，搯去毛，研細解開溫服，功與忍冬草不相上下。外科錄要。

疔瘡黑凹，用髮繩割住，將尖葉薜荔搗汁，和蜜一錢服之，外以葱蜜搗傅四圍。聖惠方。

一切腫毒，不問已潰未潰，或初起發熱，用金銀花俗名甜藤，采花連莖葉自然汁半盞，煎八分服之，以查傅上，敗毒

托裏，散氣和血，其功獨勝。疔瘡便毒，喉痹，乳蛾方皆同。積善堂方。

敷腫拔毒，金銀藤大者燒存性，葉焙乾為末，各三錢，大黃焙為末四錢，凡腫毒初發，以水酒調搽四圍，留心洩氣。經驗方。

癰疽發背，生苧蒲搗貼之，瘡乾者為末，水調塗之。

腫毒初起，水中萍子草搗傅之。肘后方。

有勝效。其白似乳，服之不可忍，夕以金車初頭入四時，以白芷、滑石、川椒。

疔瘡初起，不拘已成未成，用翻白草十科，酒煎服，出汗即愈。

疔毒作痛，魚腥草搗爛，傅之，痛一二時不可去，草痛後一二日即愈。

疔瘡惡腫，野灰、薤菜、葉燒灰，撥破瘡皮，唾調少許，點之，血出為度。

腫毒初起，帶泥山藥、蓖麻子、糯米等分，水浸研，傅之即散也。普濟方。

熱毒瘡腫，生茄子一枚，割去二分，去瓢二分，似罐子形，合於瘡上即消也。如已出膿，再用取瘡。聖濟總錄。

癰疽不斂，瘡口太深，用絲瓜搗汁，頻抹之。直指方。

諸瘡久潰，絲瓜兒根熬水掃之，大涼即愈。應驗方。

疔腫難拔，黑牯牛拋糞在地，待生菌子焙乾，豬荳草等分為末，以竹筒去兩頭，緊縛合住疔上，用水和末一錢，入筒內，少頃沸起，則根拔出，未出再作二三次。醫學正傳。

諸瘡腫痛，杏仁去皮研濾取膏，入輕粉、麻油調搽，神效。鮑氏。

癰疽瘡腫已潰未潰，皆可用鹽白梅燒存性為末，入輕粉少許，香油調塗四圍。簡易方。

卒得惡瘡，人不識者，桃皮作屑納之。孫真人方。

諸瘡久壞不愈者，棗膏三升，煎水噴洗取愈。

疔腫惡毒，以針刺四畔，用榴皮著瘡上，以麪圍四畔灸之，以痛為度，仍內榴末，傅上，急裏經宿，連根自出也。肘后方。

一切癰腫，背癰、附骨疽未成膿者，核桃十箇，煨熟去殼，槐花一兩研末，杵勻，熱酒調服。古今錄驗。

疔瘡惡腫，核桃一箇平破，取仁嚼爛，安殼內，合在瘡上，頻換甚效。普濟方。

石癰堅硬如石，不作膿，用橡子一枚，以酢於青石上磨汁塗之，乾則易，不過十度即平。千金方。

疔瘡惡腫，用荔枝五箇或三箇，不用雙數，以狗糞中米淘淨為末，與糯米粥同研成膏，攤紙上貼之，留一孔出毒氣。

疔瘡惡腫，小豆花末傅之。

瘡腫傷風，中水痛劇者，黍稷燒烟熏，令汗出愈。千金方。

石癰諸癰，赤小豆五合，納苦酒中五宿，炒研以苦酒和塗，即消，加苦蕒根等分。范注方。

癰疽初作，赤小豆末水和塗之，毒即消散，頻用有效。小品方。

服硫發癰，酢和鼓研膏傅之，燥則易。千金方。

一切腫毒，葱汁漬之，日四五度。

疔瘡惡腫刺破，以老葱生蜜杵貼兩時，疔出，以酢湯洗之，神效。聖濟總錄。

瘡犯惡露，甚者殺人，薤白搗爛，以帛裹煨熱，去帛傅之，冷即易換，亦可搗作餅，以艾灸之，熱氣入瘡，水出即瘥也。梅師方。

師方。

一切惡瘡，熬鼓研傅之，不過三四次出。楊氏產乳。

魚臍疔瘡，寒食錫塗之，良，乾者燒灰。千金方。

風熱腫毒，蓼蘆苗葉根，蔓菁根各三兩為末，以雞子清和貼之，即消，無蔓菁即以商陸根代之甚效。近效方。

癰疽不潰，苦酒和雀屎如小豆大傅瘡頭上，即穿也。肘后方。

癰疽初起，乾薑一兩炒紫，研末酢調，傅四圍留頭，自愈，奇方也。諸證辨疑。

惡毒癰腫，或連陰卵脾間，疼痛攣急，牽入小腹，不可忍，一宿即殺人者，用茴香苗葉搗汁一升服之，日三四服，其查

以貼腫上，冬月用根。此是外國神方，永嘉以來，用之起死回生，神效。

一切腫毒，松香八兩，銅青二錢，蓖麻切五錢，同搗作膏攤貼。

疔瘡腫毒，馬齒菜二分，石灰三分，為末，雞子白和塗之。

疔瘡腫毒，野苧黃烏汁一盞，入薑汁一匙，和酒服，以查傅一二次，即愈。

者二三服，已成者一二服效。

疔腫惡瘡，皂角去皮酥炙焦爲末，入麝香少許，人糞少許，和塗五日後，根出。普濟方。

便癰初起，皂角子七箇，研末傅之。一方照年歲吞之。儒門事親。

腹內生瘡，在腸臟不可藥治者，取皂角刺不拘多少，好酒一壺，煎至七分溫服，其膿血悉從小便中出，極效；不飲酒者，水煎亦可。經驗方。

瘡腫無頭，皂角刺燒灰，酒服三錢，嚼葵子三五粒，其處如針刺爲效。

卒生惡瘡，不可名識者，柳葉或皮水煮汁，入少鹽頻洗之。肘后方。

一切惡瘡，巴豆三十粒，麻油煎黑，去豆，以油調硫黃輕粉末，頻塗取效。

癰疽惡肉，一切瘡毒，巴豆仁炒黑研膏，點痛處，則解毒塗瘀肉上則自化，加乳香少許亦可；若毒深不能收斂者，宜

作撚紐之，不致成痛。外科精義。

石癰堅硬，不作膿者，蜀桑白皮陰乾爲末，烱膠和酒調傅，以軟爲度。千金。

癰口不斂，經霜黃桑葉爲末傅之。直指方。

癰疽癰毒，狗頭骨灰，堇藎子等分爲末，水和傅之。千金。

惡瘡不愈，狗頭骨灰，同黃丹末等分傅之。壽域方。

長肉生肌，老狗頭腦骨瓦炒二兩，桑白皮一兩，當歸二錢半爲末，麻油調敷。直指方。

癰瘡大痛，壁虎焙乾研末，油調傅之，即止。醫方摘要。

癰疽不合，破蒲席燒灰，臘月豬脂和，納孔中。千金下同。

內癰未成，取伏雞尿水和服，即瘥。

又方。用荔枝肉、白梅各三箇，搗作餅子，貼於瘡上，根卽出也。

瘡腫作痛，生椒末、釜下土、蕎麥粉等分，研酢和傅之。

腸癰已成，小腹腫痛，小便似淋，或大便難澀，下膿，用甜瓜子一合，當歸炒一兩，蛇退皮一條，咬咀，每服四錢，水一瓊半煎一瓊，食前服，利下惡物妙。聖惠。

一切腫毒，野葡萄根曬研爲末，水調塗之，卽消也。

諸般癰腫，按毒止痛，荷葉中心蒂如錢者，不拘多少，煎湯淋洗，拭乾，以飛過寒水石同臘豬脂塗之。

毒腫入腹，雞舌香、青木香、薰陸香、麝香各一兩，水四升，煮二升，分二服。

癰疽惡肉，丁香末傅之，外以膏藥護之。怪謬奇方。

癰疽惡毒，番降末、楓乳香等分爲末，熏之，去惡氣甚妙。集簡方。

一切惡瘡，用白膠香、瀝青各一兩，以麻油、黃蠟各二錢半，同鎔化，入冷水中，扯千遍攤貼之。儒門事親。

惡瘡疼痛，楓香、膩粉等分爲末，漿水洗淨貼之。

癰疽寒顫，乳香半兩，熟水研服，顫發於脾，以乳香能入脾故也。直指方。

收斂瘡口，血竭末一字，麝香少許，大棗燒灰半錢，同研津唾調塗之。

癰疽腫毒，黃蘗皮炒，川烏頭炮，等分爲末，唾調塗之，留頭，頻以米泔水潤濕。集簡方。

斂瘡生肌，黃蘗末、麵糊調塗效。宣明方。

一切毒腫，不問硬軟，取楸葉十重，傅腫上，舊帛裹之，日三易之，當重重有毒氣爲水，流在葉上，冬月取乾葉鹽水浸

軟，或取根皮搗爛傅之，皆效。止痛消腫，化膿血，勝於衆藥。東陽方。

癰疽發背，大如盤，臭不可近，桐葉酢蒸貼上，退熱止痛，漸漸生肉收口，極驗祕方也。醫林正宗下同。

癰腫熱毒家芥子末同柏葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙。千金翼下同

一切癰腫猪膽汁和芥子末貼之日三上猪脂亦可。

疔腫惡毒蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效。或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅即時毒散大有神效。時珍

一切疔瘡及無名腫毒惡瘡用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同搗如泥貼之立效。經驗方

又方麻蟲即蒼耳草內蟲炒黃色白殭蠶江茶各等分爲末蜜調塗之。總錄

又方用蒼耳節內蟲四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈。

疔瘡毒腫不破則毒入腹用蟬蛻炒爲末蜜水調服一錢外以津和塗之。雜纂

又方用蟬蛻殭蠶等分爲末酢調塗瘡口四圍候根出拔去再塗。大成

一切惡瘡及沙蝨水弩惡疽五月五日取蜣螂蒸過陰乾爲末油和傅之。聖惠

疔腫惡瘡楊柳上大烏殼硬蟲或地上新糞內及泥堆中者生取以蜜湯浸死新瓦焙焦爲末先以針燒過針撥開

好酢調傅之。普濟方

無名惡瘡忽得不識者用死蜣螂杵汁塗之。廣利

疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥五分巴豆仁一枚粉霜雄黃

麝香少許先以八角兒研如泥入鎔化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子

麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回即止不必再用也。忌冷水如針破無血係是箸骨疔即男左女右中指甲

末刺出血糊藥又無血即刺足大拇糊藥如都無血必難醫也。

疔腫有根用大針刺作孔削蔓菁根如鍼大染鐵生衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗於上有膿出即易

須臾根出立瘥。忌油膩生冷五辛粘滑陳臭。肘後方下同

凡諸般惡瘡，取東牆上土，及大黃等分爲末，用無根井華水調搽，乾則再上。瑞竹堂方下同。

一切惡瘡，取燕窠內外泥糞研細，油調搽。一加黃蘗末。

凡惡瘡腫毒，用松木上白蟻泥同黃丹各炒黑研，和香油塗之。

無名惡瘡，梁上倒掛塵二條，非地蚯蚓糞少許，生蜜和捻作餅，如錢大，陰乾，用蜜水調頻傅之。簡便方。

諸般毒瘡，用門白塵切蒜蘸擦，至出汗卽消。

瘡傷水濕，胡粉炭灰等分，脂和塗孔上，水卽出也。千金方。

蛇皮惡瘡，鐵漿頻塗之。談野翁方。

一切惡瘡，雲母和傅之。千金方。

惡肉毒瘡，一女人十四，腕軟處生物如黃豆大，半在肉中，紅紫色，痛甚，諸藥不效。一方士以水銀四兩，白紙兩張，揉

熟蘸水銀擦之，三日自落而愈。應急良方。

日久頑瘡不收者，銀硃一錢，千年地下石灰五分，松香五錢，香油一兩爲末，化攤紙上貼之。積德堂方。

廣東惡瘡，雄黃一錢半，杏仁三十粒去皮，輕粉一錢爲末，洗淨，以雄豬膽汁調上，二三日卽愈，百發百中。

多年惡瘡，多年石灰研末，雞子清和成塊，煨過再研，薑汁調傅。救急方。

諸般腫毒，吸鐵石三錢，金銀藤四兩，黃丹八兩，香油一斤，如常熬膏貼。

一切癰疽發背，無名腫毒，年少氣壯者，用黑白牽牛各一合，布包搥碎，以好酢一椀熬至八分，露一夜，次日五更溫

服，以大便出膿血爲妙，名濟世散。張三丰仙方。

癰腫癩毒潰爛疼痛，用薔薇皮更炙熨之。千金方。

年深惡瘡，無心草根，乾薑各二錢，釣苔根五錢，爲末摻之。外科精義。

瘡直不出，紅花子紫草各半兩，罌說二錢半，水鍾半煎減半量大小加減服。傷寒論。

疔瘡惡腫，牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之，又治馬鞍瘡神效。聖惠
魚臍疔瘡似新火針瘡，四邊赤，中心黑，可刺之；若不大痛即殺人。用臘月魚頭灰髮灰等分，以雞溏屎和塗之。千金方。

疔瘡惡腫，黑牛耳垢敷之。聖惠方。

疔腫未破，白馬齒燒灰，先以針刺破，乃封之，用濕麪圍腫處，酢洗去之，根出大驗。肘後方。

赤根疔瘡，馬牙齒搗末，臘豬脂和敷，根即出也。燒灰傅之，亦可愈。千金方。

疔腫傷風作腫，以馬屎炒熨瘡上五十遍，極效。聖惠方。

疔瘡中風腫痛，用驢屎炒熨瘡上五十遍，極效。普濟方。

腫毒初起，敗龜板一枚燒研，酒服四錢。

疔瘡惡腫，用田螺入冰片化水點瘡上。普濟方。

繞指毒瘡，生手足指上，以活田螺一枚生用，搗碎傅之即愈。多能鄙事。

疔瘡惡腫，十二月豬膽風乾，和生葱搗傅。普濟方。

拔取疔黃蟾酥以麪丸，梧子大，每用一丸安舌下，即黃出也。青囊雜要。

拔取疔毒蟾酥以白麪黃丹搜作劑，每丸麥粒大，以指爬動瘡上，插入，重者挑破納之，仍以水澄膏貼之。危氏方。

疔瘡惡腫，蟾酥一錢，巴豆四箇，搗爛飯丸錠子，如菉豆大，每服一丸薑湯下。良久以蕭蓄根黃荊子研，酒半椀服，取

行四五次以粥補之。乾坤祕鑑。

一切瘡毒，蟾酥一錢，白麪二錢，朱砂少許，井華水調成小錠子，如麥大，每用一錠，井華水服，如瘡勢緊急，五七錠，葱湯亦可，汗出即愈。

天行熱毒，攻手足，腫痛欲斷，用母猪蹄一具去毛，以水一斗，葱白一握煮汁，入少鹽漬之。

癰疽不斂，不拘發背一切瘡，用鼈甲燒存性研搽，甚妙。怪證奇方。

腸癰內痛，鼈甲燒存性研，水服一錢，日三。傳信方。

癰腫未成，用此拔毒，水調牡蠣粉末塗之，乾更上。集驗方。

癰疽赤腫，用米酢和蚌蛤灰塗之，待其乾即易之。千金。

癰疽有毒蟲，鹿角燒末，苦酒和塗，磨汁亦可。

骨疽不合，骨從孔中出，掘地作坑，口小裏大，深三尺，以乾雞屎二升同艾及荊葉搗碎，入坑內，燒令烟出，以疽口就

熏，用衣擁之，勿令洩氣，半日當有蟲出，甚效。千金方。

一切諸瘡，五倍子、黃蘗等分，為末傅之。普濟方。

一切腫毒，五倍子炒紫黑色，蜜調塗之。

耳垢治癰腫未成膿，封之即散，疔蟲蝕鼻生瘡，及毒蛇螫人，並敷之。時珍。

瘡口不收，五倍子焙研末，以臘酥脚調塗四圍效。

一切癰腫未潰，用乾人屎末麝香各半錢研勻，以豆人津調貼頭外，以酢麪作錢護之，膿盡去藥。衍義。

疔腫初起，刮破，以熱屎尖傅之，乾即易，不過十五遍，即根出立瘥。千金方。

收斂瘡口，血竭末一字，麝香少許，大棗燒灰半錢，同研津調塗之。究原方。

疔腫拔根，取戶邊蜘蛛蛛爛酢和，先挑四畔血，出根稍露，傅之，乾即易，一日夜根拔出，大有神效。千金方下同。

積年諸瘡，蜘蛛膜貼之數易。

一切腫毒已成未成，用水膠一片水漬，當頭開孔貼之，未百日者自消，已潰者令膿自出也。外臺證要。

諸瘡腫毒，全椒七枚，梔子七箇，麻油煎黑，去渣入黃蠟化成膏，傅之。濟家方。

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百六十七

外科癰疽疔毒門九

鍼灸

素問曰：夫癰氣之瘕者，宜以鍼開除去之，夫氣盛血聚者，宜石而瀉之。

東方之域，其民食魚而食鹹，其病皆爲癰瘍，其治宜砭石。

癰不知所按之不應手，乍來乍已，刺手太陰旁三瘡，與纓脈各二。

靈樞經曰：凡刺之害，中而不去，則精泄，不中而去，則致氣，精泄則病甚而恆，致氣則生爲癰疽也。

凡刺癰邪勿迎隨，易俗移性不得膿，脆道更行去其鄉，不安處所乃散亡，諸陰陽過癰者取之，其輸瀉之鈹鍼者末

如劍鋒，以取大膿。

病之生時有喜怒不測，飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，榮氣不行，乃發爲癰疽，陰陽不通，兩熱相搏，乃化爲膿，小鍼能取之乎岐伯曰：以小治小者，其功小，以大治大者，多害故。其已成膿血者，其惟砭石鈹鍼之所取也。

甲乙經曰：項腫不可俛仰，頰腫引耳，完骨主之。

咽腫難言，天柱主之。

腸內生癰，雄雞頂上毛并屎燒末，空心酒服。千金。

決癰代針，白雞翅下兩邊第一毛燒灰，水服即破。外臺。

癰疽惡瘡初腫起，當歸黃蘗皮，羌活爲細末，生鷺鷥膝搗汁，調傅瘡之四圍，自然收毒聚作小頭即破，切不可併瘡

頭敷之，恐毒氣四攻，不可收也。養疔漫筆。

癰疽勢腫惡不潰堅硬，以利刀將患處劃成十字路，用麪水調稠厚，週圍瘡口外高起五分許，如塘池樣，將梧桐淚填半滿，用好米酢滴淚上，須臾自沸，勿令滾出麪外。次日用金銀花煎湯洗淨，再如前用一次，只用酢洗，不痛爛肉自去。

疔瘡腫毒，用鍼刀鏟破疔頭，以蟾酥傅之，後用野菊花，莎草根，甜菜葉搗細，以無灰酒盡量調服之。酒醒疔化水，即痛定如熱除，不必去疔，亦自愈也。

疔瘡入腹嘔者，煎道人頭濃汁飲之。

疔瘡毒氣入腹，昏悶不食，紫花地丁，蟬蛻，貫仲各一兩，丁香二錢爲末，每服二錢，空心溫酒下。

但使溫溫勿令破肉如瘡痛自急易之患當漏覺輒快一日多二次如外有子以出者

三因方曰：癰疽初覺腫痛，先以濕紙覆其上，視之先乾處是頭也。大蒜切片置頭上，以大艾炷灸之三壯，即換一蒜，痛者灸至不痛，不痛者灸至痛乃止。大槩以百壯為准，最要早覺，早灸為上，如有頭，則不必紙覆也。

若十數頭作一處，生者即用大蒜研成膏，作薄餅鋪頭上，聚艾於餅上灸之。

直指方曰：初發小點一二日，急以蒜片貼其中心，以小艾炷灸五壯而止。

河間六書曰：凡瘡瘍須分經絡部分，氣血多少，膈穴遠近。

從背出者，當從太陽五穴選用，至陰在足小指外側，去爪甲角如韭葉，通谷在足小指外側本節前陷者中，束骨在

足小指外側本節後陷中，崑崙在足外踝後跟骨上陷中，委中在膕中央約紋中動脈。

從鬢出者，當從少陽五穴選用，竅陰足小指次指端，去爪甲如韭葉，夾谿在足小指次指，岐骨間本節於陷中，臨泣

在足小指次指本節後間陷中，陽輔在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分，陽陵泉在膝下一寸外廉陷中。

從髀出者，當從陽明五穴選用，厲兌在足大指次指，去爪甲如韭葉，內庭在足大指次指外間陷中，陷谷在足大指

次指間本節後陷中，衝陽在足跌上五寸骨間動脈，去陷骨三寸，解谿在衝陽後一寸五分腕上陷中。

從腦出者，則惟絕骨一穴，在足外踝上三寸動脈中。

癰疽已覺微漫腫，硬皮不變也，脈沉不痛者，當外灸之，引邪氣出而止。經曰：陷下者灸之。如外微覺木硬而不痛者，

當急灸之，是邪氣深陷也，淺者不可灸，如有膿水，亦不可灸，當鍼之。

得效方曰：癰疽初發漸大，以濕紙一片搭瘡上，其一點先乾處，即是正頂。先以水洗去人皮，取大筆管一箇，安於

正頂上，却用大水蛭一條，安其中，類以冷水灌之，蛭當吮其正穴膿血，皮皴肉白，是毒散無不差。如毒大蛭小，須用

三四條方見效，如血不止，以藕節上泥塗之。

贊生方曰：有善治癰疽者，皆於瘡上灸至二三百壯，無有不愈。但艾炷小作之，小則人不畏灸，灸多則作效必矣。

顛腫唇癰，額竅主之。

頰腫痛，天聰主之。

頭項癰腫不能言，天容主之。

身腫，關門主之。

胛下滿痛，膺腫，乳根主之。

面腫，目癰，刺陷谷出血立已。

積鼻腫，可刺其上，堅勿攻，攻之者死。

疽竅陰主之。

脈風成爲厲管，疽發厲竅陰主之。

管疽商丘主之。

千金方曰：癰疽始作大，大痛或小痛，或發如米粒，即便出膿，宜急斷口味，利去其毒，用騎竹馬灸法，或就患處灼艾，重者四面中央總灸一二百壯，更用敷藥，其效甚速。

騎竹馬灸法，治一切瘡瘍，無有不愈。令病人以肘凭几，豎臂腕要直，用篾一條，自臂腕中曲處橫紋，男左女右，貼肉量起，直至中指尖盡處，截斷爲則，不量指甲，却用竹扛一條，令病人脫衣，正身騎定，前後用兩人扛起，令病者脚不著地，又令二人扶之，勿令偃，却將前所量臂篾從竹扛坐處，尾骶骨盡處，直貼脊背，量至篾盡處爲則，用墨筆點定，此只是取中非灸穴也。却用薄篾作則子量病人中指節，相去兩橫紋爲則，男左女右，截爲一則，就前所點記處兩邊各量一則盡處，即是灸穴。兩穴各灸五七壯，疽發於左則灸右，疽發於右則灸左，甚則左右皆灸。蓋此二穴心脈所過之處，凡癰疽皆心火留滯之毒，灸此則心火流通而毒散矣。起死回生之功，屢試屢驗。

肢瘡瘍氣血不足者，只以前法灸之皆愈。疔毒甚者，尤宜灸，蓋熱毒中隔，內外不通，不發泄則不解散。若處貧居僻，一時無藥，則用隔蒜灸法尤便，每三壯一易蒜片，大槩以百壯爲度。用大蒜取其辛而能散，用艾炷取其火力能透。如法灸之，必瘡發膿潰，繼以神異膏貼之，不日自愈。一能使瘡不開大，二內肉不壞，三瘡口易合，見效甚神。丹溪云：惟頭爲諸陽所聚，艾壯宜小而少。

凡瘡不起者，托而起之，不成膿者補而成之，使不內攻，膿成而及時針之，不數旬即愈矣。常見患者皆畏針痛而不肯用，又有恐傷肉而不肯用，殊不知瘡雖發於肉薄之所，若其膿成必腫高寸餘，瘡皮又厚分許，用針深不過二分，若發於背必腫高二三寸，入針止於寸許，况患處肉既已壞，何痛之有？何傷之慮？凡怯弱之人，或患附骨等疽，待膿自通，以致大潰，不能收斂，氣血瀝盡而死者多矣。

凡瘡既成膿，皮膚不得疎泄，味者待其自穿，殊不知少壯而充實者，或能自解；若老弱之人，氣血枯槁，或兼攻發太過，不行針刺，膿毒乘虛內攻，穿腸腐膜，鮮不悞事。若毒結四肢，砭刺少緩，則腐潰深大，亦難收斂。毒結於頰項胃腹緊要之地，不問壯弱，急宜針刺，否則難治。大抵瘡瘍之證，感有輕重，發有深淺，淺者腫高而軟，發於血脈深者腫下而堅，發於筋骨。然又有發於骨髓者，則皮肉不變，故古人制法，淺宜砭而深宜刺，使瘀血去於毒聚之始，則易消，若膿成之時，氣血壯實者或自出，怯弱者不行針刺，鮮有不悞。凡瘡瘍透膜十無一生，雖以大補藥治之，亦不能救，此可爲待膿自出之戒也。故東垣云：毒氣無從而解，膿瘀無從而泄，過時不烙，反攻於內，內既消敗，欲望其生，豈可得乎？茲舉一二以告同道，并使患者知所慎云。

若治元氣不足之證，即其初患，便當內用參芪歸朮溫補脾胃，外用桑枝葱熨，接補陽氣，使自消散。若久而不能成膿者，亦用前二法補助以速之。若膿既成而不潰，用艾於當頭灸數炷以出之，却服十全大補湯。又云：癰有椒眼十數頭，或如蜂窠蓮房，膿血不出者，用針橫直裂之，如無椒眼之類，只消直入取膿，不必裂之。一法

堅硬不潰，名曰石癰。當上灸百壯，石子當碎出。

東垣十書曰：初覺癰疽發背，欲結未結，赤熱腫痛，先以濕紙覆其上，立視先乾處，卽癰頭也。取蒜切片如三錢厚，安頭上，用大艾炷灸之三壯，換一蒜片，痛者灸至不痛，不痛者灸至痛，早覺早灸，爲上一日，二日十灸，十日四日六七活，五日六日三四活，過十數日者不可灸。若有十數頭，作一處者，用蒜研成膏，作薄餅鋪頭上，聚艾燒之，亦能活也。若初發赤腫，中間有一黃粟米頭，用獨蒜切去兩頭，取中間切片安瘡頭上，著艾灸十四壯，多至四十九壯。丹溪心法曰：凡癰疽之發，或因內有積熱，或因外寒鬱內熱，若於生發之處，艾灸以散其毒，治之於早，可以移深爲淺，改重爲輕。諸項灸法，皆好，惟騎竹馬灸法尤爲切要，此消患於未形之策。

多灸則內服乳粉托裏散，防火氣入心。

醫壘元戎曰：瘡瘍自外而入者，不宜灸自內而出者，宜灸；外入者托之而不內，內出者接之而令外。故經曰：陷者灸之，灸而不痛，痛而後止其灸。灸而不痛者，先及其潰，所以不痛；而後及良肉，所以痛也。灸而痛，不痛而後止其灸，灸而痛者，先及其未潰，所以痛；而次及將潰，所以不痛也。

薛己醫按曰：伍氏云：凡用蒜餅灸者，蓋蒜味辛溫有毒，主散癰疽，假火勢以行藥力也。有只用艾炷灸者，此可施於頑疽癩發之類。凡赤腫紫黑毒甚者，須以蒜艾同灸爲妙。

凡治癰疽發背疔瘡，若初灸卽痛者，由毒氣輕淺，灸而不痛者，乃毒氣深重，悉宜內服追毒排膿，外傳消毒之藥。大抵癰疽不可不痛，又不可大痛，悶亂不知痛者難治。

凡隔蒜灸者，不論壯數，則邪無所容，而真氣不損，但頭頂見瘡，宜用騎竹馬法及足三里灸之。

夫瘡瘍之證，有諸中必形諸外，在外者引而拔之，在內者疎而下之。灼艾之功甚大，若毒氣鬱結，瘀血凝滯，輕者或可藥散，重者藥無全功矣。東垣曰：若不針烙，則毒氣無從而解，是故善治毒者，必用隔蒜灸。舍是而用苦寒敗毒等劑，其壯實內熱者，或可祛怯弱氣虛者，未有不敗者也。又有毒氣沉伏，或年高氣弱，或服剋伐之劑，氣益以虛，膿因

餅上熨之，更換熱餅頻熨，如覺患處走散，即以綿帛覆蓋，勿令氣洩，俟少間敷藥。凡癰疽展大如龜之形，且看頭向上下，先灸其前兩脚次灸其尾，或紅筋走緊而長，從盡處灸之，須留頭并後兩脚勿灸。若盡灸之，不惟火氣壅聚，彼毒無所走散，又攻入裏也。或辨認不明，以白芷三分、漢椒、桑白皮各一分，連鬚葱白十片，取新汲水煎湯，入酸酢半盞，淋洗少頃，其筋自現，可以辨驗頭尾。

豆豉餅治瘡瘍，腫硬不潰，及潰而不斂，并一切頑瘡惡瘡。江西豆豉爲末，唾津和作餅子，如錢大，厚如三文，置患處，以艾壯於餅上灸之。餅乾，再用唾津和作如瘡大，用漱口，水調作餅覆患處，以艾鋪於餅上燒之。如未成者，用之即消，已成者，縱不能全消，其毒頓減，前人俱稱有奇功，不可忽之。

霹靂火治內疔之證，發汗之妙方也。凡瘡始覺，不曾服出汗之藥，過數日間，外證皆罷，或在胃腹，或在脅肋，赤焮腫起，此乃毒氣入裏，內疔之所發也。宜用此法出汗，毒氣方能出也。先置水桶一箇，鐵銚一箇，令病人側臥於桶上，四圍以衣衾蓋護，勿令泄氣。却以鵝卵石火燒極紅，放銚內，以銚安桶內，以酢投於銚內，淬之，熏蒸出汗，未透，再加火力再淬之，須令腫處汗透，不必遍身出汗也。

附子餅治潰瘍，氣血虛不能收斂，或風邪襲之，以致氣血不能運於瘡所，不能收斂。用炮附子去皮臍，研末，以唾津和爲餅，置瘡口處，艾壯於餅上灸之，每日灸數壯，但令微熱，勿痛。如餅乾，再用唾津和，做以瘡口濕潤爲度。

證治準繩曰：砭法治丹毒，疔瘡，紅絲走散，或時毒瘀血壅盛，用細磁器擊碎，取有鋒芒者一塊，以筋一根劈開頭尖夾之，用線縛定，兩手指輕撮筋，稍令磁芒正對患處，懸寸許，再用筋一根頻擊筋頭，令毒血遇刺皆出，毒入腹膠膜者難治。

灸乃開結破硬之法，倘有一點白粒，如粟米起，四圍微腫如錢，便當於米粒上著艾灸十四五壯，三日內灸者，只成灸瘡而散，三日外者，其腫漸少，宜多灸之，或灸火著處，則結熱可伸，灸處先潰，則毒勢分減，庶免展開，不致下陷，及

當椒眼上箇箇灸之，亦佳，不必裂也。又云：癰者皮薄腫高，多有椒眼粒，疽者皮膚頑硬，狀如牛頭之皮。癰成膿則宜針，針宜用馬銜鐵爲之，形如韭葉樣，兩面皆利，可以橫直裂之五六分許，攻去毒血，須先灸之，而後裂。疽成膿則宜烙，可用銀篋大二寸，長六寸，火上燒令赤，急於毒上熨烙，得膿利爲度。

毒氣已成者，宜用托裏以速其膿，膿成者當驗其生熟深淺，而鍼之。膿生而用針，氣血既泄，膿反難成。若膿熟而不針，腐潰益深，瘡口難斂。若瘡深而針淺，內膿不出，外血反泄，若瘡淺而針深，內膿雖出，良肉受傷。若元氣虛弱，必先補而後針，其膿一出，諸證自退。若膿出而反痛，或煩躁嘔逆，皆由胃氣虧損，宜急補之。若背瘡熱毒熾盛，中央肉黯，內用托裏壯其脾胃，外用烏金膏塗於黯處。其赤處漸高，黯處漸低，至六七日間，赤黯分界，自有裂紋，如刀劃然，黯肉漸潰矣。當用鉞針利剪徐徐去之，須使不知疼痛，不見鮮血爲妙。雖有裂紋，膿未流利，及膿水雖出而仍痛者，皆未通於內，並用針於紋中引之，患於背胛之間，肉腐膿出，腫痛仍作，此內有毒筋間隔，膿未通耳，尤宜引之。若元氣虛弱，慢服剋伐，患處不痛，或肉將死，急溫補脾胃，亦有生者。後須純補之藥，庶可收斂。若妄用刀針去肉出血，則氣無所依附，氣血愈虛，元氣愈傷矣，何以生肌收斂乎？

針灸之法，有太乙人神、周身血忌、逐年尻神、逐日人神，而其穴有禁鍼禁灸之論，犯之者其病難瘳，理固然也。但瘡瘍氣血已傷，肌肉已壞，宜迎而奪之，順而取之，非平人針灸之比，何忌之有？外科精義云：瘡瘍之證，毒氣無從而解，膿瘀無從而泄，反攻於內，內既消敗，欲望其生，豈可得乎？危惡之發於致命之所，禍在反掌，腹癰囊癰，二便不通，胃腹脹悶，唇疔喉痺，咽喉腫塞，其禍尤速，患者審之。

葦針法，治癰疽初作，先以筆管一箇入螞蟥一條，以管口對瘡頭，使螞蟥吮瘡膿血，其毒即散。如瘡大須換三四條，若吮正穴，螞蟥必死矣，累試累效。若血不止，以藕節上泥塗之。若瘡頭未明，以井邊泥塗上先乾處即是。

癰疽初發小點，一二日間急以大蒜頭橫切如錢，貼其中心，頓小艾炷灸之，五壯而上，若形狀消大，以黃稗紙蘸酒全貼，認先乾處爲筋脚，於先乾處灸之，或兩處先乾皆灸，但五七壯止。又法，屈指從四圍尋按，遇痛處即是根，就此

當用金烙而不月則毒無從而泄膿湧愈其毒勝筋傷骨難可死矣若毒淺金烙不得則毒治未得也
不當其所他處作頭此皆不能瘰疾反增痛耳。或瘰癧潰久不瘳漏瘡經年或通或閉癰疽瘡口不收皆因冷滯不能收斂亦因瘡口內外四畔烙之癰疽正發及膿見後紅腫焮開用鐵針燒赤四圍刺之則紅腫隨縮矣。

古今醫統曰烙法方其已熟未潰之時用鐵一烙極是快意方扇火欲著時誠是驚人余常用矣臨時猶且顛悖况未曾經歷者乎烙後膿水流通百無所忌名曰熟瘡其瘡突者針口宜向下然須是熟於用烙者識淺深知穴道審生熟非其時則所出皆生血當其時則出黃膿瘰肉用尖針烙者不得法尖針頭細其口易合惟用平圓頭者爲妙蓋要孔穴透或恐瘡口再合用牛膝根如瘡口之大小略割去粗皮插入瘡口外留半寸許則用嫩橘葉地錦草各一握研成膏傅之牛膝能使惡血常流二草溫涼止痛隨乾隨換此十全之功也。

景岳全書曰按立齋云灼艾之法必使痛者灸至不痛不痛者灸至痛則毒必隨火而散否則非徒無益而反害之。愚意癰疽爲患無非血氣壅滯留結不行之所致凡大結大滯者最不易散必欲散之非藉火力不能速也所以極宜用灸。然又有孫道人神仙熏照方其法尤精尤妙若毒邪稍緩邪深經遠而氣有不達灸之爲良若毒邪熾盛其勢猛急而垂危者則宜用熏照方更勝於灸也。

上古有砭石之制內經有九針之別制雖不同而去病之意則一也其瘡瘍一科用針爲貴用之之際雖云量其潰之淺深尤當隨其肉之厚薄若皮薄針深則反傷良肉益增其潰肉厚針淺則膿毒不出反益其痛用針者可不慎哉至於附骨疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛者宜燔針開之若治咽喉之患當用三稜針若丹瘤及癰毒四畔焮赤疼痛如灼宜用砭石去血以泄其毒則重者減輕者消如洪氏室患腹癰膿脹悶啓以鉞針刺膿出卽蘇一人患囊癰膿熟腫脹小便不利幾殆急針之膿水大泄氣通而愈大抵用針之法迎而奪之順而取之所謂「不治已成治未成」正此意也今之患者或畏針而不用醫者又徇患者之意而不針遂至膿已成而不得潰或得而潰所傷已深矣卒之夭枉者十常八九亦可悲矣經曰天溫日明則人血淖溢而衛氣浮故血易瀉氣易行天寒日陰

壞筋骨傷氣血也。所謂灸至不痛者，謂著皮肉未壞處則痛，火至著毒處則不痛，必令火氣至著毒處方止。所謂灸至痛者，謂初著毒處不痛，至好肉則痛，必令火氣至好肉方止。畏灸者，或用獨蒜瓣，或用豆豉餅，或用椒薑鹽爛攪，捻作餅子如三錢厚，鋪艾灸之，熱則易新餅，亦可散也。

灸乃從治之意，惟頭爲諸陽所聚，艾炷宜小而少，若少陽分野，尤不可灸，灸之多至不救。亦有因灸而死者，蓋虛甚，孤陽將絕，其脈必浮數而大，且鼓精神，必短而昏，無以抵當火氣，宜其危也。

劉宗厚曰：此謂癰疽初發，宜灸之也。然諸瘡患久成痛者，常有膿水不絕，其膿不臭，內無歹肉，尤宜用附子浸透，切作大片，厚二三分，於瘡上著艾灸之，仍服內托之藥，隔二三日再灸之，不五七次，自然肌肉長滿矣。至有膿水惡物，漸漬根深者，郭氏治用白麪、硫黃、大蒜三物，一處搗爛，看瘡大小，捻作餅子，厚約三分，於瘡上用艾炷灸二十一粒，一灸一易，後隔四五日方用翠霞錠子，并信效錠子互換用之，紙入瘡內，歹肉盡去，好肉長平，然後貼收斂之藥，內服應病之劑，調理卽瘥矣。蓋不止宜灸於瘡之始發也。大抵始發宜灸，要汗下補養之藥對證，至灸冷瘡，亦須內托之藥切當，設反逆不惟不愈，恐致轉生他病之患也。

鍼烙

凡用鍼烙，先察癰疽之淺深，及膿未成已成。高阜而輒者，發於血脈，腫平而堅者，發於筋脈，皮色不相辨者，發於骨髓，高阜而淺者，用鍼鍼開之，疽始生白粒，便可消退，漸長如蜂窠者，尋初起白粒上烙，及四圍烙四五處。如牛項之皮者，疽頂平而淺者，皆宜用火鍼烙之。其鍼用圓鍼如筋，如緯錠，大頭圓平，長六七寸一樣二枚，蘸香油於炭火中燒紅，於瘡頭近下烙之，宜斜入向輒處，一烙不透，再烙必得膿也。瘡口烙者，名曰熟瘡，膿水常流下，不假按抑，用紙藥使瘡口不合，舊用紙捻及新取牛膝根，如瘡口大小，略刮去皮，一頭繫線，紙之，不如用翠青搜膿等錠子，臨用以

酒黃蘗、生附子、苦蕒子、甘草節、羌活、青皮、人參、黃芪、半夏、生薑六貼而消，此非內托之意歟？

嘗治一婦人，年將七十，形實性急而好酒，腦生疽，十五日，脈弦緊急，且瀉子急，用大黃酒煨細切，酒拌炒爲末，又酒拌炒，人參入薑煎調一錢重，又兩時再與，得睡而上半身汗，睡覺病已，此亦內托之意也。

東陽李兄年踰三十，形瘦膚厚，連得憂患，又因作勞且過於色，忽左腿外廉側上發一紅腫，其大如粟。一醫聞其大腑堅實，與承氣湯二貼下之，不效。又一醫教與大黃、硃砂、生粉草、麒麟竭又二三貼，半月後召余視之，曰：「事去矣！」

又一李兄四十餘，面稍白，神甚勞，忽脅下生一紅腫如桃，一人教用補劑，衆笑且排，於是流氣飲十宣散雜進之。旬餘後召余視之，余曰：「非惟不與補劑，抑且多得解利，氣血俱憊，難矣！」已而果然。

一男子年近六十，形素肥，初夏於左膊外廉側生一核，方圓二寸餘，不甚痛，召余治，診其脈息，緩大而弱。余曰：「此因憂悶而生，當氣升散之時，須急與人參膏五六斤，又看作何應？」病家召他外科，以十宣散五六貼而瘡甚。余曰：「此大虛也，勿以輕小視之！」病家不信，一外科仍以十宣散進之，又五六貼，瘡平陷出清水而死。此可爲因虛而生癰疽者之例。

一老人年七十，患背疽徑尺餘，已雜與五香十宣數十貼，膿血腥穢，嘔逆不食者旬餘，病人自去，喫內托散，膈中不安，且素有淋病三十年，今所苦者淋之痛與嘔吐不得睡而已，急以參芪歸朮養膏，以牛膝湯入竹瀝飲之，三日後

盡藥一斤半，淋止思食，七日後盡藥四斤，膿自湧出而得睡，又兼旬而安。

一男子年六十餘，性好酒肉，背疽見膿，嘔逆發熱，蓋其得內托十宣多矣。醫以嘔逆於嘉禾散中加丁香以溫胃行

氣。時七月大熱，脈洪數有力，余因謂此脈證在潰瘍，尤爲忌，然形氣實，只與人參膏和竹瀝飲之，盡藥十五斤，竹百餘竿而安。余曰：「此病幸安也，不薄味，必再作。」仍厚味自若，夏月醉後，坐水池中，又年餘，左脅旁生一軟塊如餅

二年後軟塊爲疽，本人見膿血淋漓而脈洪數有力，又嘔逆食少，遂自以人參膏入竹瀝飲之，又百餘竿而安。今八

則人血凝滯而衝氣沉，是以因天時而調血脈也。故凡遇天寒水冰，或陰氣凝滯之時，欲行鍼刺，則先當溫衣覆蓋，或以艾葉炒熱，或熱鹽熱衣類先熨其處，務令血脈溫和而後刺之，則血瀉氣行，其病立已。若血寒脈滯，遽爾用針，則邪毒不瀉，徒傷良肉，反以益其病也。

導引

保生祕要曰：諸毒瘡腫，導引法，以兩手交叉抱頸，以左右肩一上一下，用意使氣血和暢，內息綿綿，週身得汗，毒自化解。

運動瘡癰氣澀於皮膚，疽毒皆發於臟腑，患在前，歸元發引，患在背，起良行庭。瘡癰之疾，隨手可運，毛竅發散，腫毒之憂，得力通關，逐出大腸，繞患處著意爲之。

毒初起時，先於患處內小圈而至大圈，復用水以洗之，或毒成不散，則自內裏用意，以火攻出。待出膿後，則自外大圈旋轉至小圈，仍用水而收口。

醫案

李杲十書曰：元好問飲酒太過，脈候沉數。九月間腦下項上出小瘡，不痛不癢，如白頭瘡，凡四日後腦項麻木，腫勢外散，熱毒熾發，又二日痛大作，夜不得寐。醫處以五香連翹湯，後再邀予診視。云：膏梁之變，不當投五香連翹湯，已無及矣。且疽已八日，當先以火攻之，然後用藥。以大艾炷如兩核許者攻之，百壯始覺痛，次爲處方，是足太陽膀胱之經，其病逆當反治，脈中得弦緊，按之洪大而數，又且有力，必當伏其所主，而先其所因，其始則同，其終則異，必先歲氣無伐天和，以時令言之，可收不可汗，經與病俱禁下，法當結者散之，鹹以軟之，然寒受邪而禁鹹，遂制黃連消

薄已滌肥膿之氣，獨存瘦悴之形，加之暴怒精神愈損，故有此寒變也。病與時同，與瘍醫議，速製五香湯一劑，加丁香、香附子各五錢，劑盡瘍復大發，隨證調治而愈。內經曰：凡治病必察其下，謂察時下之宜也。諸痛痒瘡瘍皆屬心火，言其常也；如瘡盛形羸，邪高痛下，始熱終寒，此反常也，固當察時下之宜而權治。故曰：經者常也，法者用也，醫者意也，隨所宜而治之，可收十全之功矣。

至元壬午五月二十八日，王伯祿年踰五旬，有七，右臂膊腫盛，上至肩，下至手指，色變皮膚涼，六脈沉細而微。此乃脈證俱寒，予舉瘍醫孫彥和視之，曰：此乃附骨癰，開發已遲，以燔針啓之，膿清稀解。次日肘下再開之，加呃逆不絕，彥和與丁香柿蒂散兩服，稍緩。次日呃逆尤甚，自利，臍腹冷痛脹滿，飲食減少，時發昏憤，於左乳下黑盡處灸二七壯，又處托裏溫中湯，用乾薑、附子、木香、沉香、茴香、羌活等藥，咬咀一兩半，欲與服，或者曰：「諸痛痒瘡瘍皆屬心火，又當盛暑之時，用乾薑、附子可乎？」予應之曰：「理所當然，不得不然。」內經曰：脈細皮寒，瀉利前後，飲食不入，此謂五虛，况呃逆者，胃中虛寒故也。諸痛痒瘡瘍皆屬心火，是言其定理也。此證內外相反，須當捨時從證也。非大方辛熱之劑急治之，則不能愈也。遂投之，諸證悉去，飲食倍進，瘡勢溫膿色正。彥和復用五香湯數服，後月餘平復。噫！守常者，衆人之見，知變者，知者之事，知常而不知變，細事因而取敗者亦多矣。况醫乎哉！守常知變，豈可同日而語哉！

薛己醫按曰：一男子胷患癰，腫高焮痛，脈浮而緊，以內托復煎散二劑，表證悉滅，以托裏消毒散四劑而消。

一男子腹患癰腫，硬木悶煩熱，使祕脈數而實，以黃連內疎湯一劑少愈，以黃連解毒湯二劑頓退，更以金銀花散四劑，瘡頭出水而消。

一男子患腿痛而不焮腫，內亦便利調和，用托裏榮衛湯數劑而消。

一婦人項患毒，焮痛發寒熱，以荆防敗毒散二劑少愈，以小柴胡湯加連翹、牛蒡子、桔梗四劑而消。

十歲，強健如舊，此病兩以老年血氣弱，專服人參竹瀝而愈，若與內托十宣散，恐未能若是之安全也。

衛生寶鑑曰：丁巳，余從軍迴，住冬於曹州界，以事至州，有趙同知謂余曰：「家舅牛經，歷病頭目赤腫，耳前後尤甚，疼痛不可忍，發熱惡寒，牙關緊急，涕唾稠粘，飲食難下，不得安臥。一瘍醫於腫上砭刺四五百餘鍼，腫赤不減，其痛益甚，不知所由，然願請君一見。」余遂往診視，其脈浮緊，按之洪緩，此證乃寒覆皮毛，鬱遏經絡，熱不得升聚而赤腫。經云：天寒則地凍，水冰，人氣在身中，皮膚緻密，腠理閉，汗不出，血氣強，肉堅澹，當是之時，善行水者不能往，冰善穿地者不能鑿凍，善用針者亦不得取四厥，必待天溫冰釋凍解，而後水可行，地可穿，人脈亦猶是也。又云：冬月閉藏，用藥多而少鍼石也，宜以苦溫之劑，溫筋散寒，則已，所謂寒緻腠理，以苦發之，以辛散之，宜以托裏溫經湯、麻黃苦溫發之者也，故以爲君，防風辛溫散之者也，升麻苦辛，葛根甘平，解肌出汗，專治陽明經中之邪，故以爲臣，血流而不行者則痛，以白芷辛溫，當歸身辛甘溫，以和血散滯，濕熱則腫，蒼朮辛甘溫，體輕浮力雄壯，能泄膚腠間濕熱，人參甘草甘溫，白芍藥酸微寒，調中益氣，使托其裏，故以爲佐，依方餌之，以薄衣覆其首，以厚被覆其身，臥於煖處，使經血溫，腠理開，寒乃散，陽氣宣通，大汗出後，腫減八九分，再服去麻黃，防風加連翹、鼠粘子，腫痛悉去，經言汗之則瘡已，信哉斯言！或人以仲景言瘡家雖身痛不可發汗，其理何也？余因此說，乃營氣不從，逆於肉理而生瘡，腫身作疼痛，非外感也，若外感寒邪而作疼痛，故戒之以不可發汗，汗之則成瘡也。

戊午冬，余從軍住冬於武城縣，有賈倉使父年踰六旬，冬至後數日，疽發於背，五七日腫勢約七寸許，不任其痛。瘍醫曰：膿已成，可開發矣，彼懼不從。越三日，醫曰：「不開恐變證生矣。」遂以燔鍼開之，膿泄痛減，以開遲之，故迨二日變證果生，覺重如負石，熱如焮火，痛楚倍常，六脈沉數，按之有力，此膏粱積熱之變也。邪氣酷熱，固宜以寒藥治之，時月嚴凝，復有用寒遠寒之戒，乃思內經曰：有假者反之，雖違其時，以從其證可也。與瘍醫議，急作清涼飲子，加黃連秤一兩五錢，作一服服之，利下兩行，痛減七分。翌日復進前藥，其證悉除。後月餘平復。

精者運其深煖而精者溫之變而精者通之虛而精者補之實而精者滋之朋黨而閉者開之惡以信愈者去之附陽不和者調之經絡祕澀者利之慎勿槩用寒涼之藥况血脈喜溫而惡寒若冷氣入裏血卽凝滯反爲難瘥之證矣。

一男子素弱，肘患腫，欲內消服涼藥反致作瀉少食，以二神丸及香砂六君子湯加肉豆蔻而瀉止，食進又以托裏藥而腫亦消。丹溪云癰疽因積毒在臟腑，當先助胃壯氣使根本堅固，次以行經活血藥佐之，參以經絡時令使毒氣外發施治之早，可以內消，此內托之意也。又云腫瘍內外皆壅，宜以托裏表散爲主，如欲用大黃甯無孟浪之過，潰瘍內外皆虛，宜以接補爲主，如欲用香散未免虛虛之失。大抵癰腫之證不可專泥爲火經，云營氣不從逆於肉理，乃生癰腫。又云形傷痛，氣傷膿，六淫七情皆能致之，况稟有虛實及老弱不同，豈可槩用寒涼之藥設若毒始聚膿未作，勢不盛庶可消，尤當推其病因，別其虛實，若槩用寒涼藥必致悞事。如膿將成邪盛氣實用消毒之劑先殺其毒，雖作膿不爲大苦潰亦不甚，若就用托裏必益其勢如膿將成不成及不潰方用托裏膿成勢盛者針之，膿一出諸證悉退矣。

一男子膿熟不潰，微痛少食，倦怠發熱，予爲針之，膿湧出，熱益甚，乃虛故也；急以人參黃芪湯二劑，熱愈甚，此藥力尙未及也；又二劑果應，再以當歸補血湯數劑而痊。東垣云發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣脈洪大按之無力，或目痛鼻乾者，非白虎湯證也，此血虛發躁，宜當歸補血湯主之。

一婦人脾氣素弱，患毒未作膿發寒熱兼嘔，以不換金正氣散二劑而止，以托裏散六劑而潰，更以健脾藥而斂。

一男子患癰，膿成不潰，投以補劑而潰，更以健脾藥而愈。丹溪云氣血壯實膿自涌出信夫！

一男子潰而瘀血不腐，以參芪歸朮峻補氣血，更以桑木灸之腐而愈。

一童子腋下患癰，不斂膿清脈大倦怠懶食少寐，自汗口乾，以內補黃芪湯及豆豉餅灸之，兩月而愈。凡瘡膿潰而清，或瘡口不合，或聚腫不赤，肌寒肉冷，自汗色脫者，皆氣血俱虛也，非補不可。

一男子肩患毒，痲痛飲冷，煩躁便秘，脈數而實，以清涼飲二劑少愈；以金銀花散四劑悉退，又以十宣散去桂，加天花粉、金銀花數劑，瘡頭潰而痊。

一婦人臂患腫，惡寒不作膿，以十宣散六劑而潰；以托裏散數劑而瘳。

一男子患癰，腫硬疼痛，發熱煩躁，飲冷脈沉實大便秘，乃邪在臟也，用內疎黃連湯疎通之以絕其源。先投一劑，候行一次，勢退一二，再進一劑，諸證悉退，乃用黃連消毒散四劑而消。

一男子內股患毒，腫硬痛甚，不作膿，隔蒜灸五十餘壯，勢退七八，以仙方活命飲四劑而膿成，用十宣散六劑膿潰而愈。凡瘡大痛，或不痛麻木，灸最良。

一婦人臂腫未成膿，飲食少思，遇勞作痛發熱，以補中益氣湯二劑，痛少止；以補氣血健脾胃而消。

一男子素弱，臂患癰，飲食少而倦，以六君子湯加芎歸黃芪，膿成針之，更以托裏藥而愈。

一婦人脅患癰，未成膿，惡寒脈緊，以十宣散加柴胡二劑，表證悉退，更以托裏散數劑，膿潰而愈。

一婦人臂患毒，腫硬，咽喉壅塞，四肢逆冷，發寒熱，以五香連翹湯二劑頓愈，以瘡科流氣飲四劑而消。

一男子臂患癰，脈弦緊有力，以白芷升麻湯二劑頓退，又二劑而消。

一婦人肩下患毒，脈弦緊，以白芷升麻湯二劑，表證已退，更以托裏藥潰之而愈。

一男子臂患癰，不作膿，灸以豆豉餅，及飲托裏藥三十餘劑而潰，又月餘而瘳。

一男子膿熟不潰，余欲針之，補以托裏，彼不信，乃服攻毒藥，反致惡心少食，始悟而用針，更以六君子湯加藿香，當歸四劑少可，再加以味十全大補湯數劑而斂。凡瘡膿熟不行，鍼刺膿內侵蝕，輕者難療，重者不治。老弱之人，或偏僻之處，及緊要之所，若一有膿，宜急針之，更以托裏，庶無變證。

一男子患毒作痛，服寒涼藥，痛雖止而食愈少，瘡亦不潰，以六君子湯而食進，再以托裏藥潰之而愈。大抵瘡疽之證，寒熱虛實，皆能為痛，熱毒之痛者，以寒涼之劑折之；寒邪之痛者，以溫熱之劑散之；因風而痛者，除其風；因濕而

方活命飲二劑出水而消。此秘方，名千金化毒湯，本礬末葱湯調服，因未難服，故易爲丸。

一男子胃患癰，痲痛煩躁，發熱作渴，脈數而實，時季冬，予謂此熱毒內畜也，須捨時從證，欲治以內疎黃連湯。彼以時當隆冬，乃雜用敗毒藥，愈熾，仍求治。投前湯二劑，後去二次，諸證悉退，以金銀花散加連翹、山梔四劑，出水而消。大抵證有主末，治有權宜，治其主則末病自退，用其權則不拘於時，泥於守常必致病勢危甚。况雜用攻劑，動損各經，故丹溪云：凡瘡發於一經，只當求責本經，不可干擾餘經。羅謙甫云：守常者，衆人之見，知變者，智者之事，知常而不知變，細事因而取敗者多矣。

一上舍年踰四十，因怒脅內作痛不止，數日後外結一塊，三寸許，漫腫色不赤，按之微痛，余謂怒氣傷肝，致血傷氣鬱爲患，以小柴胡湯對四物，倍用芎歸、黃芪、貝母、肉桂治之。彼謂丹溪云：腫瘍內外皆壅，宜托裏表散爲主。又云：凡瘡未破，毒攻臟腑，一毫熱藥，斷不可用。况此證爲氣血凝滯，乃服流氣飲，愈虛，始信而復求。始視之，虛證併臻，診之胃氣更虛。彼欲服余前藥，余謂急者先治，遂以四君子湯加酒炒芍藥、炮薑、四劑少安，更加當歸，又四劑，胃氣漸醒，乃去乾薑，又加黃芪、芎歸、肉桂數劑，瘡色少赤，并微作痛。又二十餘劑而膿成，針之，却與十全大補湯，喜其謹疾。又兩月餘而瘳。夫氣血凝滯，多因營衛之氣弱不能運散，豈可復用流氣飲以益其虛？况各經血氣，多寡不同，心包絡、膀胱、小腸、肝經，多血少氣，三焦、膽、腎、心、脾、肺，少血多氣，然前證正屬膽經少血之臟，人年四十以上，陰血日衰，且脈證俱屬不足，腫瘍內外皆壅，宜托裏表散爲主，乃補氣血藥而加之以行散之劑，非專攻之謂也。若腫痲痛甚，煩躁脈大，辛熱之劑不但腫瘍不可用，雖潰瘍亦不可用也。凡患者須分經絡氣血，地部遠近，年歲老幼，稟氣虛實，及七情所感，時令所宜而治之，常見以流氣十宣二藥槩治結腫之證，以致取敗者多矣。

一婦人瘡潰後，吐鮮血三椀許，余用獨參湯而血止，用四君熟地、芎歸而瘡愈。此血脫補氣，陽生陰長之理也。若用涼血降火沉陰之劑，脾土生氣復傷，不惟血不歸源而死無疑矣。

一男子腰患毒，膿熱不潰，針之膿大泄，反加煩躁，以聖愈湯四劑而甯，更以人參養榮湯，加麥門冬五味子兩月而愈。此人後患濕氣，遂爲痼疾。凡瘡膿血去多，瘡口雖合，尤當補益，務使氣血平復。否則更患他證，必難治療，慎之。

一婦人患臂癰，瘡口紫陷，膿清不斂。彼以爲毒未盡，欲服攻毒之劑。予謂瘡瘍之證，腫起堅硬，膿稠者實也，腫下軟慢膿稀者虛也，遂用附子餅灸之，及飲十全大補湯百劑始愈。

一婦人患附骨癰，久而不斂，致腿細短，脈來遲緩，以十全大補湯加牛膝、杜仲，及附子餅灸之，兩月餘而愈。凡膿潰之後，脈澀遲緩者易愈，以其有胃氣故也。脈來細而沉時直者，裏虛而欲變證也。若煩痛尚未痊也，洪滑粗散者難療，以其正氣虛而邪氣實也。

一男子風裂瘡，口牙關緊急，腰背反張，以玉真散一服而愈，仍以托裏藥而斂。

一男子患癰，將斂，遍身作痒，脈浮，以消風散二服而止，更以托裏藥而愈。

一男子肩下患疽，已數日，漫腫微痛，頭甚多，皆如粟許，色不變，不起發。此氣血虛也。診其脈果然。先以仙方活命二劑，殺其大勢，更以托裏藥而起發。瘡頭雖潰，但流血水，氣血尙虛，不能爲膿也。彼欲服太乙錠子，予謂此藥止能攻毒，不能托裏。彼不深信，至四次飲食不進，瘡色黑陷，吃逆不絕，胃氣虛極也。不治強投溫中健脾之劑，不應而死。

一男子近脅患疽，腫而不潰，投大補之劑，潰而已愈。後患弱證而歿。

一男子腰中患疽，發而不潰，其氣血止能起發，不能培養爲膿也。投大補藥數劑而潰，又數劑膿出尙清，乃服參芪歸朮膏斤餘，膿少稠，數斤膿漸稠，肌肉頓生。凡大癰疽，藉氣血爲主，若患而不起，或潰而不腐，或不收斂，及膿少或清，皆氣血之虛也。宜大補之，最忌攻伐之劑。亦有膿反多者，乃氣血虛而不能禁止也。若潰後發熱作渴，脈大而膿愈多，屬真氣虛而邪氣實也，俱不治。常見氣血充實之人，患瘡皆腫高色赤，易腐潰而膿且稠，又易於收斂。怯弱之人，多不起發，不腐潰，及難於收斂。若不審察而妄投攻劑，虛虛之禍不免矣。及患後當調養，若癰癢流注之證，尤當補益也。否則更患他證，必難措治，慎之。

疽膿水清稀，瘡口不合，聚腫不赤，肌寒肉冷，自汗色脫者，氣血之虛也。腫起色赤，寒熱疼痛，皮膚壯熱，膿水稠粘，頭目昏重者，氣血之實也。頭痛鼻塞，目赤心驚，咽喉不利，口舌生瘡，煩渴飲冷，睡語咬牙者，上實也。精滑不禁，大便自利，腰脚沉重，睡臥不甯者，下虛也。肩項不便，四肢沉重，目視不正，睛不了了，食不知味，音嘶色敗，四肢浮腫者，真氣虛也。腫焮尤甚，痛不可近，多日不潰，寒熱往來，大便祕澀，小便如淋，心神煩悶，恍惚不甯者，邪氣之實也。又曰：真氣奪則虛，邪氣勝則實。又曰：諸瘡爲痒爲虛也。又曰：診其脈洪大而數者，實也；細微而軟者，虛也；虛則補之，和其氣托裏也；實則泄之，疎利而導其氣。內經謂血實則決之，氣虛則掣引之是也。

一男子潰後發熱作痛，脈浮數，按之無力，勞而尤甚，以補中益氣湯治之而止；更以十全大補湯而愈。常治左手脈小於右手而熱者，用血藥多於氣藥；右手脈小於左手而熱者，用氣藥多於血藥。

一男子潰後發熱頭痛，脈浮緊，虛而兼表邪也，以補中益氣湯加川芎、白芷二劑而止；更以托裏藥而愈。

一婦人潰後發熱少寐，四肢倦怠，以黃芪人參湯治之而安；更以十全大補湯加貝母、遠志、麥門冬、酸棗仁、香附、月餘而愈。

一婦人潰後發熱，服清熱敗毒藥愈甚，診之脈瀼，以四物湯加粟殼、乳香、沒藥二劑少止；又二劑而安。

一男子潰後發熱，頭微痛，日晡尤甚，脈浮，按之則瀼，以人參養榮湯加柴胡、地骨皮而愈；又月餘而斂。

一男子潰而惡寒，用四君子湯加桂，倍用黃芪大料四劑而止；膿水尚多，投入珍湯加桂數劑漸少；惟瘡口不合，以附子餅及十全大補湯，每劑加炮附子五分數劑，乃去附子，又服月餘而愈。

一男子潰後將愈，因勞四肢發熱，煩躁不寐，以聖愈湯四劑而甯；更以托裏藥而愈。丹溪云：有四肢熱逢風寒，如炙於火者，是人陰氣虛而陽氣盛也。

一男子潰後畏寒脈虛，以四君子湯加炮薑四劑而愈；以十全大補湯月餘而斂。仲景云：脈虛則血虛，血虛生寒，陽

一武職患腦疽，內潰熱渴，頭面腫脹，如斗，背脊色焮如塗丹，煩熱便秘。此表裏俱實，若非苦寒之劑，內疎外泄，則不救。遂針周項出膿，及用清涼飲一劑，加大黃五錢，再用消毒散而痊。

一男子瘡潰而煩渴不安，以聖愈湯二劑而甯，以人參黃芪當歸地黃四劑渴止，又以八珍湯二十餘劑而愈。大抵潰後有此證，屬氣血不足，須用參芪以補氣，當歸地黃以養血，若用苦寒之劑，必致有悞。

一男子患毒作渴，右關脈數，以竹葉黃芪湯治之少愈，更以補中益氣湯，加黃芩而愈。

一男子潰後口乾，遇勞益甚，以補中益氣湯加五味子麥門冬治之而愈，更以黃芪六一湯而斂。

一男子患毒潰後作痛，肢體倦怠，瘡口不合，飲食不甘，以六君子湯加黃芪、川芎、當歸四劑而愈，更以托裏散，月餘而斂。

一男子潰後，作痛，脈數而無力，以托裏散加生地黃、黃蘗二劑而止，更以托裏散數劑而安。

一男子潰後，發熱，左手脈數而有力，以人參敗毒散一劑而止，更以托裏散而瘥。

一男子潰後，發熱，焮痛不止，煩躁便秘，右手脈沉實，以清涼飲一劑而止，更以托裏消毒散四劑而瘳。

一男子潰後作痛，而脈瀼，以定痛托裏散飲之數乳香定痛散而止，更以托裏散數劑而愈。

一男子潰而作痛，脈浮緊，以內補黃芪湯四劑而止，又二十餘劑而愈。

一男子項患毒潰而作痛，以參芪地黃芎歸補之而止，更以八珍湯加黃芪、桔梗，三十餘劑而愈。

一男子患癰潰而作痛，脈輒而瀼。余謂氣血虛欲補之，彼不信，乃服攻伐之劑，反發寒熱，始信之，仍投大補藥而痊。大抵瘡之始作也，先發為腫，氣血鬱積，蒸肉為膿，故多痛。膿潰之後，腫退肌寬，痛必漸減，若反痛，乃虛也。丹溪云：膿出而反痛，此為虛也，宜以補之。亦有穢氣所觸者，和解之風寒所逼者，溫散之。齊氏云：瘡疽之證，有臟腑氣血上下，真邪虛實不同也，不可不辨。如漫腫堅硬膿稠者，瘡疽之實也；腫下軟慢膿稀者，瘡疽之虛也。瀉利腸鳴，飲食不入，嘔吐無時，手足並冷，脈弱皮寒，小便自利，或小便時難，大便滑利，聲音不出，精神不爽者，悉臟腑之虛也；大便艱，小

疽毒之患。彼不信，至夏果脚背發疽，脈數。此水涸火旺之脈也。須服加減八味丸，以補腎水。制按之則瀉而無力，足竟黑腐而死。

一男子稟頗實，乏嗣，服附子等藥致作渴，左足大指患疽，色紫不痛，脈亦數而澀，亦死。大抵發背腦疽脫疽，腫痛色赤，水衰火旺之色，尚可治。若黑若紫，火極似水之象也。乃腎水已竭，精氣已涸，決不治。

又一貴人病疽疾，未安而渴作，一日飲水數升，愚遂獻加減八味丸方，諸醫大笑云：此藥若能止渴，我輩當不復業醫矣。乃用木瓜、紫蘇、烏梅、人參、茯苓、百藥煎等生津液之藥止之，而渴愈甚。數劑之後，茫無功效，不得已而用此服之。三日渴止，因此相信，遂久服，不特渴疾不作，血氣亦壯，飲食加倍，強健過於少壯之年。蓋用此藥，非余敢自執鄙見，實有源流。自爲兒時，聞先君云：有一士夫病渴疾，諸醫皆用渴藥，治療累載不安，有一名醫診之，使服加減八味丸，不半載而疾痊，因疏其病源。今醫者治癰，却以生津液止渴之藥，誤矣！其疾本起於腎水枯竭，不復上潤，是以心火上炎，不能既濟，煎熬而生渴。今服八味丸降其心火，生其腎水，則渴自止矣。復疏其藥性，云：內北五味子最爲得力，此一味獨能生腎水，平補降心火，大有功效。家藏此方，親用有驗，故敢詳著之，使有渴疾者信其言，專志服餌，取效，無爲庸醫所惑。庶廣前人之志。如臂痛、腳氣、風氣、四肢拘攣、上氣眼運、肺氣喘嗽、消食利小便，久服輕身，聰明耳目，令人光澤多子。

一婦人面患毒，焮痛發熱作渴，脈數，按之則實，以涼膈散二劑少愈；以消毒藥數劑而平。

一男子肩患疽作渴，脈數有力，以黃連解毒湯三劑而止；更以仙方活命飲四劑潰而愈。

一男子患毒作渴，右關脈數，以竹葉黃芪湯治之少愈；更以補中益氣湯加黃芩而愈。

一人年三十，面患瘡，已潰作渴，自服托裏及降火藥不應。余診其脈浮而弱，丹溪云：潰瘍作渴，屬氣血俱虛，况脈浮虛。投以參芪各三錢，歸朮熟地各二錢，數服渴止；又以八珍湯加黃芪數劑，脈斂而愈。余治瘡瘍作渴，不問腫潰，但

氣不足也。瘡腫脈虛，宜托裏養血，信夫！

一婦人潰後，發熱服涼藥，反畏寒，以十全大補湯二劑而止；又以托裏藥而痊。

一男子潰後，發熱服涼藥益甚，診之脈浮，乃氣虛也，以補中益氣湯加五味子、麥門冬治之而止；更以托裏藥而斂。

一婦人潰後，發熱脈浮而數，虛而兼表證也，以補中益氣湯倍柴胡、升麻一劑而止；以托裏藥月餘而斂。

一男子患癰潰而飲酒，焮痛發熱，服黃連解毒湯二劑而止；更以托裏消毒散而愈。常治痛而大便祕脈實者，用清涼飲治之。

一男子患癰，時值陰寒，忽惡寒，右手脈有而似無，此胃氣虛而不任風寒也，以四君子湯加炮薑、肉桂二劑少止；又

四劑而安。丹溪云：有衛氣虛衰，不能溫分肉實表而惡寒者，又有上焦之邪，隔絕榮衛，不能升降出表而惡寒者。東

垣云：夜則惡寒，晝則安靜，是陰血自旺於陰分也；夜則惡寒，晝亦惡寒，是重陰無陽也。當急瀉其陰，峻補其陽，夜則

安靜，晝則惡寒，是陰氣上溢於陽中也。

一男子曾患毒，焮腫作嘔，喜冷脈洪數，以黃連解毒湯二劑頓退；更以金銀花散六劑而消。

一男子因瘡痛傷胃氣，少食作嘔，惡寒以六君子湯加當歸四劑少愈，以十宣散加白朮、茯苓、陳皮數劑而膿成；針

之，又以前散去防風、白芷數劑而痊。

一婦人脾氣素弱，患毒未作膿，發寒熱兼嘔，以不換金正氣散二劑而止；以托裏散六劑而潰，更以健脾藥而斂。

一男子作渴，欲發疽，以加減六味丸治之而消。

一男子患腦疽，發熱脈數無力，以前丸治之，不信，自服滋陰藥，以致不救。

一男子日飲水數椀，冬月亦然，彼恃壯竊喜，後口舌生瘡，欲治以前丸，彼以爲謬，乃服生津液藥，渴不能止，發背疽而歿。

一男子脚面發疽，愈而作渴，以前丸治之而愈。夫加減八味丸，治陰虛火動之聖藥也，有是證者，何以舍此？

敗毒藥發渴發熱紅絲仍見脈浮大而虛。此氣血受傷而然，以補中益氣湯主之而愈。蓋奪命既服，瘡邪已散，而復用敗毒之劑，是誅伐無過，失內經之旨矣。

一儒者患疔，元氣素弱，余補其氣血，出膿而愈。後因勞役，瘡痕作痒，乃別服敗毒散一劑，以致口噤舌強，手足搖蕩，痰涎上湧，自汗不止。此氣血復傷而致痙也，用十全大補加附子一錢，灌服而甦。

一男子患疔，服奪命湯，汗不止，瘡不痛，熱不止，便不利。此汗多亡陽而真氣傷矣。用參芪歸朮芍防五味二劑，諸證悉退。惟以小便不利為憂，余曰：「汗出故小便不利，汗止則陽氣復而自利矣。」仍用前藥去防風加麥冬，倍用黃芩，當歸四劑而小便利，瘡潰而愈。

表甥居富，右手小指患疔，色紫或云小瘡，針刺出血，敷以涼藥，掌指腫三四倍，黯而不痛，神思昏憤，煩躁不甯。此真氣奪而邪氣實也，先以奪命丹一服，活命飲二劑，稍可。余因他往，或徧刺其手，出鮮血，腕許腫延臂腕，痙大如瓠，手指腫數倍，不能潰。余用大劑參芪歸朮之類，及頻灸徧手而腫漸消，但大便不實，時常泄氣。此元氣下陷，以補中益氣加骨脂肉蔻吳茱萸五味，大便實而氣不泄，又日以人參五錢，麥冬三錢，五味二錢，水煎代茶飲之，又用大補藥五十餘劑而漸愈。此證初若不用解毒之劑，後不用大補之劑，欲生也難矣。

一人年二十，唇患疔四日矣，有紫脈自瘡延至口內，將及於喉。余曰：「此真氣虛而邪氣實也，若紫脈過喉則難治矣。」須針紫脈，并瘡頭出惡血以泄其毒，則可。乃別用解毒之劑，頭面俱腫，求治其篤。余曰：「前日之言不誣矣。」診其脈洪數，按之如無口，中腫脹，針不能入，為砭面與唇，出黑血，腕許勢雖少退，略進湯水，終至不起。都憲張恆山，左足指患疔，痛不可忍，急隔蒜灸三十餘壯，即能行步。欲速愈，或用涼藥敷貼，遂致血凝肉死，毒氣復熾。再灸百壯，服活命飲，出紫血，毒纔得解。脚底通潰，腐筋爛肉甚多，將愈，誤用生肌藥，反助其毒，元氣虧損而不能愈。余治以托裏藥，喜其稟實，客處三月餘方愈。大凡疔患於肢節灸法，有回生之功，設投以涼劑，收斂腠理，隧道

脈數發熱而渴，以竹葉黃芪湯治之。脈不數，不發熱，或脈數無力而渴，或口乾，以補中益氣湯。若脈數而便秘，以清涼飲。尺脈洪大，按之無力而渴，以加減八味丸並效。若治口燥舌黃，飲水不歇，此丸尤妙。

一男子患癰，未作膿，掀痛煩躁，便閉脈實，以內疎黃連湯二劑，諸證悉退，以四物加芩連四劑而消。

一男子潰後，便澀脈浮，按之則澀，以八珍湯加紅花、桃仁、陳皮、杏仁，治之而愈。

一弱人潰後，便秘而脈澀，以四物湯加紅花、桃仁、黃芪，治之而愈。

一男子潰後，便秘而脈浮，以四君子湯加陳皮、杏仁、當歸，治之而愈。

一老人潰後，大便秘，小便赤澀，診之脈浮數而澀，以八珍湯加黃蘗，知母治之而已愈。後小便復數而赤大便秘，口乾目花，以加減八味丸滋腎丸治之而愈。此證乃陰血虛，陽火盛，故用前藥有效。向投苦寒之劑，必致有悞矣。

一男子潰後，便澀肌膚作痒，余以氣血虛不能營於腠理，用補劑治之。彼不信，乃服風藥，以致不救。大抵瘡瘍始作，便秘脈數而澀者，宜降火涼血為主。潰後便秘脈澀者，宜補血氣為主。若投風藥，禍在反掌。

舉人于廷器，腿患多骨疽，年餘出腐骨少許，午前畏寒，午後發熱，口乾唾痰涎，便頻數，余以為足三陰虧損，朝用補中益氣湯，暮用八味丸，加黃芪、當歸、五味子各三十餘劑，外用敷藥，諸證漸愈。又以十全大補之類，喜其慎疾而愈。

一男子上齶腫硬，年餘方潰，內熱作渴，肢體消瘦，六脈洪大，左手尤甚，用補中益氣湯，六味丸，出腐骨一塊，仍服前藥，諸證悉去，瘡口亦斂。

一婦人年三十餘，素弱，左手背漸腫，二年後潰出清膿，腫黯連臂，內熱晡熱，自汗盜汗，經水兩月一至。此肝脾氣血虧損，朝用歸脾湯，夕用逍遙散，腫處頻用葱熨法，兩月餘，諸證漸愈，瘡出腐骨。仍服前藥，前後共三百餘劑得愈。

一婦人左手患疔，癢痒寒熱惡心，左半體皆麻，脈數不時見。曰：凡瘡不宜不痛，不可大痛，煩悶者不治。今作癢痒，尤其惡也，用奪命丹二服不應，又用解毒之劑，癢痒始去，乃作腫痛。余曰：「勢雖危，所喜作痛，但毒氣無從而泄。」乃

針之，諸證頓退，又用解毒之劑而愈。

脫後用八珍湯加天花粉、麥冬、黃芪、陳皮各一錢，調理月餘，候瘡生肉已平，用珍珠散搽上，結皮而愈。

一監生中年喪妻，繼娶幼室，乃嬌態人也，自服補腎助陽之藥，以致腎水受傷，不能上制心火，左類發生一泡，先紫後黑，麻木不知痛痒。凡黑者腎經之毒也，其毒不淺，且喜瘡之四邊，尙未走散，此猶可取，隨用針刺疔上，量別藥不濟其事，用冰蠶散厚糊作條，插入患孔，用糊紙密封，勿令泄氣，朝服加減八味丸以滋腎水，午服益氣養榮湯接補真氣，以滋不足，晚用琥珀蠟礬丸護心解毒，候至十一日外，疔根與藥結成一塊，依期脫落。次用生肌斂口補助調理脾胃之劑，二十日而愈。後因其不慎調理，失於保節，幾及三年，復成虛損癆瘵而歿。

一婦人年近四旬，夫主不和，愁鬱種種，抱懷不散，時值季夏，歲荒之極，腮發一疔，六日後方延余視。其時疔毒已經走散，頭目脣頰俱腫，形如紫赤。余曰：『肉腫瘡不腫，疔毒走黃，不治之證。』彼婦流涕歎曰：『一家皆絕也。』余問曰：『何其如此？』婦又曰：『吾夫乃不肖之人。』婦有一女二子，俱未適配，設若婦死，寄托於夫子，女日後必爲流蕩輩也。故婦在一家生，婦逝一家死，自然之理。余時聞之，沉吟不已，如此何以得生，不忍棄之。况此瘡勢大，又非藥力可回，思之當先雇一貧人以飯餐飽，再用火酒數杯，隨用針刺腫上十餘處，令彼嚙吸惡血數碗，將溫湯洗淨，用蟾酥錠磨濃塗之，四圍敷金黃散，早晚二次，內以護心散、蠟礬丸、清心護裏，兼服降火化痰開鬱安神之藥，調治庶保不變。吸血之後，餘腫稍退，至六日因夫妻反目，復腫比前尤甚，復用針刺其甚腫之上約十餘處，出血三四碗，針孔上小膏蓋貼，餘腫仍敷，其人出血多而內必虛，以人參養榮湯加香附、貝母服，數日後針口漸膿，餘腫漸消，瘡處復得高腫，仍用蟾酥條插化，亦漸腐潰，外用生肌斂口，內服開鬱和中養血健脾等劑，調理百日外方愈。此病設若相論瘡勢形色，則百無一生之理，此功出於勉強行之，亦得其生。後二子一女，相繼婚配，其夫亦守其終，見今已六旬半矣。

一婦人年二十二歲，右耳垂向前一寸，生疔二日，請余視之。形有豆大，頂陷灰色，此肺經感毒發爲白刃疔也。又驗

寒，邪氣愈甚，多致不起。若毒未盡，驟用生肌，輕者反增潰爛，重者必致危亡。

一男子足指患疔腫，焮痛赤，用隔蒜灸人參敗毒散，加金銀花、白芷、大黃二劑痛止；又用十宣散，加天花粉、金銀花，去桂數劑而愈。

一男子足患疔瘡作痒，惡心嘔吐，時發昏亂，脈浮數，明灸二十餘壯，始痛；以奪命丹一服腫起，更以荆防敗毒散而愈。

一男子患疔，發熱煩躁，脈實，以清涼飲下之而愈。

一男子臂患疔，遍身麻木，脈數而實，急針出惡血，更明灸數壯，始痛；服防風通聖散得利而愈。

一男子左手背患疔，是日一臂麻木，次日半體皆然，神思昏憤，遂明灸至二十餘壯，尚不知痛；又三十餘壯始不癢，至百壯始痛；以奪命丹一服，腫始起，更用神異膏及荆防敗毒散而愈。

一老婦足大指患疔，甚痛，令灸之，彼不從，專服敗毒散，致真氣虛而邪氣愈實，竟至不救。蓋敗毒散雖能表散瘡毒，然而所感有表裏，所發有輕重，體段有上下，所稟有虛實，豈可一槩而用之耶？且至陰之下，藥力難到，專假藥力則緩不及事，不若灸之爲良。故下部患瘡，皆宜隔蒜灸之，痛則灸至不痛，不痛則灸至痛。若灸之而不痛者，宜明灸之，及針疔四畔，去惡血，以奪命丹一粒入瘡頭孔內，仍以膏藥貼之。若針之不痛，或無血者，以針燒赤，頻烙患處，以痛爲度。或不痛，眼黑如見火光者，此毒氣入臟腑也不治。若患在手足，紅絲攻心腹者，就於紅絲盡處刺去惡血，宜服荆防敗毒散。若絲近心腹者，宜挑破瘡頭去惡水，亦以膏藥貼之。如麻木者，服奪命丹。如牙關緊急或喉內患者，並宜噙一二丸。凡人暴死，多是疔毒，用燈照看遍身，若有小瘡，卽是，宜急灸之，俟醒更服敗毒藥，或奪命丹。人汗入肉食，之則生疔瘡，不可不慎！

外科正宗曰：一監生右額下生疔，三日形如魚目，詢問起居，但癢痒不常，此卽肺經受毒之證也。用針刺入四五分，

橫決之火毒也。治火毒與治諸毒，原自天淵。蓋火與元氣，勢不兩立，以寒涼折之，則元氣轉漓矣。鴻軒於四者總無其因，不問知爲胎毒之餘也。凡人稟受天地之氣，有清濁之不同，惟純粹以精之體，其福澤壽算，俱不可限量。然從父母構精而有身，未免夾雜慾火於形骸，所賴者惟在痘瘡一舉，暗將所藏慾火，運出軀外，復其粹精之恆體，如鑛金相似，必經紅爐煅煉，而查滓與精瑩始分之爲兩。吾嘗以此法觀出痘者之眸子，七八日後眼開之時，黑白分明者，精金也；赤筋紅膜包裹者，混金也。至於瞳人模糊，神光不現，則全非金矣。鴻軒幼時出痘太多，元氣不能充貫，又爲雜證所妨，臟腑中之火毒雖盡，而軀殼間之留滯猶存，所以痘癰之發，必於手足之委中曲池者，則以零星小毒無處可容，而潛避於呼吸難到之處耳。今之癰癩，正當委中之穴，其爲痘毒何疑？毒伏肘腋之下，原無所害，但粹精之體，微有夾雜，是亦寶鑑之纖塵、白璧之微類也。日者太和元氣充滿周身，將十五年前之餘滓盡欲化爲膿血，而出他人見之爲毒，吾早已卜其爲興者機矣。豈有暢於四肢而不發於事業者哉？治法外用馬齒莧熬膏，攻之速破，內用保元湯托之盡出，仍以痘癰門藥爲治，卽日自當痊愈，必不似瘡毒之曠日持久。但不識證而以治瘡毒寒涼瀉火諸藥投之，適以增楚貽患耳。孰謂外科小恙可無樽俎折衝之人耶？如法治之，潰出膿水甚多，果不用生肌長肉而自愈。

其根脚絲輒，毒不結聚，爲陷伏陰證也。未及針刺，伊舅曰：「何恙也？」余直告曰：「疔瘡證。」彼聽冷笑不信，余因辭不用藥，隨其信否。彼復請客醫治之，視曰：「風熱疔瘡，乃小恙也。」彼家告以某醫曾曰：是疔瘡，醫者點頭而笑曰：「此真胡說！」患家喜悅。天下事大相懸絕。醫用消風散二服，毒氣全收，隨發昏憤，喘急而死。

一年少婦額下生疔，疔瘡作痒。余欲針之，彼家不信。辭後自灸，次日四邊漸腫，瘡漸軟陷。又三日頭面大腫，復請治之。余觀原瘡灸上已結黑靨，乾陷無膿，此毒氣內陷，外肉已死，又面目浮腫，光亮發熱，形狀不堪，此正氣衰而邪氣實也。雖治亦不效，後必終死。彼家方悔，後延半月果歿。


一男子上齶腫痛月餘，以散風清熱藥俱已不效。又兩月破流血水，百日外方出細骨，大小三十餘塊。以十全大補湯併吹生肌散兩月餘而斂，中存一小孔，簪脚大，通鼻透氣，致難全斂，爲愈而不愈也。

一男子左上膊結腫年餘，方出爛斑，破流稀膿，延至半年方出多骨一條，如鵝膊骨，一同長約四寸。內服養血健脾藥，外搽玉紅膏，又月餘而斂。

一男子小腿正面腫骨腫痛二年，諸藥不應，此多骨瘡也。後破出骨一塊，肌肉腐爛，元氣虛弱，以十全大補湯加山茱萸、牛膝、木瓜，服至兩月餘不斂。每日以神燈照法，將火氣助之，又出朽骨一塊，上有蛙眼數十孔，以二骨炭火煨紅爲末，入生肌藥中用之收斂。問曰：用骨者何？此骨原稟氣血結成，故用之復還元氣也。此理合天然之數矣。

一女人左口上牙根突腫如粟，堅硬如石，不痛。此多骨疽也，藥亦不效。後三年始痛，破流臭膿，後出多骨，形如小髓，腫仍不退。此骨未盡，稍久又出小骨二塊，色枯峻嶒，其腫方退。以四君子湯加升麻、陳皮，外以甘草煎湯漱口，生肌散日搽三次而收斂。

寓意草曰：黃鴻軒手臂忽生癰瘡，漫腫無頭，痛極莫耐。外科醫者咸謂熱毒所致，揆之平素，淡泊明志，甯靜居心，絕無生熱致毒之因，究莫識其所起也。尊公我兼謂昌善議病，盍舍樽俎而一代庖人乎？昌曰：吾議此證，請先爲致賀，後乃言之。瘡瘍之起，莫不有因，外因者天行不正之時毒也，起居傳染之穢毒也，內因者醇酒厚味之熱毒也，鬱怒



圖書集成醫部全錄 卷三百六十七 彙考三百六十七 雜考九

二八

